


# 2024 年安徽省普通高中学业水平选择性考试（安徽卷）

## 生物学

一、选择题：本题共 15 小题，每小题 3 分，共 45 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 真核细胞的质膜、细胞器膜和核膜等共同构成生物膜系统。下列叙述正确的是（ ）
  - A. 液泡膜上的一种载体蛋白只能主动转运一种分子或离子
  - B. 水分子主要通过质膜上的水通道蛋白进出肾小管上皮细胞
  - C. 根尖分生区细胞的核膜在分裂间期解体，在分裂末期重建
  - D. [H]与氧结合生成水并形成 ATP 的过程发生在线粒体基质和内膜上
2. 变形虫可通过细胞表面形成临时性细胞突起进行移动和摄食。科研人员用特定荧光物质处理变形虫，发现移动部分的细胞质中聚集有被标记的纤维网架结构，并伴有纤维的消长。下列叙述正确的是（ ）
  - A. 被荧光标记的网架结构属于细胞骨架，与变形虫的形态变化有关
  - B. 溶酶体中的水解酶进入细胞质基质，将摄入的食物分解为小分子
  - C. 变形虫通过胞吞方式摄取食物，该过程不需要质膜上的蛋白质参与
  - D. 变形虫移动过程中，纤维的消长是由于其构成蛋白的不断组装所致
3. 细胞呼吸第一阶段包含一系列酶促反应，磷酸果糖激酶 1(PFK1) 是其中的一个关键酶。细胞中 ATP 减少时，ADP 和 AMP 会增多。当 ATP/AMP 浓度比变化时，两者会与 PFK1 发生竞争性结合而改变酶活性，进而调节细胞呼吸速率，以保证细胞中能量的供求平衡。下列叙述正确的是（ ）
  - A. 在细胞质基质中，PFK1 催化葡萄糖直接分解为丙酮酸等
  - B. PFK1 与 ATP 结合后，酶的空间结构发生改变而变性失活
  - C. ATP/AMP 浓度比变化对 PFK1 活性的调节属于正反馈调节
  - D. 运动时肌细胞中 AMP 与 PFK1 结合增多，细胞呼吸速率加快
4. 在多细胞生物体的发育过程中，细胞的分化及其方向是由细胞内外信号分子共同决定的。某信号分子诱导细胞分化的部分应答通路如图。下列叙述正确的是（ ）



- A. 细胞对该信号分子的特异应答，依赖于细胞内的相应受体
- B. 酶联受体是质膜上的蛋白质，具有识别、运输和催化作用
- C. ATP 水解释放的磷酸分子与靶蛋白结合，使其磷酸化而有活性
- D. 活化的应答蛋白通过影响基因的表达，最终引起细胞定向分化

5. 物种的生态位研究对生物多样性保护具有重要意义。研究人员对我国某自然保护区白马鸡与血雉在三种植被类型中的分布和日活动节律进行了调查，结果见下表。下列叙述错误的是 ( )

	白马鸡的分布占比(%)		血雉的分布占比(%)	
	旱季	雨季	旱季	雨季
针阔叶混交林	56.05	76.67	47.94	78.67
针叶林	40.13	17.78	42.06	9.17
灌丛	3.82	5.55	10.00	12.16
日活动节律				

- A. 生境的复杂程度会明显影响白马鸡和血雉对栖息地的选择
- B. 两物种在三种植被类型中的分布差异体现了群落的垂直结构
- C. 季节交替影响两物种对植被类型的选择，降雨对血雉的影响更大
- D. 两物种在白天均出现活动高峰，但在日活动节律上存在生态位分化

6. 磷循环是生物圈物质循环的重要组成部分。磷经岩石风化、溶解、生物吸收利用、微生物

物分解，进入环境后少量返回生物群落，大部分沉积并进一步形成岩石。岩石风化后磷再次参与循环。下列叙述错误的是（ ）

- A. 在生物地球化学循环中，磷元素年周转量比碳元素少
- B. 人类施用磷肥等农业生产活动不会改变磷循环速率
- C. 磷参与生态系统中能量的输入、传递、转化和散失过程
- D. 磷主要以磷酸盐的形式在生物群落与无机环境之间循环

7. 人在睡梦中偶尔会出现心跳明显加快、呼吸急促，甚至惊叫。如果此时检测这些人的血液，会发现肾上腺素含量明显升高。下列叙述错误的是（ ）

- A. 睡梦中出现呼吸急促和惊叫等生理活动不受大脑皮层控制
- B. 睡梦中惊叫等应激行为与肾上腺髓质分泌的肾上腺素有关
- C. 睡梦中心跳加快与交感神经活动增强、副交感神经活动减弱有关
- D. 交感神经兴奋促进肾上腺素释放进而引起心跳加快，属于神经—体液调节

8. 羊口疮是由羊口疮病毒(ORFV)感染引起的急性接触性人畜共患传染病，宿主易被 ORFV 反复感染，影响畜牧业发展，危害人体健康。下列叙述正确的是（ ）

- A. ORFV 感染宿主引起的特异性免疫反应属于细胞免疫
- B. ORFV 感染宿主后被 APC 和 T 细胞摄取、处理和呈递
- C. ORFV 反复感染可能与感染后宿主产生的抗体少有关
- D. 辅助性 T 细胞在 ORFV 和细胞因子的刺激下增殖分化

9. 植物生命活动受植物激素、环境因素等多种因素的调节。下列叙述正确的是（ ）

- A. 菊花是自然条件下秋季开花的植物，遮光处理可使其延迟开花
- B. 玉米倒伏后，茎背地生长与重力引起近地侧生长素含量较低有关
- C. 组织培养中，细胞分裂素与生长素浓度比值高时能诱导根的分化
- D. 土壤干旱时，豌豆根部合成的脱落酸向地上运输可引起气孔关闭

10. 甲是具有许多优良性状的纯合品种水稻，但不抗稻瘟病(rr)，乙品种水稻抗稻瘟病(RR)。

育种工作者欲将甲培育成抗稻瘟病并保留自身优良性状的纯合新品种，设计了下列育种方案，合理的是（ ）

- ①将甲与乙杂交，再自交多代，每代均选取抗稻瘟病植株
- ②将甲与乙杂交，F<sub>1</sub>与甲回交，选 F<sub>2</sub>中的抗稻瘟病植株与甲再次回交，依次重复多代；再将选取的抗稻瘟病植株自交多代，每代均选取抗稻瘟病植株
- ③将甲与乙杂交，取 F<sub>1</sub>的花药离体培养获得单倍体，再诱导染色体数目加倍为二倍体，从

中选取抗稻瘟病植株

④向甲转入抗稻瘟病基因，筛选转入成功的抗稻瘟病植株自交多代，每代均选取抗稻瘟病植株

- A. ①②                      B. ①③                      C. ②④                      D. ③④

11. 真核生物细胞中主要有 3 类 RNA 聚合酶，它们在细胞内定位和转录产物见下表。此外，在线粒体和叶绿体中也发现了分子量小的 RNA 聚合酶。下列叙述错误的是（ ）

种类	细胞内定位	转录产物
RNA 聚合酶 I	核仁	5.8SrRNA、18SrRNA、28SrRNA
RNA 聚合酶 II	核质	mRNA
RNA 聚合酶 III	核质	tRNA、5SrRNA

注：各类 RNA 均为核糖体的组成成分

- A. 线粒体和叶绿体中都有 DNA，两者的基因转录时使用各自的 RNA 聚合酶  
 B. 基因的 DNA 发生甲基化修饰，抑制 RNA 聚合酶的结合，可影响基因表达  
 C. RNA 聚合酶 I 和 III 的转录产物都有 rRNA，两种酶识别的启动子序列相同  
 D. 编码 RNA 聚合酶 I 的基因在核内转录、细胞质中翻译，产物最终定位在核仁

12. 某种昆虫的颜色由常染色体上的一对等位基因控制，雌虫有黄色和白色两种表型，雄虫只有黄色，控制白色的基因在雄虫中不表达，各类型个体的生存和繁殖力相同。随机选取一只白色雌虫与一只黄色雄虫交配，F<sub>1</sub> 雌性全为白色，雄性全为黄色。继续让 F<sub>1</sub> 自由交配，理论上 F<sub>2</sub> 雌性中白色个体的比例不可能是（ ）

- A. 1/2                      B. 3/4                      C. 15/16                      D. 1

13. 下图是甲与其他四种生物β-珠蛋白前 40 个氨基酸的序列比对结果，字母代表氨基酸，“.”表示该位点上的氨基酸与甲的相同，相同位点氨基酸的差异是进化过程中β-珠蛋白基因发生突变的结果。下列叙述错误的是（ ）

```

甲 MVHLTPEEKSAVTALWGKVNVDEVGGEALGRLLVVYPWTQ
乙 . . . W . A . . . Q L I . G . . . . . . . . . A . C . A . . . A . . I . . . . . . . . .
丙 . . . . . D A . . . A . . S G . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
丁 . . . . . A . . . A . . . G F . . . . . K . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
戊 . . . . . D A . . . A L . . G . . . . . . . . . A . A . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    
```


- A. 不同生物β-珠蛋白的基因序列差异可能比氨基酸序列差异更大  
 B. 位点上未发生改变的氨基酸对维持β-珠蛋白功能稳定可能更重要

- C. 分子生物学证据与化石等证据结合能更准确判断物种间进化关系  
 D. 五种生物相互比较, 甲与乙的氨基酸序列差异最大, 亲缘关系最远

14. 下列关于“DNA 粗提取与鉴定”实验的叙述, 错误的是 ( )

- A. 实验中如果将研磨液更换为蒸馏水, DNA 提取的效率会降低  
 B. 利用 DNA 和蛋白质在酒精中的溶解度差异, 可初步分离 DNA  
 C. DNA 在不同浓度 NaCl 溶液中溶解度不同, 该原理可用于纯化 DNA 粗提取物  
 D. 将溶解的 DNA 粗提取物与二苯胺试剂反应, 可检测溶液中是否含有蛋白质杂质

15. 植物细胞悬浮培养技术在生产中已得到应用。某兴趣小组尝试利用该技术培养胡萝卜细胞并获取番茄红素, 设计了以下实验流程和培养装置 (如图), 请同学们进行评议。下列评议不合理的是 ( )



- A. 实验流程中应该用果胶酶等处理愈伤组织, 制备悬浮细胞  
 B. 装置中的充气管应置于液面上方, 该管可同时作为排气管  
 C. 装置充气口需要增设无菌滤器, 用于防止杂菌污染培养液  
 D. 细胞培养需要适宜的温度, 装置需增设温度监测和控制设备

**二、非选择题: 本题共 5 小题, 共 55 分。**

16. 为探究基因 *OsNAC* 对光合作用的影响研究人员在相同条件下种植某品种水稻的野生型(WT)、*OsNAC* 敲除突变体(KO)及 *OsNAC* 过量表达株(OE), 测定了灌浆期旗叶(位于植株最顶端)净光合速率和叶绿素含量,结果见下表。回答下列问题。

	净光合速率 ( $\mu\text{mol}\cdot\text{m}_2\cdot\text{s}^{-1}$ )	叶绿素含量 ( $\text{mg}\cdot\text{g}^{-1}$ )
WT	24.0	4.0
KO	20.3	3.2
OE	27.7	4.6

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/31716110061006126>