

# 2023 年-2024 年执业医师资格证之临床助理医师考前冲刺模拟试卷 B 卷含答案

## 单选题（共 45 题）

1、男性，62 岁。慢性咳嗽 10 年。近半月来出现阵发性干咳。持续痰中带血。X 线胸片显示左肺下叶不张。为明确诊断，下列哪项是最有意义的检查方法

- A. 纤维支气管镜检查
- B. 痰细菌培养
- C. 结核菌素试验
- D. 肺功能测定
- E. 血清癌胚抗原测定

【答案】 A

2、再障血象骨髓象特点

- A. 呈全血细胞减少，少数呈两系细胞或血小板减少
- B. 细胞大小不等，中心淡染区扩大
- C. 可见巨核细胞增多，血片中血小板计数减少，可见畸形血小板
- D. 粒细胞停滞于早幼粒阶段，胞浆中颗粒粗大
- E. 骨髓增生活跃，但巨核细胞减少

【答案】 A

3、50 岁女性，车祸 3 小时入院。诊断：骨盆骨折，左股骨干骨折及左胫骨开放性骨折，首先应密切观察的并发症是

- A. 休克
- B. 泌尿性感染

- C. 创口感染
- D. 疼痛
- E. 坠积性肺炎

【答案】 A

4、男性，68岁。近2周来多饮，多尿，食欲减退，精神差，软弱无力。今晨发现神志不清而就诊，血压80/60mmHg，血糖38.1mmol/L，尿糖(++++)，尿酮体(±)。最可能的诊断是

- A. 脑出血
- B. 脑血栓形成
- C. 糖尿病酮症酸中毒昏迷
- D. 高渗性非酮症性糖尿病昏迷
- E. 乳酸性酸中毒昏迷

【答案】 D

5、关于月经的叙述，正确的是

- A. 初潮年龄多在15~16岁
- B. 经期多为3~5天
- C. 月经周期一般为28~35天
- D. 一次经量约为80~100ml
- E. 一般在经期的4~5天经量最多

【答案】 B

6、男性，65岁，胸闷、咳嗽伴四肢关节痛2个月，X线胸片示右肺门阴影增大，为确定诊断应首选下列哪项检查

- A. 纤维支气管镜检查
- B. 胸部体层摄片
- C. 支气管造影
- D. 肺穿刺活检
- E. 痰结核菌检查

【答案】 A

7、男，38岁，1个月来乏力、食欲缺乏，左上腹胀痛。查体：肝肋下3cm，脾肋下10cm，血红蛋白70g/L，白细胞 $26 \times 10^9/L$ ，血小板 $210 \times 10^9/L$ ，白细胞分类：中性粒及晚幼粒细胞为主，中性粒细胞碱性磷酸酶活性减低，首选治疗

- A. 羟基脲
- B. 三代头孢
- C. 脾切除
- D. DA 方案
- E. 保肝治疗

【答案】 A

8、女性36岁，主诉头晕乏力，3年来月经量多，浅表淋巴结及肝脾未触及。血红蛋白58g/L，白细胞 $8 \times 10^9/L$ ，血小板 $185 \times 10^9/L$ ，血片可见红细胞中心淡染区扩大，网织红细胞计数0.005。

- A. 白细胞数量
- B. 血红蛋白含量
- C. 网织红细胞计数
- D. 叶酸，维生素B12含量
- E. 铁蛋白浓度

【答案】 C

9、下述各项中属于医生违背不伤害原则的是

- A. 医生检查病人时，由于消毒观念不强，造成交叉感染
- B. 医生满足病人的一切保密要求
- C. 妊娠危及母亲的生命时，医生给予引产
- D. 医生对病人的呼叫或提问给予应答
- E. 医生的行为使某个病人受益，但却损害了别的病人的利益

【答案】 A

10、某患者在应用异烟肼、链霉素治疗中出现耳鸣、重听。痰菌阳性。你认为治疗方案应改为

- A. 异烟肼、利福平
- B. 异烟肼、利福平、卡那霉素
- C. 利福平、乙胺丁醇
- D. 卷曲霉素、氨硫脲
- E. 卷曲霉素、异烟肼

【答案】 A

11、异位妊娠时受精卵最常见的着床部位是（ ）。

- A. 卵巢
- B. 输卵管
- C. 宫颈
- D. 阔韧带

E. 腹腔

【答案】 B

12、 38 岁初孕妇，妊 35 周，头先露，因 1 周来水肿，两天来头晕头痛、视物不清，检查 BP160 / 110mmHg，尿蛋白(++)而住院，未孕前有过血压 140/90mmHg。

- A. 若无胎儿窘迫可继续妊娠
- B. 积极治疗至 36 周后引产
- C. 立即剖宫产终止妊娠
- D. 积极治疗 24~48 小时后行剖宫产
- E. 积极治疗 24 小时后行引产

【答案】 D

13、确定心脏骤停后给予最基本的生命支持是

- A. 触摸大动脉搏动
- B. 测量血压
- C. 人工呼吸、心脏按压
- D. 非同步直流电除颤
- E. 静脉或气管内滴入肾上腺素

【答案】 C

14、男，18 岁。短暂发作神呆、来回走动，右手抚摸衣扣，50 秒左右即过，事后无法回忆，类似发作 4 次。体检无异常。

- A. 心理学测试
- B. 脑脊液检查

C. 颈颅超声多普勒 (TCD)

D. 脑干诱发电位

E. 脑 CT

【答案】 D

15、为探索新生儿缺氧缺血性脑病 (HIE) 的病因, 选择 200 例确诊的 HIE 病例和同期同医院出生的正常新生儿 200 例, 然后对母亲孕期病史及分娩情况进行回顾性分析, 调查 HIE 相关的危险因素, 这种研究方法是

A. 病例对照研究

B. 实验研究

C. 现况研究

D. 临床随访研究

E. 前瞻性研究

【答案】 A

16、肝癌血行转移至肝外最多见于

A. 肾

B. 胰

C. 骨

D. 肺

E. 胃

【答案】 D

17、右手环指远端缺损骨外露, 下列哪种方法不适采用

A. 缩短指骨, 缝合皮肤

- B. 中厚皮片植皮
- C. 带蒂皮瓣移植
- D. 推进皮瓣移植
- E. 鱼际皮瓣转位

【答案】 B

18、男性，25岁。因高位小肠瘘1天入院，入院后经颈内静脉插管滴入肠外营养液，两周后突然出现寒战、高热，无咳嗽、咳痰，腹部无压痛和反跳痛

- A. 用抗生素
- B. 胸腔穿刺抽气
- C. 停止肠外营养
- D. 气管切开
- E. 增加胰岛素用量

【答案】 A

19、女大学生，21岁，来到心理咨询室诉说其恋爱生活的经历，她交往了几个男朋友。处于十分矛盾之中，难以抉择。此时心理咨询师最应注意的处理原则是

- A. 回避原则
- B. 真诚原则
- C. 中立原则
- D. 乐观原则
- E. 耐心原则

【答案】 C

20、知识点：医师执业活动

- A. 遵守法律、法规, 遵守技术规范
- B. 关心爱护尊重患者, 保护患者的隐私
- C. 努力钻研业务, 更新知识, 提高专业水平
- D. 依法获得劳动报酬
- E. 宣传卫生保健知识, 对患者进行健康教育

【答案】 D

21、男性, 38 岁, 发冷发热寒战, 头晕 3 天, 体温 38℃, 巩膜黄染, 肝肋下 2.5cm, 尿胆原阳性, 尿镜下无红细胞, 尿隐血阳性, 过去有肝炎史, 诊断

- A. 慢性肝炎急性发作
- B. 胆石症
- C. 急性黄疸型肝炎
- D. 溶血性贫血
- E. 以上全不是

【答案】 D

22、初产妇, 25 岁。宫口开全 1.5 小时, 胎头已达盆底, 持续性枕左横位。最恰当的处理是

- A. 缩宫素静脉滴注
- B. 等其自然回转
- C. 人工协助顺时针转动胎头 90°
- D. 人工协助逆时针转动胎头 90°
- E. 行会阴后一侧切开术

【答案】 D



23、男，38岁，间歇性水肿十余年，伴恶心、呕吐1周。血压155/110mmHg；血常规示血红蛋白(Hb)80g/L；尿常规：尿蛋白++，颗粒管型2~3/HP；血肌酐(Cr)485 $\mu$ mol/L。

- A. 肾功能正常期
- B. 肾功能不全代偿期
- C. 肾功能不全氮质血症期
- D. 肾衰竭期
- E. 尿毒症期

【答案】 D

24、(2001)必须监测出凝血状况的是

- A. 卡托普利
- B. 双嘧达莫(潘生丁)
- C. 低分子肝素
- D. 甲泼尼龙(甲基泼尼松龙)
- E. 呋塞米(速尿)

【答案】 C

25、根据老年人的代谢特点，老年人的饮食应

- A. 低蛋白、低脂肪、热量较低
- B. 高蛋白、高脂肪、热量较高
- C. 高蛋白、低脂肪、热量较低
- D. 低蛋白、高脂肪、热量较低
- E. 低蛋白、高脂肪、热量较高

【答案】 C

26、肺心病发生心力衰竭时首选的治疗是

- A. 立即使用抗心律失常药
- B. 使用快速作用的强心药
- C. 有效控制感染
- D. 纠正酸碱失衡
- E. 使用利尿药

【答案】 C

27、男性，61岁。进行性消瘦、低热、食欲不振，伴右上腹胀痛3个月。查体：皮肤黏膜无黄染，浅表淋巴结无肿大，心肺检查无异常，肝肋下1.5cm，剑突下4.0cm可及。白细胞 $4 \times 10^9/L$

- A. 肝硬化
- B. 肝癌
- C. 肝囊肿
- D. 肝结核
- E. 肝脓肿

【答案】 B

28、男性，70岁。有慢性支气管炎、肺气肿病史。因畏寒、发热，伴咳嗽、气急5天就诊。住院后，高热不退，气急、发绀明显，咳黏稠脓性血痰。X线片示右肺上叶大片密度增高的阴影，内有多个小透亮区，水平叶裂呈弧形下坠。最可能的诊断是

- A. 肺炎球菌肺炎
- B. 肺脓肿

- C. 克雷伯杆菌肺炎
- D. 干酪性肺炎
- E. 金黄色葡萄球菌肺炎

【答案】 C

29、女性，20岁，头昏乏力，鼻出血伴牙龈出血1周，Hb82g/L，WBC $45 \times 10^9$ /L，血小板 $25 \times 10^9$ /L，骨髓增生极度活跃，原始细胞0.5，早幼粒细胞0.2，POX强阳性，NAP阴性，非特异性酯酶部分呈阳性反应，不被NAF抑制，确诊急性非淋巴细胞白血病，其FAB分型是

- A. M2
- B. M1
- C. m4
- D. M3
- E. M5

【答案】 A

30、肾结核时肾受累的部位首先应在

- A. 肾小管祥
- B. 肾小球
- C. 肾乳头
- D. 肾盖
- E. 集合管

【答案】 B

31、高泌乳素血症的药物治疗首选

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/325203313240011232>