


近年护理考试知识点汇总



1、下列病毒的特征哪项是错误的 b

- A.只有DNA或RNA
- B.严格细胞内寄生
- C.有易感细胞的受体
- D.大多数只能用电子显微镜观察
- E.能通过滤菌器

2、男，40岁，因高度浮肿，大量蛋白尿，诊断肾病综合征入院。肾穿活检病理为：“微小病变型”。即予泼尼松60mg/日口服，症状有所控制。治疗3周后，又出现双下肢浮肿加重，大量蛋白尿，肾功能减退。此时首先应考虑

- A.急性肾衰竭
- B.感染
- C.肾静脉血栓形成
- D.糖皮质激素冲击
- E.加用细胞毒药物

标准答案：C

3、心肺复苏时胸外按压的正确部位是：（A）

- A 胸骨中下1/3处
- B 胸骨中部1/3处
- C 胸骨下段1/3处
- D 胸骨右缘处
- E 胸骨右缘处

4、心房颤动最常发生于 A

- A.二尖瓣狭窄
- B.扩张型心肌炎
- C.甲状腺机能亢进
- D.高血压性心脏病
- E.冠状动脉硬化性心脏病

5、颈外静脉输液，最佳穿刺点在

- A. 下颌角与锁骨上缘中点联线下1/3处
- B. 下颌角与锁骨下缘中点联线下1/3处
- C. 下颌角与锁骨下缘中点联线上1/3处
- D. 下颌角与锁骨上缘中点联线上1/3处

E. 下颌角与锁骨上缘中点连线中 1/3 处答案: D

6、.DDT 和六六六中毒时洗胃用 D

A.石灰水 B.蛋白水 C.醋酸 D.温开水或 0.9%氯化钠注射液 E1: 5000 高锰酸钾溶液

7、在为体检病人量血压时, 测量方法不正确的是

A. 测量前让病人休息 B. 病人坐位时肱动脉平第四肋软骨 C. 将病人的衣袖卷至肩部

D. 袖带平整缠在上臂下部 E. 袖带松紧度以能放入一指为宜答案: D

8、胎方位是指:B

A.最先进入骨盆入口平面的胎儿部分 B.胎儿先露某一指示点与骨盆前后左右的关系

C.适应宫腔的胎儿姿式 D.胎儿纵轴与母体纵轴之间的关系 E.以上均不对

9、进行口对口人工呼吸时注意事项中不包括 E

A.吹气量应使胸廓抬起 B.吹气时间约占 1 次呼吸周期 1 / 3C.操作前取下义齿 D.牙关紧闭者可做口对鼻吹气 E.人工呼吸不应与自主呼吸同步

10、胃大部切除手术后并发症 A

A.倾倒综合征 B.粘连性肠梗阻 C.湿疹 D.手足抽搐 E.多器官功能衰竭

67 腹膜炎合并血尿淀粉酶升高 B

A.急性阑尾炎 B.急性胰腺炎 C.胃十二指肠溃疡穿孔 D.肠梗阻 E.胆道蛔虫病

11、张先生, 66 岁, 车祸撞伤脑部, 出血后出现深昏迷, 脑干反射消失, 脑电波消失, 无自主呼吸, 病人以上表现应属于

A. 濒死期 B. 临床死亡期 C. 生物学死亡期 D. 疾病晚期 E. 脑死亡期答案: B

12、程先生, 20 岁, 擦玻璃时不慎从楼上跌下, 造成严重颅脑损伤, 需随时观察、抢救, 入院后对此病人的护理应给予

A. 特别护理 B. 一级护理 C. 二级护理 D. 三级护理 E. 个案护理答案: A

13、关于高血压危象的叙述，下列哪项不正确

- A. 主要由于脑部血管痉挛而致
- B. 收缩压可达 33.8kpa (253mmHg)
- C. 舒张压 \geq 15.6kpa (117mmHg)
- D. 可见于急进型高血压
- E. 可有高血压脑病的表现

本题正确答案：A

297. 病人痰液有恶臭味，判定为何种细菌感染

- A. 病毒
- B. 绿脓杆菌
- C. 厌氧菌
- D. 霉菌
- E. 化脓菌

本题正确答案：C

298. 妊娠合并心脏病的孕妇在妊娠期易发生心衰的时间是

- A. 孕 20~24 周
- B. 孕 25~30 周
- C. 孕 32~34 周
- D. 孕 35~36 周
- E. 孕 37~39 周

本题正确答案：C

299. 食管癌根治术后的饮食护理，错误的是

- A. 禁食硬质。带刺食物
- B. 肠功能恢复后进流食
- C. 术后 2 周进无渣半流质
- D. 饭后 2 小时内取半卧位
- E. 2~3 日内严格禁食禁饮

本题正确答案：B

300. 下肢骨牵引病人的护理，错误的是

- A. 抬高床头
- B. 常测肢体长度
- C. 足不抵住床栏
- D. 保护牵引针孔的血痂
- E. 肢体纵轴与牵引力线一致

本题正确答案：A

14、有关"护理程序"概念的解释，哪项不妥

- A. 是指导护士工作及解决问题的工作方法 B. 其目标是增进或恢复服务对象的健康
- C. 是以系统论为理论框架 D. 是有计划、有决策与反馈功能的过程
- E. 是由估计、诊断、计划、实施四个步骤组成

15、女，45岁。饱餐后出现上腹部剧烈疼痛10小时，向后背放射，屈曲位腹痛减轻，伴呕吐。有胆囊结石病史。

查体：腹软，上腹部有压痛、反跳痛，Murphy征阴性，肠鸣音弱。最可能的诊断是

- A. 急性胆囊炎
- B. 消化道穿孔
- C. 急性胰腺炎
- D. 急性阑尾炎
- E. 急性心肌梗死

标准答案：C

16、肌内注射可选择

- A. 肩峰下1指处 B. 髂前上棘与尾骨联线中1/3处 C. 髂前上棘内侧三横指处
- D. 大腿中段内侧 E. 大腿中段外侧

17、皮内注射时，皮肤消毒剂为 A

A.70%酒精 B.2.5%的碘酊→70%酒精 C.0.5%碘酊 D.1:1000 氯化高汞 E.0.5%过氧乙酸

52 为了安全用氧，氧气筒应远离火源:E

A.>B.>C.>D.>E.>

18、书写病区报告的顺序是先写

A. 施行手术病人 B. 转入病人 C. 危重病人 D. 新人院病人 E. 转出病人答案: E

19、万女士，27岁，怀孕9个月，阴道无诱因流水2小时急诊入院，诊断为胎膜早破，此病人应采取的卧位是

A. 头高脚低位 B. 去枕平卧位 C. 头低脚高位 D. 仰卧屈膝位 E. 膝胸卧位答案: C

20、结核性腹膜炎的临床表现为 D

A 腹泻 B 腹痛 C 便秘 D 主要是结核病的全身毒血症状 E 便血

21、无菌持物钳的正确使用方法是 B

A.可夹取任何无菌物品 B.取放无菌持物钳时，钳端应闭合 C.门诊换药室的无菌钳，每周消毒一次

D.到远处取物时应速去速回 E.使用时持物钳钳端向上

22、实施乙醇擦浴降温操作不妥的是: (C)

A 帮助患者暴露擦浴部位 B 按正确方法及顺序擦浴 C 头部置热水袋，足底部置冰袋

D 随时观察患者病情变化 E 擦拭完毕半小时后测量体温

23、高渗性非酮症糖尿病昏迷患者无休克，已经输入2000ml生理盐水，测血钠155mmol/L，血浆渗透压

368mmol/L，继续治疗应用哪种液体较好 c

%氯化钠 B.0.85%氯化钠 C.5%葡萄糖 D.10%糖盐水 E.5%碳酸氢钠

34 大量饮清水后尿量增多，主要是由于 C

A 肾小球滤过率增高 B 血浆胶体渗透压降低 C 抗利尿激素分泌降低 D 醛固酮分泌降低 E 囊内压降低

24、马女士，75岁，肺源性心脏病出现呼吸困难、咳嗽、咯痰等症状，现采取鼻导管氧气吸入，病情好转，病人要进食时，应

A. 先关流量开关，后拔管 B. 先关总开关，后拔管 C. 分离氧气管道，鼻导管保留

D. 先拔管再关流量开关 E. 边进食边吸氧 答案：D

25、正常人每日无形失水量为：【B】

A、200ml

B、850ml

C、400ml

D、1000ml

E、100ml

352、各种类型休克基本病理变化是：【E】

A、血压下降

B、中心静脉压下降

C、脉压减小

D、尿量减少

E、有效循环血量锐减

353、为预防急性肾衰竭，哪种外伤病人，应从静脉输入碱性溶液以碱化尿液：【C】

A、前臂裂伤

B、肾挫伤

C、大腿挤压伤

D、肋骨骨折

E、头皮撕脱伤

354、心脏骤停后最容易发生的继发性病理变是：【D】

A、肺水肿

B、急性肾衰竭

C、急性肝坏死

D、脑缺氧和脑水肿

E、心肌缺氧性损伤

26、急性巴比妥类药中毒时最主要的并发症和致死原因是 A

A.呼吸和循环衰竭 B 中毒性休克 C.大出血 D.急性肾衰竭 E.急性肝衰竭

363 休克病人监测补液最简易实用而可靠的指标是:C

A.血压 B.肺动脉楔压 C.尿量 D.颈动脉充盈度 E.中心静脉压

27、血液占成人体重的 E

A.7%到 8%B.10%到 15%C.20%到 30%D.40%到 50%E.60%

28、为病人进行热疗时，下列说法正确的是

A. 温水擦浴时水温应为 B. 麻醉未清醒的病人应用热水袋温度为~C. 温水坐浴时水温应为~D. 湿热敷时水温应为~

E. 局部浸泡时水温应为答案：A

29、败血症表现为哪种热型

A. 稽留热型 B. 回归热型 C. 波状热型 D. 弛张热型 E. 不规则热型答案：A

30、男，58岁。反复上腹痛20年，近2个月出现进食后腹胀，恶心，呕吐隔夜宿食，体重减轻。为明确诊断，应首选的检查方法是

A.腹部

B.腹部B型超声

C.立位腹部透视

D.胃镜

E.腹部

标准答案：D】

394、男，65岁。15小时前因咳嗽而突然右下腹剧烈疼痛，右侧阴囊亦肿胀疼痛。右侧腹股沟区呈梨形隆起，不能回纳。考虑诊断

A.睾丸鞘膜积液

B.嵌顿疝

C. 睾丸癌

D. 急性睾丸炎

E. 附睾结核

标准答案：B

31、张女士，26岁，妊娠10个月，急诊检查宫口已开需住院，住院处护士首先应

A. 办理入院手续 B. 进行沐浴更衣 C. 进行会阴清洗 D. 让产妇步行入病区 E. 用平车送产房待产答案：E

32、输入大量库存过久的血可导致 D

A. 低钠血症 B. 低钾血症 C. 高钠血症 D. 高钾血症 E. 低镁血症

33、预防溶血反应的措施包括

A. 严格执行无菌操作 B. 输血前肌注异丙嗪 C. 做好血液质量检查

D. 输血前静注10%葡萄糖酸钙 E. 输血前静注地塞米松答案：C

34、最容易产生谷丙转氨酶增高的是 B

A 肝细胞再生 B 肝细胞变性坏死 C 炎症细胞浸润 D 肝实质细胞蛋白合成功能阻碍 E 结缔组织增生

35、下述哪项是早期宫颈癌的临床症状 C

A. 更年期周期短的阴道流血 B. 生育年龄月经前后的点滴出血

C. 接触性出血 D. 绝经后的出血 E. 阴道水样排液

36、男性，35岁。2周前感冒后发寒、发热、咳嗽，1周前咳大量脓性痰，痰中带血，经青霉素、头孢噻肟等治疗无效。体检：体温，呼吸急促，双肺中下闻及湿啰音。血白细胞计数 $25 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 0.90。X线胸片显示双肺中下斑片状实变阴影，并有多个脓肿和肺气囊肿。本例诊断应首先考虑为

A. 肺炎球菌肺炎

B. 葡萄球菌肺炎

C. 克雷白杆菌肺炎

D. 支原体肺炎

E.干酪性肺炎

标准答案：b

37、物理降温半小时测得体温记录在降温前的同一纵格内的符号是 b

A.红点红虚线 B.红圈红虚线 C.蓝点蓝圈 D.蓝圈蓝虚线 E.蓝圈红虚线

38、面部危险三角区感染化脓时，禁忌用热，其原因是

A. 易加重局部出血 B. 易加重病人疼痛 C. 易导致面部烫伤 D. 易导致颅内感染

E. 易掩盖病情答案：D

39、血沉无明显增快的疾病是：【A】

A、心绞痛

B、恶性肿瘤晚期

C、急性心肌梗塞

D、活动性结核

E、慢性肾炎

347、尿蛋白定量标本瓶中的防腐剂是：【A】

A、甲苯

B、稀盐酸

C、甲醛

D、碳酸

E、浓盐酸

348、尿液呈酱油色见于：【B】

A、阻塞性黄疸

B、急性溶血

C、肝细胞性黄疸

D、肾脏肿瘤

E、晚期丝虫病

349、下列 T 波中属于不正常的是：【B】

- A、I 导联直立
- B、V5 导联倒置
- C、aVR 导联倒置
- D、aVR 导联平坦
- E、V1 导联双向

350、现代化设备手术室的空气净化主要依靠：【B】

- A、臭氧消毒
- B、层流装置和高效能空气过滤器
- C、乳酸消毒
- D、紫外线消毒
- E、甲醛消毒

40、不属于热疗目的的是

- A. 促进炎症的消散或局限 B. 解除疼痛 C. 抑止炎症扩散，防止化脓 D. 减轻深部组织的充血
- E. 保暖，使病人舒适答案：C

41、担负体液免疫功能的细胞是 C

AT 细胞 BK 细胞 CB 细胞 DNK 细胞 E 巨噬细胞

42、原发性腹膜炎腹腔穿刺液 E

- A.血性液体 B.粪臭味液体 C.不凝固血液 D.稀薄的肠内容物 E.稀薄、无臭味的脓液

43、胎儿先露的指示点与母体骨盆前后左右横的关系 B

- A.胎产式 B.胎方位 C.胎位 D.胎动 E.胎先露

44、李先生，自感全身不适前来就诊。门诊护士巡视时发现他面色苍白，出冷汗，呼吸急促，主诉腹痛剧烈。

急诊医生处理后，李先生留住急诊观察室。你在评估病人时，下述哪项是客观资料

- A. 腹痛难忍 B. 感到恶心 C. 睡眠不佳 D. 心慌不适 E. 面色苍白答案：E

45、陈先生，73岁，胃癌晚期，近日病情加重，常抱怨家属照顾欠周到，要求停止治疗。此病人心理反应属于

A. 否认期 B. 愤怒期 C. 协议期 D. 忧郁期 E. 接受期 答案：B

46、万女士，27岁，怀孕9个月，阴道无诱因流水2小时急诊入院，诊断为胎膜早破，此病人应采取的卧位是

A. 头高脚低位

B. 去枕平卧位

C. 头低脚高位

D. 仰卧屈膝位

E. 膝胸卧位

答案：C

292. 强酸、强碱中毒最适合用哪种物质作保护剂

A. 茶叶水

B. 阿托品

C. 呋塞咪

D. 依地酸二钠

E. 蛋清

答案：E

293. 人类基本需要是

A. 生理的需要是指个体需要有保障、受保护

B. 安全的需要是指个体渴望归属于某一群体

C. 尊重的需要是指个体希望爱与被爱

D. 自我实现的需要是指个体有自尊、被尊重和尊重人的需要

E. 爱与归属是指个体渴望归属于某一群体，希望爱与被爱

答案：E

294. 按医疗技术水平划分可将医院分为

A. 综合性医院

B. 专科医院

C. 个体所有制医院

D.企业医院

E.一、二、三级医院

答案：E

295.以下哪些部分在穿脱隔离衣时要避免污染

A.腰带以下部分

B.腰带及衣边

C.袖子的后面

D.衣领及里面

E.胸前及背后

答案：D

47、王先生，55岁，因脑外伤，在全麻下行开颅探查术。病房护士应为病人准备

A. 暂空床，床中部和床上部各加一橡胶中单、中单

B. 麻醉床，床中部和床上部各加一橡胶中单、中单

C. 备用床，床中部和床上部各加一橡胶中单、中单

D. 暂空床，床中部和床尾部各加一橡皮中单、中单

E. 麻醉床，床中部和床尾部各加一橡胶中单、中单答案：B

48、男性，70岁，乏力、厌食、体重减轻半年入院，查体：右侧腹部可触及×肿块，血常规：血红蛋白/L，该病人最可能的诊断是：

A.乙状结肠癌

B.升结肠癌

C.阑尾类癌

D.横结肠癌

E.降结肠癌

标准答案：B

49、在为病人大量输入库存血后易导致出血倾向的发病机制是；答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/327122011065006111>