

# 西医综合真题答案——内外科

基础部分题目答案（标红部分为纠正内容）

## 一、诊断学

57. 下列可导致发绀的疾病中，属于混合性发绀的是 C 20 页

- A. 肺栓塞
- B. 阻塞性肺气肿
- C. 心力衰竭
- D. 亚硝酸盐中毒

58. 下列疾病中，可出现杵状指（趾）的是 A

- A. 肝硬化
- B. 慢性支气管炎
- C. 肢端肥大症
- D. 缺铁性贫血

59. 女性，32岁，患特发性肺动脉高压，可能出现的体征是 B

- A. 心尖搏动呈抬举样
- B. 心尖搏动向左侧移位
- C. 心尖部可闻及收缩期杂音并向左腋下传导
- D. 心底部第2心音逆分裂

女性，24岁。3周前上感发热，咽痛，1周来乏力、头晕，晨起颜面发胀，继而出现下肢水肿、食欲下降、尿少。自幼体弱，患有房隔缺损，平素活动尚可。查体：T37.2摄氏度，P88次/分，BP150/90 mmHg，发育营养稍差，自主体位，双眼睑水肿，颈静脉无怒张，双肺(-)，心界不大，心律整，心音正常。P2>A2，腹软，肝脾未及，下肢凹陷性水肿(+)。

91、该患者水肿最可能的类型是 B

- A. 心源性
- B. 肾源性
- C. 肝源性
- D. 营养不良

92、导致该患者水肿最可能的机制是 A

- A. 钠、水潴留
- B. 血管通透性增高
- C. 低蛋白血症
- D. 静脉压增高

## 二、内科学

60. 男性，60岁，因1年来反复发生夜间阵发性呼吸困难，2个月来心悸、气短、不能平卧、尿少、下肢水肿来院，3年前患广泛前壁心肌梗死。入院查体：T36.7℃，P67次/分，BP120/65 mmHg，

半卧位，颈静脉充盈，双肺底均可闻及湿性啰音，心界扩大，心律不整，心率 98 次/分，心音强弱不等，肝肋下 50px，双下肢凹陷性水肿（++）。该患者治疗中，不适宜选用的药物是 C

A. 洋地黄

B. 华法林

C.  $\beta$  受体拮抗剂

D. 血管紧张素转换酶抑制剂

见于内科学 171 页。

61. 有关高血压急症治疗原则，不对的是 D

A. 使用静脉制剂迅速降压

B. 60 分钟内降压幅度不超过 25%

C. 2~6 小时内将血压降至正常水平

D. 无临床症状及靶器官损害证据者，可采取口服降压药治疗

见于内科学 268 页。

62. 女性，36 岁，因偶发心悸 3 天来诊，既往有「预激综合征」，无心动过速发作史。查体：P80

次/分，BP110/70 mmHg，双肺（-），心界不大，偶发早搏 0~3 次/分，心音正常。24 小时心态

心电图示单发房性期前收缩 98 次。该患者应首选的治疗方案是 A

A. 观测病情，暂不用药

B. 应用 Ic 类抗心律失常药

C. 选用钙通道阻滞剂

D. 立即行射频消融术

见于内科学 186 页，心率不快也无严重血流动力学障碍。

63. 急性肺脓肿停用抗菌药物治疗的指征是 D

A. 体温正常

B. 痰恶臭味消失

C. 血白细胞正常

D. 胸片显示脓腔消失

见于内科 60 页。

64. 男性，66 岁。进行性呼吸困难伴干咳 1 年，无吸烟史。查体：双下肺可闻及爆裂音，可见杵状

指。胸部 HRCT 提示双下肺蜂窝状变化。最可能的肺功能指标变化是？ B

A. FEV1/FEV 减低

B. TLC 减低

C. RV 增高

D. DLco 增高

见于内科 89 页

65. 支气管哮喘急性发作首选的药物治疗措施是 C

- A. 静脉注射氯茶碱
- B. 雾化吸入异丙托溴铵
- C. 雾化吸入沙丁胺醇
- D. 静脉使用糖皮质激素

见于内科 34 页。

66. 诊断胃食管反流病最精确的措施是 D

- A. 食管吞钡 X 线检查
- B. 食管测压
- C. 24 小时食管 pH 监测
- D. 胃镜检查

见于内科 358

67. 临床上服用下列药物时，不影响对幽门螺杆菌病原检测的是 C

- A. 奥美拉唑
- B. 枸橼酸铋钾
- C. 米索前列醇
- D. 呋喃唑酮

见于内科 366 页，C 没有克制或者杀灭 HP 作用。

68. 男性，45 岁。间断发生腹痛、腹泻 5 年，发作时大便 2~4 次每天，有时便中有黏液无脓血，排便后腹痛可缓解，因再发 1 周来诊。查体：左下腹轻压痛。化验粪常规：WBC 0-1 个/HP，隐血试验（一），细菌培养（一）。该患者最可能的诊断是 B

- A. 慢性细菌性痢疾
- B. 肠易激综合症
- C. 克罗恩病
- D. 溃疡性结肠炎

见于内科 386 页，CD 有脓血，A 有感染。

69. 急性肾小管坏死维持期出现的试验室检查异常是 A

- A. 血尿素氮与肌酐的比值减低
- B. 血红蛋白中度以上减低
- C. 血钾浓度减低
- D. 尿钠浓度减低

见于内科 519 页。

70. 男性，32 岁。5 天来眼睑及下肢水肿入院。6 年前患病毒性乙型肝炎。查体：BP 140/82 mmHg，双眼睑水肿，巩膜无黄染，心肺检查未见异常，腹软，肝脾触诊不满意，腹部移动性浊音阳性，双下肢凹陷性水肿（++）。化验尿常规：蛋白（++++），沉渣镜检 RBC 2~5/HP。血清白蛋白 20 g/L。

对诊断和治疗最故意义的检查是 D

- A. 24 小时尿蛋白定量
- B. 肝功能和 HBsAg 检查
- C. 血胆固醇测定
- D. 肾穿刺病理学检查

见于内科 461 页。

71. 下列外周血化验检查最有助于判断骨髓增生程度的是 C

- A. 血红蛋白测定
- B. 红细胞计数
- C. 网织红细胞计数
- D. 血细胞比容测定

见于 541 页。

72. 男性，15 岁。左膝外伤后关节肿胀、疼痛 2 天。自幼外伤后易出血不止。查体：左膝关节处皮肤见一瘀斑，左膝关节肿胀，局部有压痛。该患者下列试验室检查中最有可能出现的异常是 B

- A. 凝血酶原时间（PT）
- B. 活化部分凝血酶时间（APTT）
- C. 凝血酶时间（TT）
- D. 血纤维蛋白原测定

见于 630 页，血友病。

73. 对鉴别糖尿病酮症酸中毒与高渗高血糖综合症意义最小的检查是 C

- A. 血糖测定
- B. 尿酮体检查
- C. 血气分析检查
- D. 血电解质检查

见于 752 至 756。

74. 男性，31 岁。3 个月来感全身乏力、手颤，体重下降 7 kg。4 小时前起床时感双下肢不能活动。

既往体健。查体：心率 120 次/分。血  $K^{+}2.7 \text{ mmol/L}$ ， $Na^{+}140.6 \text{ mmol/L}$ ， $Cl^{-}105.1 \text{ mmol/L}$ ， $HCO_3^{-}25.3$

$\text{mmol/L}$ 。患者最可能的诊断是 B

- A. 家族性周期性麻痹
- B. 甲状腺毒症性周期性瘫痪
- C. 肾小管酸中毒
- D. 原发性醛固酮增多症

见于内科学 686 页。

75. 首发累及近端指间关节、掌指关节和腕关节的风湿性疾病是 A

- A. 类风湿关节炎
- B. 骨关节炎



- C. 强直性脊柱炎
- D. 系统性红斑狼疮

见于内科 809 页。

76. 抗 ENA 抗体谱中不包括的抗体是 C

- A. 抗 RNP 抗体
- B. 抗 SSB (La) 抗体
- C. 抗 dsDNA 抗体
- D. 抗 Sm 抗体

见于 818 页。

(93-95) 题共用题干

男性，70 岁，三个月前出现活动后胸闷伴头晕，曾晕厥一次，近一周来上一层楼即感心前区绞痛，2 小时前因再次感胸痛伴短暂晕厥来院，既往糖尿病史 12 年，吸烟 35 年。入院查体，P82 次/分，BP100/85 mmHg，神清，经静脉无怒张，双肺 (-)，心尖搏动呈抬举状，心界向左下扩大，心律整，S1 低钝，胸骨右缘第二肋间可闻及 3-6 级收缩期吹风样杂音，粗糙，呈喷射状，向颈部放散，A2<P2，下肢不肿。

93、导致患者出现上述临床体现最可能的心脏疾病是 B

- A. 肥厚型梗阻性心肌病
- B. 主动脉瓣狭窄

C. 不稳定性心绞痛

D. 病态窦房结综合症

A: 心室不对称性肥厚而无心室腔增大为特性，且杂音不传导，故排除（有心界向左下扩大）。

B: 心绞痛、晕厥、心衰为三联征。

94、对明确诊断意义最大的无创性检查是 D

A. 常规体表心电图

B. 24 小时动态心电图

C. 冠状动脉 CT

D. 超声心动图

95、为缓解胸痛、晕厥症状，应选用的最佳治疗措施是 D

A. 长期口服硝酸酯类药物

B. 应用大剂量  $\beta$  受体拮抗剂

C. 冠状动脉介入治疗

D. 心脏瓣膜置换术

凡出现上述症状者均应考虑手术，D。309 页。

（96-98 题共用题干）

男性，75 岁。反复咳嗽、咳痰、喘息 30 年，活动后气短 2 年，加重 1 周。既往高血压病史 25 年，吸烟史 30 年，平均 1 包/日，已戒烟 2 年。查体：R22 次/分，双肺呼吸音低，偶闻及干鸣音，双下肺可闻及少许湿性啰音。

96、该患者最可能的诊断是 D

- A. 支气管哮喘
- B. 支气管扩张症
- C. 慢性心力衰竭
- D. 慢性阻塞性肺疾病

97、下列检查对诊断意义最大的是 B

- A. 血气分析
- B. 肺功能
- C. 超声心动图
- D. 胸部 HRCT

98、应采取的最重要治疗措施是 A

- A. 吸入支气管舒张剂
- B. 口服祛痰药物
- C. 口服利尿剂
- D. 静脉应用糖皮质激素

见于内科 25 页，支气管舒张剂是控制症状的重要措施，D 选项激素一般选择长期吸入。

(99-101 题共用题干)

女性，26 岁。腹胀、腹痛伴低热、盗汗 3 个月。查体发现腹部移动性浊音阳性。化验血 HBsAg (+)。

腹水常规：比重 1.023，蛋白定量 38 g/L，白细胞数  $610 \times 10^6/L$ ，其中单个核细胞为 80%。

99、该患者最可能的诊断是 B

- A. 肝硬化合并自发性腹膜炎
- B. 结核性腹膜炎
- C. 肝炎后肝硬化失代偿期
- D. 肝癌腹膜转移

患者低热、盗汗、腹水单核细胞增高，考虑结核感染。不要误选 B，腹水以多形核为主，内科学 383 页。

100、下列检查结果支持上述诊断的是 A

- A. 腹水腺苷脱氨酶 (ADA) 79.5U/L
- B. 血清—腹水白蛋白梯度 (SAAG) 12 g/L
- C. 腹水病理检查见到癌细胞
- D. 腹水培养见到来自肠道的革兰阴性菌

101. 该患者最宜选用的治疗是 C

- A. 对症支持治疗
- B. 应用广谱抗生素
- C. 抗结核治疗
- D. 全身联合肿瘤化疗

102~104 题共用题干)

男性，21 岁。肉眼血尿伴尿减少 6 天入院，2 周前曾有发热、咽痛。既往体健。查体：BP 156/95 mmHg，皮肤黏膜未见出血点和紫癜，双眼睑水肿，双下肢凹陷性水肿(++)。化验尿常规：蛋白(++)，沉渣镜检 RBC 50~60/HP；血肌酐 156 $\mu$ mol/L，尿素氮 11 mmol/L。

102. 该患者最可能的诊断是 A

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 急进性肾小球肾炎
- C. IgA 肾病
- D. 肾病综合症

患者有感染前驱史，无贫血、肾衰，因此不选 B。

103. 若进行肾穿刺病理学检查，最可能的病理类型是 C

- A. 系膜增生性肾小球肾炎
- B. 微小病变性肾小球肾炎
- C. 毛细血管内增生性肾小球肾炎

D. 新月体性肾小球肾炎

104. 该患者目前不适宜选用的治疗是 D

A. 限制盐的摄入

B. 利尿治疗

C. 降压治疗

D. 糖皮质激素与细胞毒药物治疗

自愈性疾病，不适宜选 D，见于内科 470-471 页。

(105~107 题共用题干)

男性，35 岁。牙龈出血、皮肤瘀斑及间断鼻出血 10 天入院。既往体健。化验血常规：Hb64 g/L，

WBC $10.5 \times 10^9/L$ , Plt $26 \times 10^9/L$ 。骨髓增生明显活跃，可见胞浆中有较多颗粒及 POX 染色强阳性的细

胞，部分可见成堆 Auer 小体，计数此种细胞占 65%。

105. 该患者最可能的诊断是 B

A. 急性淋巴细胞白血病

B. 急性早幼粒细胞白血病

C. 急性单核细胞白血病

D. 急性巨核细胞白血病

POX 染色 (MPO 染色) 阳性，代表髓系分化，分化程度越好，阳性程度越高；颗粒增多的早幼粒

细胞占 65%，选 B。

106. 支持上述诊断的细胞免疫学表型是 C

A. CD10 阳性、CD19 阳性

B. CD13 阳性、HLA-DR 阳性

C. CD13 阳性、HLA-DR 阴性

D. CD41 阳性、CD61 阳性

见于 581 页，APL 细胞体现 CD13、CD33 和 CD117，可体现 CD9，不体现 HLA-DR 和 CD34。

107. 该患者临床最轻易出现的并发症是 B

A. 高尿酸性肾病

B. 弥散性血管内凝血

C. 严重感染

D. 中枢神经系统白血病

见于内科 580 页，APL 易并发凝血异常而出现全身广泛性出血。

(108-110 题共用题干)

男性，34 岁，口渴，多尿，乏力 2 个月，1 天前外出饮酒，饱餐后上述症状加重，伴恶心，频繁呕吐，继而神志恍惚，急诊入院。既往有乙型肝炎病史。入院查体：BP85/50 mmHg，神志恍惚，皮肤粘膜干燥，心率 104 次/分，四肢发凉。

108. 该患者应首先考虑的诊断是 C

- A. 重症急性胰腺炎
- B. 急性食物中毒
- C. 糖尿病酮症酸中毒
- D. 肝性脑病

患者有诱因（酗酒）、恶心、呕吐、脱水（皮肤干燥），发病前有口渴、多尿等症状，考虑 C。

109. 为明确诊断，最重要的检查是 B

- A. 血淀粉酶
- B. 血糖及尿酮体
- C. 血氨
- D. 血渗透压

110. 该患者急诊应急处理对的是 A

- A. 迅速静脉输入生理盐水
- B. 即刻使用去甲肾上腺素
- C. 静脉输入葡萄糖
- D. 静脉输入支链氨基酸

内科 754 页，治疗原则。

- A. 重度心功能不全



B. 中度心功能不全

C. 轻度心功能不全

D. 心功能正常

139. 女, 70 岁。冠心病患者, 行 6 分钟步行试验, 步行距离为 420 米, 应判断为 B

140. 男, 45 岁。扩张性心肌病患者, 行 6 分钟步行试验, 步行距离为 145 米, 应判断为 A

见于内科学 163 页, 以 150m、450m 为分界点。

A. 肺泡通气量下降

B. 弥散障碍

C. 通气/血流比例失调

D. 肺内分流

141. 肺栓塞患者出现低氧血症最重要的机制是 C 100 页

142.COPD 患者出现低氧血症最重要的机制是 A 23 页

A. 病毒性肝炎后肝硬化

B. 酒精性肝硬化

C. 淤血性肝硬化

D. 原发性胆汁性肝硬化

143. 在我国最易引起原发性肝癌的肝硬化类型是 A 419 页

144. 肝脏明显缩小的肝硬化类型是 A

169. 感染性心内膜炎可以接受人工瓣膜置换术的适应症有 BCD

- A. 伴发急性心肌梗死
- B. 严重瓣膜反流致心力衰竭
- C. 真菌性心网膜炎
- D. 赘生物直径 $\geq 10$  mm

内科学 327 页，

170.HIV/AIDS 并发肺结核的特点有 ABD

- A. 结核菌素试验常为阴性
- B. 下叶病变多见
- C. 轻易出现空洞
- D. 出现药物不良反应较多

内科学 73 页。

171. 下列药物中毒时，采用血液透析治疗有效的有 ABC

- A. 苯巴比妥
- B. 茶碱
- C. 水杨酸类
- D. 有机磷杀虫药

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/328062016140006053>