

第五章 血液系统疾病病人的护理

第一节 缺铁性贫血病人的护理

【A1 型题】

1.小细胞低色素性贫血常见于

- A.巨幼细胞贫血
- B.缺铁性贫血
- C.溶血性贫血
- D.失血性贫血
- E.再生障碍性贫血

2.我国最常见的的贫血类型为

- A.再生障碍性贫血
- B.巨幼细胞性贫血
- C.缺铁性贫血
- D.恶性贫血
- E.溶血性贫血

3.含铁量最少的食物是

- A.蛋黄
- B.牛奶
- C.豆类
- D.黑木耳
- E.瘦肉

4.体铁吸收的主要部位是

- A.胃
- B.十二指肠及空肠上端
- C.空肠下端
- D.结肠
- E.直肠

5.缺铁性贫血的主要病因是

- A.慢性失血
- B.铁的摄入不足
- C.铁的吸收不良
- D.铁的需要量增加
- E.骨髓造血功能下降

6.导致女性缺铁性贫血最常见的原因是

- A.妊娠
- B.胃大部分切除术后
- C.育龄妇女
- D.月经过多
- E.缺乏维生素 B₁₂

7.最能反映贫血的实验室检查指标是

- A.红细胞计数
- B.红细胞沉降率
- C.网织红细胞计数
- D.血红蛋白定量
- E.血清蛋白定量

8.可准确反映贫血患者体贮存铁情况，能作为缺铁依据的指标是

- A.血清铁蛋白
- B.含铁血黄素
- C.血清铁
- D.总铁结合力
- E.骨髓铁染色

9.彻底治疗缺铁性贫血的关键在于

- A.给予含铁丰富食物
- B.口服铁剂
- C.注射铁剂

- D.去除病因
- E.应用应用糖皮质激素

10.补充铁剂治疗贫血最佳给药途径是

- A.静脉注射
- B.肌肉注射
- C.皮下注射
- D.皮注射
- E.口服

11.口服硫酸亚铁必有的不良反应是

- A.黑便
- B.便秘
- C.腹泻
- D.破坏牙釉
- E.腹痛

12.贫血最突出的体征是

- A.头晕
- B.记忆力减退
- C.皮肤黏膜苍白
- D.心悸
- E.耳鸣

13.贫血病人皮肤粘膜苍白最易观察的部位

- A.面颊
- B.口腔粘膜
- C.前胸
- D.睑结膜、口唇、甲床
- E.手背

14.缺铁性贫血患者脑组织中铁依赖酶活性降低会出现

- A.面色苍白

- B.疲乏
- C.头晕
- D.耳鸣
- E.异食癖

15.缺铁性贫血患者口服铁剂的护理错误的是

- A.宜于进餐后服用
- B.可与维生素 C 同服
- C.禁饮浓茶
- D.如有消化道反应, 可与牛奶同服
- E.液体铁剂应经稀释后用吸管服用, 以防破坏牙釉

16.关于口服铁剂治疗缺铁性贫血叙述错误的是

- A.从小剂量开始以减少胃肠道反应
- B.与维生素 C 同用可增强效果
- C.服药后常出现大便发黑
- D.血象恢复正常后可马上停药
- E.服药 2 小时禁止饮浓茶

17.缺铁性贫血患者应选择含铁丰富的食物是

- A.低蛋白质
- B.低维生素
- C.动物脏
- D.牛奶
- E.谷类

【A2 型题】

18.患者女性, 35 岁。常年月经量过多, 近来出现头晕、乏力、面色苍表, 医院诊断为贫血, 其诊断依据为单位容积外周血液中

- A.红细胞数或血红蛋白量低于正常
- B.红细胞数和血红蛋白量低于正常
- C.红细胞数和血细胞比容低于正常

D.红细胞数和网织红细胞数低于正常

E.红细胞数、血红蛋白浓度和（或）血细胞比容低于正常

19.患者男性，56岁。患溃疡病8年，经常胃出血，经医院检验 Hb90g/L，RBC $3.8 \times 10^{12}/L$ ，确诊为缺铁性贫血。该患者发生贫血的主要原因是

A.慢性失血

B.缺乏清蛋白

C.缺乏维生素 B12

D.缺乏胃蛋白酶

E.缺乏叶酸

20.患者女性，38岁。4年前曾行胃大部切除术，数月来感疲乏无力。查体：皮肤粘膜苍白，舌乳头萎缩，血红蛋白 60g/L，白细胞 $5.0 \times 10^9/L$ ，血小板 $150 \times 10^9/L$ 。该病人发生贫血最主要的原因是

A.铁需要量增加

B.铁吸收不良

C.铁丢失过多

D.铁摄入不足

E.铁利用障碍

21.患者男性，32岁。诊断为缺铁性贫血，

目前正给予口服硫酸亚铁治疗，该患者实验室检查最早升高的指标是

A.红细胞计数

B.网织红细胞计数

C.血红蛋白值

D.血清铁

E.骨髓铁

22.患者男性，29岁。消化性溃疡病史5年，缺铁性贫血患者，口服硫酸亚铁 0.3g，每日3次进行治疗。护士指导患者应采用的服药方法是

A.每间隔8小时服药一次

B.三餐饭前服用

- C.三餐饭后服用
- D.任何时间都可以
- E.睡前服药

23.患儿女性，9个月。因2个月来皮肤苍白，食欲减退入院。出生后一直人工喂养，未添加辅食。体检：营养差，皮肤粘膜苍白。化验：血红蛋白 60g/L，红细胞 $3.0 \times 10^{12}/L$ 。护士考虑该患儿可能是

- A.感染性贫血
- B.生理性贫血
- C.营养性缺铁性贫血
- D.营养性巨幼细胞贫血
- E.再生障碍性贫血

24.患儿男性，11个月。出生后一直奶粉喂养，未添加辅食。体检：营养差，皮肤粘膜苍白。化验：血红蛋白 60g/L，红细胞 $2.0 \times 10^{12}/L$ ，此患儿确诊为营养性缺铁性贫血，导致该患儿缺铁的主要原因是

- A.铁丢失过多
- B.铁吸收、利用障碍
- C.铁摄入不足
- D.生长发育快
- E.铁储存不足

【A3 /A4 型题】

(25 ~ 26 题共用题干)

患者男性，45岁。患溃疡病5年，经常胃出血，血常规检查示 Hb90g/L，RBC $3.8 \times 10^{12}/L$ ，确诊为缺铁性贫血。

25.遵医嘱选用硫酸亚铁治疗，护理措施正确的是

- A.餐前服用
- B.与浓茶同服
- C.与牛奶同服
- D.与橙汁同服

E.与磷酸盐同服, 不需要用吸管

26.此病的主要病因是

A.慢性失血

B.缺乏白蛋白

C.缺乏维生素 B12

D.缺乏胃蛋白酶

E.缺乏叶酸

【参考答案】

1.B 2.C 3.B 4.B 5.A 6.D 7.D 8.A 9.D 10.E 11.A 12.C

13.D 14.E 15.D 16.D 17.C 18.E 19.A 20.B 21.B 22.C 23.C

24.C 25.D 26.A

第二节 再生障碍性贫血病人的护理

【A1 型题】

1.正常细胞性贫血常见于

A.巨幼细胞贫血

B.缺铁性贫血

C.地中海贫血

D.铁幼粒细胞性贫血

E.再生障碍性贫血

2.导致再生障碍性贫血的主要原因是

A.骨髓造血功能衰竭

B.红细胞破坏增多

C.红细胞寿命缩短

D.造血原材料缺乏

E.红细胞在缺陷

3.引起继发性再生障碍性贫血最常见的药物是

A.阿司匹林

- B.保泰松
- C.氯霉素
- D.磺胺药
- E.再生障碍性贫血

4.急性再生障碍性贫血患者易合并败血症的主要原因是

- A.白细胞减少
- B.红细胞减少
- C.血小板减少
- D.血红蛋白减少
- E.网织红细胞减少

5.再生障碍性贫血患者出血的主要原因是

- A.血小板生成减少
- B.血小板寿命缩短
- C.血小板破坏增多
- D.播散性血管凝血
- E.凝血因子减少

6.再生障碍性贫血一般不出现

- A.网织红细胞减少
- B.红细胞形态改变
- C.红细胞减少
- D.白细胞减少
- E.血小板减少

7.治疗慢性再障首选药物是

- A.雄激素（司坦唑醇）
- B.免疫抑制剂
- C.糖皮质激素
- D.抗生素
- E.铁剂

8.关于雄激素的描述，不正确的是

- A.可刺激肾脏产生促红细胞生成素
- B.对骨髓有直接刺激红细胞生成作用
- C.治疗慢性再生障碍性贫血的首选药
- D.需治疗 3~6 个月才能判断疗效
- E.该药吸收快，需要深部肌注射

9.哪项是严重的出血征象

- A.口腔粘膜出现血泡
- B.刷牙时牙龈出血
- C.鼻腔粘膜出血
- D.轻微外伤后皮下淤血
- E.大便潜血阳性

10.血液病患者出现牙龈出血，正确的护理措施是

- A.去甲肾上腺素棉球贴敷牙龈
- B.5%过氧化氢液体漱口
- C.用牙签清理牙齿
- D.用液体石蜡涂抹口唇
- E.用牙刷刷牙

11.急性再生障碍性贫血的早期突出表现为

- A.贫血
- B.黏膜溃疡
- C.出血与感染
- D.骨髓增生减低
- E.食欲减退

12.慢性再生障碍性贫血首发和主要的表现是

- A.贫血
- B.出血
- C.感染

D.肝、脾、淋巴结肿大

E.胸骨压痛

13.再生障碍性贫血与白血病临床表现不同的是

A.贫血

B.出血

C.感染

D.肝、脾、淋巴结肿大

E.脑出血

14.当再生障碍性贫血患者血小板低于 $20 \times 10^9/L$ 时，患者出现剧烈头痛、呕吐，应警惕的并发症是

A.眼底出血

B.鼻出血

C.脑出血

D.关节出血

E.消化道大出血

15.再生障碍性贫血的患者伴高热，不适宜的降温措施是

A.温水擦浴

B.冰水灌肠

C.头部放冰袋

D.口服退热药

E.酒精擦浴

【A2 型题】

16.患者女性，50 岁。血象检查：血红蛋白量 $40g/L$ ，白细胞计数 $2.5 \times 10^9/L$ ，血小板 $20 \times 10^9/L$ ，最可能是

A.缺铁性贫血

B.溶血性贫血

C.再生障碍性贫血

D.巨幼红细胞性贫血

E.急性白血病

17.某再生障碍性贫血患者，应用丙酸睾酮治疗。该药的正确使用方法是

A.该药吸收快，需要深部肌肉注射

B.如用药1个月见效，即可停药

C.该药副作用较少，用量可以适当加大

D.长期用药，肝功能不受损害

E.需经常更换注射部位，防止注射处发生肿块

18.患者女性，35岁。反复出现皮肤瘀点，并有鼻出血、月经过多。近来出现贫血、脾大，下列护理措施中不妥的是

A.适当限制活动

B.预防各种创伤

C.尽量减少肌注射

D.及时用手挖鼻腔血痂

E.给予高蛋白、高维生素、低渣、易消化饮食

19.患者男性，35岁，无明显诱因突然出现高热，伴抽搐，此时，最合适的降温措施是

A.温水擦浴

B.酒精擦浴

C.冰水灌肠

D.口服退热剂

E.头部及大血管处放置冰袋

20.患者男性，42岁，突然出现头痛、头晕、视力模糊、呕吐，疑为颅内出血，护士首先应给予病人

A.头部置冰袋

B.低流量吸氧

C.头低脚高位

D.保持口腔清洁

E.鼻饲流质饮食

21.患者男性, 38岁, 血红蛋白量 40g/L , 白细胞计数 2.5×10^9 个/L, 血小板计数 20×10^9 个/L。该患者最可能的疾病是

- A.缺铁性贫血
- B.溶血性贫血
- C.再生障碍性贫血
- D.慢性失血
- E.急性白血病

22.患者男性, 38岁, 患再生障碍性贫血8年, 贫血程度较重, 给予丙酸睾酮治疗。该药的正确使用方法是

- A.深部肌注射
- B.用药1个月后见效即可停药
- C.该药不良反应较少, 用量可以适当加大
- D.长期用药不会损害肝脏的功能
- E.需经常更换注射部位, 防止注射处发生肿块

【A3/A4型题】

(23~24题共用题干)

患者男性, 47岁, 因高热, 鼻出血, 皮肤粘膜紫癜两周入院, 确诊为急性再生障碍性贫血。今晨突然出现头痛伴恶心、呕吐, 随后意识不清。

23.目前对该病人最主要的护理措施是

- A.吸氧
- B.输血
- C.保持呼吸道通畅
- D.按医嘱给止血药
- E.立即建立静脉通道

24.病人家属向护士咨询预后情况, 下列回答正确的是

- A.预后好, 无须担心
- B.部分病人可转为白血病
- C.一般治疗症状即可缓解

- D.经积极治疗，病人可很快清醒
- E.如不积极治疗，病人可能在 6~12 个月死亡

(25~26 题共用题干)

患者女性，44 岁，近日经常感冒，发热，乏力，时有皮肤紫癜，病人担心自己患了不治之症，进食少，睡眠差。查：扁桃体肿大，双肺无啰音，肝脾无肿大，血常规：全血细胞减少。

25.该病人最可能的诊断是

- A.白血病
- B.缺铁性贫血
- C.过敏性紫癜
- D.再生障碍性贫血
- E.特发性血小板减少性紫癜

26.目前该病人最主要的心理反应是

- A.忧郁
- B.焦虑
- C.孤独
- D.恐惧
- E.无能为力

【参考答案】

- 1.E 2.A 3.C 4.A 5.A 6.B 7.A 8.E 9.A 10.D 11.C 12.A
13.D 14.C 15.E 16.C 17.E 18.D 19.E 20.A 21.C 22.E 23.C 24.E
25.D 26.B

第三节 特发性血小板减少性紫癜病人的护理

【A1 型题】

- 1.特发性血小板减少性紫癜属于
- A.抗凝及纤维蛋白溶解异常
 - B.血小板功能异常

- C.血管壁异常
- D.凝血因子减少或缺乏
- E.自身免疫性出血综合症

2.特发性血小板减少性紫癜最主要的发病机制是

- A.骨髓生成巨核细胞数目减少
- B.免疫因素（血中含有抗血小板抗体）
- C.毛细血管脆性增加
- D.骨髓造血功能衰竭
- E.血小板功能异常

3.特发性血小板减少性紫癜采用脾切除治疗的作用机制是

- A.降低血管壁通透性
- B.刺激骨髓使血小板增生
- C.抑制血小板与抗体结合
- D.减少血小板破坏及抗体产生
- E.阻滞单核-吞噬细胞系统吞噬、破坏血小板

4.特发性血小板减少性紫癜首选的治疗是

- A.肾上腺糖皮质激素
- B.脾切除
- C.免疫抑制剂
- D.输血小板
- E.雄激素

5.特发性血小板减少性紫癜治疗时应慎用的是

- A.感染时应使用抗生素
- B.糖皮质激素
- C.脾切除
- D.输血
- E.免疫抑制剂

6.急性特发性血小板减少性紫癜的主要致死原因是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/336134113221010050>