




7. 已知函数  $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$  ( $-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}$ ) 在  $(\frac{3\pi}{8}, \frac{7\pi}{8})$  内单调递减,  $x = \frac{3\pi}{8}$  是函数  $f(x)$  的一条对称轴, 且函数  $y = f(x + \frac{\pi}{8})$  为奇函数, 则  $f(\frac{7\pi}{24}) =$  ( )

- A.  $-\frac{\sqrt{3}}{2}$       B.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$       C.  $-\frac{1}{2}$       D.  $\frac{1}{2}$

8. 坡屋顶是我国传统建筑造型之一, 蕴含着丰富的数学元素. 安装灯带可以勾勒出建筑轮廓, 展现造型之美. 如图, 某坡屋顶可视为一个五面体, 其中两个面是全等的等腰梯形, 两个面是全等的等腰三角形. 若  $AB = 25\text{m}$ ,  $BC = AD = 10\text{m}$ , 且等腰梯形所在的平面、等腰三角形所在的平面与平面  $ABCD$  的夹角的正切值均为  $\frac{\sqrt{14}}{5}$ , 则该五面体的所有棱长之和为 ( )



- A. 102m      B. 112m  
C. 117m      D. 125m

9. 若  $F(c, 0)$  是双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 的右焦点, 过  $F$  作双曲线一条渐近线的垂线与两条渐近线交于  $A, B$  两点,  $O$  为坐标原点,  $\triangle OAB$  的面积为  $\frac{12a^2}{7}$ , 则该双曲线的离心率  $e =$  ( )

- A.  $\frac{5}{4}$       B.  $\frac{4}{3}$       C.  $\frac{5}{3}$       D.  $\frac{8}{5}$

## 二、填空题

10.  $\frac{(2x-y)^6}{x^2y^3}$  的展开式中  $x$  的系数为\_\_\_\_\_.

11. 函数  $f(x) = \log_2 x + 2^x - \frac{x}{\ln 2}$  的图象在  $x=1$  处切线的斜率为\_\_\_\_\_.

12. 某学校开设了 4 门体育类选修课和 4 门艺术类选修课, 学生需从这 8 门课中选修 2 门或 3 门课, 并且每类选修课至少选修 1 门, 则不同的选课方案共有\_\_\_\_\_种 (用数字作答).

13. 已知抛物线  $E: y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ) 的焦点为  $F$ , 过点  $F$  的直线  $l$  与抛物线  $E$  交于  $A, B$  两点, 若直线  $l$  与圆  $x^2 + y^2 - px = 0$  交于  $C, D$  两点, 且  $3|AB| = 8|CD|$ , 则直线  $l$  的一个斜率为\_\_\_\_\_.

14. 甲, 乙, 丙三人进行传球游戏, 每次投掷一枚质地均匀的正方体骰子决定传球的方

式：当球在甲手中时，若骰子点数大于 3，则甲将球传给乙，若点数不大于 3，则甲将球保留；当球在乙手中时，若骰子点数大于 4，则乙将球传给甲，若点数不大于 4，则乙将球传给丙；当球在丙手中时，若骰子点数大于 3，则丙将球传给甲，若骰子点数不大于 3，则丙将球传给乙. 初始时，球在甲手中，投掷  $n$  次骰子后 ( $n \in \mathbf{N}^*$ )，记球在甲手中的概率为  $p_n$ ，则  $p_3 =$  \_\_\_\_\_；  $p_n =$  \_\_\_\_\_.

15. 定义在  $\mathbf{R}$  上的奇函数  $f(x)$  满足  $f(x) + f(2-x) = 0$ ，当  $x \in (-1, 1)$  时，

$$f(x) = \log_2 \left( \frac{a}{1-x} - 1 \right) + b, \text{ 则 } \sum_{k=1}^{2024} f\left(\frac{k}{3}\right) = \text{_____}.$$

### 三、解答题


16. 在  $\triangle ABC$  中，角  $A, B, C$  所对的边分别为  $a, b, c$ ，若  $a^2 - b^2 + c^2 = 2$ ， $\triangle ABC$  的面积为  $\frac{\sqrt{2}}{4}$ .

(1) 求  $\tan B$ ；

(2) 若  $b = 1$ ，求  $\sin A \sin C$ ；

(3) 求  $\cos 3B$  的值.

17. 如图，三棱柱  $ABC - A_1B_1C_1$  中，侧棱  $AA_1 \perp$  平面  $ABC$ ， $\triangle ABC$  为等腰直角三角形， $\angle BAC = 90^\circ$ ，且  $AB = AA_1 = 2$ ， $D, E, F$  分别是  $B_1A, CC_1, BC$  的中点.



(1) 求直线  $DE$  与  $BC$  所成角的余弦值；

(2) 求证： $B_1F \perp$  平面  $AEF$ ；

(3) 求平面  $AB_1E$  与平面  $AEF$  夹角的余弦值.

18. 已知椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$  的左顶点为点  $A$ ，上、下顶点分别为点  $B, C$ ，左焦点为点  $F$ ，且椭圆的焦距为  $2\sqrt{3}$ ， $\triangle BCF$  为等边三角形.

(1) 求椭圆的方程及离心率；

(2) 设过原点  $O$  且斜率为  $k(k > 0)$  的直线  $l$  与椭圆交于  $P$ 、 $Q$  两点，直线  $l$  与直线  $AB$  交于点  $M$ ，且点  $P$ 、 $M$  均在第一象限. 若  $V_{BPQ}$  的面积是  $\triangle BPM$  的面积的 2 倍，求直线  $l$  的方程.

19. 已知数列  $\{a_n\}$  是等比数列， $a_1 = 2$ ， $a_2$ ， $a_3 + 2$ ， $a_4$  成等差数列.

(1) 求  $\{a_n\}$  的通项公式和  $\sum_{i=1}^n ia_i$ ;

(2) 数列  $\{b_n\}$  满足  $b_n \in \mathbf{N}(n \in \mathbf{N}^*)$ ; 当  $n = a_k(k \in \mathbf{N}^*)$  时， $b_n = \frac{n}{2}$ ; 当  $n \neq a_k(k \in \mathbf{N}^*)$  时，

$b_n < b_{n+1}$ . 记数列  $\{b_n\}$  的前  $n$  项和为  $S_n$ .

① 若  $\sum_{i=a_k+1}^{a_{k+1}} b_i = 2024(k \in \mathbf{N}^*)$ ，求  $k$  的值;

② 若  $b_{a_n+1} = 1$ ，求证： $S_{2n} = 4S_n - n + 2$ .

20. 黎曼猜想是解析数论里的一个重要猜想，它被很多数学家视为是最重要的数学猜想之一. 它与函数  $f(x) = \frac{x^{s-1}}{e^x - 1}$  ( $x > 0, s > 1$ ,  $s$  为常数) 密切相关，请解决下列问题.

(1) 当  $1 < s \leq 2$  时，讨论  $f(x)$  的单调性;

(2) 当  $s > 2$  时;

① 证明  $f(x)$  有唯一极值点;

② 记  $f(x)$  的唯一极值点为  $g(s)$ ，讨论  $g(s)$  的单调性，并证明你的结论.

参考答案:

1. C

【分析】根据题意求集合  $A, B$ ，再利用集合的交并补集运算即可得解.

【详解】因为  $A = \left\{x \mid \frac{1}{x} > 0\right\} = \{x \mid x > 0\}$ ，则  $\complement_{\mathbb{R}} A = \{x \mid x \leq 0\}$ .

又因为  $B = \{x \mid x^2 + x - 2 < 0\} = \{x \mid -2 < x < 1\}$ ,

所以  $(\complement_{\mathbb{R}} A) \cap B = (-2, 0]$ .

故选: C.

2. D

【分析】根据复数乘法的运算法则、虚数单位乘方的运算性质，结合复数的模定义进行求解即可.

【详解】由  $\frac{z}{1+2i} = i^{2024}$ ,

则  $z = i^{2024}(1+2i) = 1+2i$ ,

所以  $|z| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$ .

故选: D

3. A

【分析】借助排除法结合函数值符号，将不符合题意的排除即可得.

【详解】由图可知，该函数定义域包括 0，对 B、C 选项中， $e^0 - e^{-0} = 0$ ，故排除 B、C；

当  $x > 0$  时，易得  $4x > 0$ 、 $e^{-|x|} > 0$ ，故  $4xe^{-|x|} > 0$ ，与图象矛盾，故排除 D.

故选: A.

4. A

【分析】利用充分条件和必要条件的定义判断.

【详解】解: 由  $a_{n+1} - a_n = a_n^2 - a_n = a_n(a_n - 1) > 0$ ，解得  $a_n < 0$  或  $a_n > 1$ ，

所以“ $a_1 = 2$ ”是“ $\{a_n\}$  为单调递增数列”的充分不必要条件，

故选: A

5. B

【分析】利用正态分布的性质即可判断选项 A，利用百分位数的定义即可判断选项 B，根据线性相关系数的性质即可判断选项 C，利用线性回归方程中的基本量即可判断选项 D.

【详解】对 A：若随机变量  $X$  服从正态分布  $X(3, \sigma^2)$ ，且  $P(X \leq 4) = 0.7$ ，

则  $P(X > 4) = 1 - P(X \leq 4) = 0.3$ ，

则  $P(3 < X < 4) = 0.5 - P(X > 4) = 0.2$ ，A 正确；

对 B：因为  $10 \times 60\% = 6$ ，所以第 60 百分位数为  $\frac{14+16}{2} = 15$ ，B 错误；

对 C：若线性相关系数  $|r|$  越接近 1，

则两个变量的线性相关性越强，C 正确；

对于 D，样本点的中心为  $(\bar{x}, \bar{y})$ ，

所以  $\bar{x} = m$ ， $\bar{y} = 2.8$ ，

而对于回归直线方程  $\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a}$ ，

因为此时线性回归方程为  $\hat{y} = 0.3x - m$ ，

所以  $\hat{b} = 0.3$ ， $2.8 = 0.3m - m$ ，

所以  $m = -4$ ，D 正确。

故选：B

6. D

【分析】利用平面向量的线性运算可将  $\overrightarrow{CD} = 3\overrightarrow{CE} - 2\overrightarrow{CA}$  转化为  $5\overrightarrow{AB} + 6\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AC}$ ，则得到  $x, y$  的值，进而即可求解。

【详解】因为  $\overrightarrow{CD} = 3\overrightarrow{CE} - 2\overrightarrow{CA}$ ，边  $BC$  的中点为  $D$ ，所以  $\frac{1}{2}\overrightarrow{CB} = 3(\overrightarrow{BE} - \overrightarrow{BC}) + 2\overrightarrow{AC}$ ，

因为  $\frac{1}{2}\overrightarrow{CB} = 3\overrightarrow{BE} - 3\overrightarrow{BC} + 2\overrightarrow{AC}$ ，所以  $\frac{5}{2}\overrightarrow{BC} = 3\overrightarrow{BE} + 2\overrightarrow{AC}$ ，

所以  $\frac{5}{2}\overrightarrow{BC} = \frac{5}{2}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = 3\overrightarrow{BE} + 2\overrightarrow{AC}$ ，

所以  $5\overrightarrow{AC} - 5\overrightarrow{AB} = 6\overrightarrow{BE} + 4\overrightarrow{AC}$ ，即  $5\overrightarrow{AB} + 6\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AC}$ ，

因为  $\overrightarrow{AC} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{BE}$ ，

所以  $x = 5$ ， $y = 6$ ，故  $x + y = 11$ 。

故选：D。

7. B

【分析】首先由函数的单调性转化函数周期的范围，即可求  $\omega$  的范围，再结合函数的对称性列式，确定  $\omega$ ，再分别代入函数的解析数，由对称性求  $\varphi$ ，并验证函数的单调性后，即可求

解.

【详解】因为函数  $f(x)$  在  $\left(\frac{3\pi}{8}, \frac{7\pi}{8}\right)$  内单调递减,

所以  $\frac{7\pi}{8} - \frac{3\pi}{8} \leq \frac{1}{2}T \Rightarrow \frac{7\pi}{8} - \frac{3\pi}{8} \leq \frac{1}{2} \frac{2\pi}{|\omega|}$ , 得  $|\omega| \leq 2$ ,

因为  $x = \frac{3\pi}{8}$  是函数  $f(x)$  的一条对称轴,

所以  $\omega \cdot \frac{3\pi}{8} + \varphi = 2k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}$ , ①

因为函数  $y = f\left(x + \frac{\pi}{8}\right) = \sin\left(\omega x + \frac{\omega\pi}{8} + \varphi\right)$  是奇函数,

所以  $\frac{\omega\pi}{8} + \varphi = m\pi, m \in \mathbf{Z}$ , ②,

由①-②可得,  $\omega = 4(2k - m) + 2$ ,

而  $|\omega| \leq 2$ , 所以  $|\omega| = \pm 2$

当  $\omega = 2$  时,  $\frac{2\pi}{8} + \varphi = m\pi, m \in \mathbf{Z}$ , 得  $\varphi = m\pi - \frac{\pi}{4}$ ,  $m \in \mathbf{Z}$ ,

因为  $-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}$ , 所以  $\varphi = -\frac{\pi}{4}$ ,

即  $f(x) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$ ,

当  $x \in \left(\frac{3\pi}{8}, \frac{7\pi}{8}\right)$  时,  $2x - \frac{\pi}{4} \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$ , 显然此时函数单调递减, 符合题意,

所以  $f\left(\frac{7\pi}{24}\right) = \sin\left(2 \times \frac{7\pi}{24} - \frac{\pi}{4}\right) = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

当  $\omega = -2$  时,  $-\frac{2\pi}{8} + \varphi = m\pi, m \in \mathbf{Z}$ , 得  $\varphi = m\pi + \frac{\pi}{4}$ ,  $m \in \mathbf{Z}$ ,

因为  $-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}$ , 所以  $\varphi = \frac{\pi}{4}$ ,

即  $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$ ,

当  $x \in \left(\frac{3\pi}{8}, \frac{7\pi}{8}\right)$  时,  $2x + \frac{\pi}{4} \in (\pi, 2\pi)$ , 显然此时函数不是单调递减函数, 不符合题意,

所以  $f\left(\frac{7\pi}{24}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ .


故选: B

8. C

【分析】先根据线面角的定义求得  $\tan \angle EMO = \tan \angle EGO = \frac{\sqrt{14}}{5}$ , 从而依次求  $EO$ ,  $EG$ ,  $EB$ ,

$EF$ ，再把所有棱长相加即可得解.

【详解】如图，过  $E$  做  $EO \perp$  平面  $ABCD$ ，垂足为  $O$ ，过  $E$  分别做  $EG \perp BC$ ， $EM \perp AB$ ，垂足分别为  $G$ ， $M$ ，连接  $OG, OM$ ，



由题意得等腰梯形所在的面、等腰三角形所在的面与底面夹角分别为  $\angle EMO$  和  $\angle EGO$ ，

$$\text{所以 } \tan \angle EMO = \tan \angle EGO = \frac{\sqrt{14}}{5}.$$

因为  $EO \perp$  平面  $ABCD$ ， $BC \subset$  平面  $ABCD$ ，所以  $EO \perp BC$ ，

因为  $EG \perp BC$ ， $EO, EG \subset$  平面  $EOG$ ， $EO \cap EG = E$ ，

所以  $BC \perp$  平面  $EOG$ ，因为  $OG \subset$  平面  $EOG$ ，所以  $BC \perp OG$ ，

同理： $OM \perp BM$ ，又  $BM \perp BG$ ，故四边形  $OMBG$  是矩形，

所以由  $BC = 10$  得  $OM = 5$ ，所以  $EO = \sqrt{14}$ ，所以  $OG = 5$ ，

$$\text{所以在直角三角形 } EOG \text{ 中， } EG = \sqrt{EO^2 + OG^2} = \sqrt{(\sqrt{14})^2 + 5^2} = \sqrt{39}$$

$$\text{在直角三角形 } EBG \text{ 中， } BG = OM = 5，EB = \sqrt{EG^2 + BG^2} = \sqrt{(\sqrt{39})^2 + 5^2} = 8，$$

又因为  $EF = AB - 5 - 5 = 25 - 5 - 5 = 15$ ，

所有棱长之和为  $2 \times 25 + 2 \times 10 + 15 + 4 \times 8 = 117 \text{ m}$ 。

故选：C

9. A

【分析】先求出渐近线方程，根据题设条件作出图象，设  $\angle AOF = \theta$ ，可得出  $\tan \theta = \frac{b}{a} \in (0, 1)$ ，


从而求出  $\tan 2\theta = \frac{2ab}{a^2 - b^2}$ ，再求出  $F$  到渐近线的距离  $|FA|$ ，从而得出  $|AO| = a$ ，结合  $\triangle OAB$  的

面积为  $\frac{12}{7}a^2$ ，可得到  $\frac{a^3b}{a^2 - b^2} = \frac{12}{7}a^2$ ，从而可得  $a$ ， $b$  的等量关系，再由离心率公式即可求

解.

【详解】根据题意可得双曲线的渐近线方程为  $y = \frac{b}{a}x$ ， $y = -\frac{b}{a}x$ 。

设过点  $F(c,0)$  作渐近线  $y = \frac{b}{a}x$  的垂线，分别交  $y = \frac{b}{a}x$ ， $y = -\frac{b}{a}x$  于点  $A, B$ ，如图所示：



因为  $a > b > 0$ ，所以  $0 < \frac{b}{a} < 1$ ，

设  $\angle AOF = \theta$ ，则  $\angle AOB = 2\theta$ ， $\tan \theta = \frac{b}{a} \in (0,1)$ ，

$$\text{所以 } \tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta} = \frac{\frac{2b}{a}}{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \frac{2ab}{a^2 - b^2},$$

因为  $F(c,0)$  到  $y = \frac{b}{a}x$  的距离为  $|FA| = \frac{|bc|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = b$ ，则  $|AO| = a$ ，

所以  $S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2}|AO| \cdot |AB| = \frac{1}{2}a \cdot a \tan 2\theta = \frac{a^3 b}{a^2 - b^2} = \frac{12a^2}{7}$ ，解得  $\frac{b}{a} = \frac{3}{4}$ ，

所以该双曲线的离心率为  $e = \frac{c}{a} = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{a^2}} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \frac{5}{4}$ 。

故选：A

10. -160

【分析】利用二项展开式的通项即可解出。

【详解】要求  $\frac{(2x-y)^6}{x^2 y^3}$  的展开式中  $x$  的系数，

即求  $(2x-y)^6$  展开式中含  $x^3 y^3$  的项，

易知  $(2x-y)^6$  展开式的通项为  $T_{r+1} = C_6^r (2x)^{6-r} (-y)^r, r = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ，

所以第四项满足题意，即  $T_4 = C_6^3 (2x)^3 \times (-y)^3 = -8C_6^3 x^3 y^3 = -160x^3 y^3$ ，

故展开式中  $x$  的系数为 -160。

故答案为：-160。

11.  $2\ln 2/\ln 4$

【分析】首先求函数的导数，再根据导数的几何意义，即可求解.

【详解】由题意可知， $f'(x) = \frac{1}{x \ln 2} + 2^x \ln 2 - \frac{1}{\ln 2}$ ， $f'(1) = 2 \ln 2$ ，

根据导数的几何意义可知，函数的图象在  $x=1$  处切线的斜率为  $2 \ln 2$ .

故答案为：  $2 \ln 2$

12. 64

【分析】分类讨论选修 2 门或 3 门课，对选修 3 门，再讨论具体选修课的分配，结合组合数运算求解.

【详解】(1) 当从 8 门课中选修 2 门，则不同的选课方案共有  $C_4^1 C_4^1 = 16$  种；

(2) 当从 8 门课中选修 3 门，

①若体育类选修课 1 门，则不同的选课方案共有  $C_4^1 C_4^2 = 24$  种；

②若体育类选修课 2 门，则不同的选课方案共有  $C_4^2 C_4^1 = 24$  种；

综上所述：不同的选课方案共有  $16 + 24 + 24 = 64$  种.

故答案为： 64.

13.  $\sqrt{3}$  (或  $-\sqrt{3}$ ，答案不唯一)

【分析】设  $l$  的方程为  $y = k\left(x - \frac{p}{2}\right)$ ， $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ，联立直线方程和抛物线方程，再由焦点弦公式得  $|AB| = x_1 + x_2 + p = 2p + \frac{2p}{k^2}$ ，由圆  $x^2 + y^2 - px = 0$  的方程可知，直线  $l$  过其圆心， $|CD| = 2r$ ，由  $3|AB| = 8|CD|$  列出方程求解即可.

【详解】由题意知， $l$  的斜率存在，且不为 0，设  $l$  的方程为  $y = k\left(x - \frac{p}{2}\right)$ ， $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ，

$$\text{联立} \begin{cases} y = k\left(x - \frac{p}{2}\right) \\ y^2 = 2px \end{cases}, \text{ 得 } k^2 x^2 - (k^2 p + 2p)x + \frac{k^2 p^2}{4} = 0,$$

易知  $\Delta > 0$ ，则  $x_1 + x_2 = \frac{k^2 p + 2p}{k^2} = p + \frac{2p}{k^2}$ ，

所以  $|AB| = x_1 + x_2 + p = 2p + \frac{2p}{k^2}$ ，

圆  $x^2 + y^2 - px = 0$  的圆心  $\left(\frac{p}{2}, 0\right)$ ，半径  $r = \frac{p}{2}$ ，且直线  $l$  过圆心  $\left(\frac{p}{2}, 0\right)$ ，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/336210205230010100>