

下载原文可修改文字和底色颜色查看原文

2023 年黑龙江省传染病防治院外科护士招聘考试高频考点卷【3 套】含答案详解

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

第 I 卷

一. 单选题(共 75 题)

1. 男性，33 岁，因甲状腺功能亢进准备接受手术治疗。查体：T36.6℃，P110 次/分，R19 次/分，BP125/75mmHg。术前该病人需服用既能抑制甲状腺素释放，又能减少甲状腺血流量的药物是

A. 阿托品

B. 普萘洛尔

C. 硫氧嘧啶

D. 甲状腺素

E. 复方碘化钾

答案：E

本题解析：
暂无解析

2. 某男性病人，65 岁，体形较胖，因行脊柱手术卧床 2 周后，自诉右侧小腿疼痛，体检发现右腿指凹性水肿。在护理此病人时，应注意禁止()

A. 抬高患肢

B. 患肢制动

C. 理疗

D. 按摩右侧小腿

E. 给予抗凝药

答案：D

本题解析：

1. 下肢静脉血栓多见于术后长期卧床、活动减少的老年人和肥胖者，表现为小腿腓肠肌疼痛、静脉血栓以下部位肿胀。

2. 对于下肢静脉血栓病人禁忌局部按摩，以防血栓脱落发生肺栓塞。

3. 患者男性，42 岁。于 5 小时前发生车祸，当时昏迷，无呕吐，急诊收治入院。入院后患者神志恢复清醒，瞳孔左：右=2.5mm:2.5mm，光反应(+)，颈无抵抗，四肢自主活动，躁动不安，头颅 CT 片示：右颞硬膜外血肿，出血量约 15ml，中线未偏移，严密观察病情，给予止血等对症支持治疗。入院后 4 小时患者再次昏迷，瞳孔左：右=2.5mm:3.5mm，光反应左侧(+)右侧(±)，右侧肢体刺激可动，左侧肢体无活动，并伴有喷射状呕吐。现在患者急需进行的辅助检查是

A. 脑多普勒

B. 脑干诱发电位检查

C. 脑血管造影

D. CT

E. MR

答案：D

本题解析：

神经系统病变：颅脑外伤、脑梗塞、脑肿瘤、炎症、变性病、先天畸形等，为应用最早的人体系统，尤其是创伤性颅脑急症诊断中属于常规和首选检查方法，可清楚显示脑挫裂伤、急性脑内血肿、硬膜外及硬膜下血肿、颅面骨骨折、颅内金属异物等，而且比其它任何方法都要敏感。CT 诊断急性脑血管疾病如高血压脑出血、蛛网膜下腔出血、脑动脉瘤及动静脉畸形破裂出血、脑梗塞等有很高价值，急性出血可考虑作为首选检查，急性脑梗塞特别是发病 6 小时内者，CT 不如 MRI 敏感。

4. 男性，40 岁，体重 70kg，被热液烫伤 3 小时后去医院就诊。查体：烫伤包括头面颈部、右上肢、右下肢(不包括臀部)、左膝关节以下至足趾及胸部一手掌大小的面积，创面大水疱，水疱壁薄，水疱下创面潮红、水肿，病人疼痛剧烈。该病人烧伤的深度为

A. I 度

B. 浅 II 度

C. 深 II 度

D. III 度

E. IV 度

答案：B

本题解析：

该患者剧烈疼痛、大水疱等为浅 II。烧伤。面积为头面颈部 9%、右上肢 9%、右下肢包括右足、右小腿、右大腿 20.5%、左膝关节以下 10%、胸部一手掌 1%共约 50%。

5. 患者男性，61 岁。腹部挤压伤后 48 小时发生急性腹膜炎，立即给予手术，术中发现结肠穿孔，放置腹腔引流，术后带呼吸机返回 ICU。患者烦躁，体温 39℃，呼吸急促，FiO₂75%，PaO₂80mmHg，心率 110 次 / 分，血压 100 / 70mmHg。正确的通气治疗方案应是

A. INV

B. PEEP

C. CPAP

D. 持续高流量吸氧

E. SIMV

答案：B

本题解析：

1. 根据病情介绍，患者既往无慢性肺部疾患，术后早期心率、血压正常可排除心脏原因。在呼吸机辅助呼吸下，氧合指数 $PaO_2 / FiO_2 = 80 / 0.75 < 200\text{mmHg}$ ，加之重症创伤后，存在发生 ARDS 的诱因，考虑 ARDS。此题选 B。

2. 该患者体温高，在呼吸机辅助呼吸下，氧合指数 $< 200\text{mmHg}$ ，为 ARDS 进展期，应给予 PEEP 通气治疗。目的是使肺泡在整个呼吸周期保持开放，此题选择 B。

3. 做好 ARDS 的呼吸道管理，保持人工通气管的湿化，每小时评估病人的呼吸状况，有效叩背，维护循环功能持续监测病人的心率、血压变化，监测尿量，合理补液，监测中心静脉压的变化。预防感染，提供足够的营养，做好心理护理是护理 ARDS 患者正确的护理措施。此题选 C。

6. 共用题干

一病人，男性，64 岁，主诉脓血便及肛门下坠感半年余。病人入院后应首先做的检查是

A. 大便常规

B. 气钡双重对比造影检查

C. X 线钡剂灌肠检查

D. 直肠镜检查

E. 直肠指检

答案：E

本题解析：

暂无解析

7. 患者男性，45岁。行“全麻下胃大部切除术”后被送回病房。监测患者意识清醒，T37.8℃，P95次/分钟，R24次/分钟，BP140/90mmHg。患者出现呼吸困难，呼吸有鼾声，继而出现鼻翼扇动，三凹征。应考虑患者发生了

- A. 急性肺炎
- B. 上呼吸道梗阻
- C. 下呼吸道梗阻
- D. 支气管痉挛
- E. 肺不张

答案：B

本题解析：

1. 全麻并发症呼吸道梗阻包括上呼吸道梗阻和下呼吸道梗阻，上呼吸道梗阻时，如为不全梗阻时表现为呼吸困难并有鼾声，完全梗阻时有鼻翼煽动和三凹征。下呼吸道梗阻轻者出现肺部啰音，重者出现呼吸困难，潮气量降低，发绀，心率加快，血压下降等表现。
2. 上呼吸道梗阻常见原因为机械性梗阻，如舌后坠，口腔分泌物阻塞，异物阻塞，喉头水肿，喉痉挛等。下呼吸道梗阻常见原因为气管导管扭折，导管斜面过长而紧贴在气管壁上，分泌物或呕吐物误吸，支气管痉挛等。
3. 患者为上呼吸道梗阻，不存在支气管痉挛，因此无需应用支气管解痉剂。

8. 患者，男性，32岁。运动后突然出现右上腹部剧痛，疼痛放射至右侧中下腹部，伴恶心、呕吐，尿液呈浓茶色，查体：腹软，右下腹部深压痛，右肾区叩击痛。该患者最可能的诊断是

- A. 十二指肠溃疡
- B. 右输尿管结石
- C. 急性胆囊炎
- D. 急性阑尾炎
- E. 右肾结石

答案：B

本题解析：

1. 根据症状可判断为右输尿管结石。

2. 首先要查尿常规看有无镜下血尿等。
3. 泌尿系X线平片可显示95%以上的结石。
4. 保守治疗应通过单独或联合应用药物缓解肾绞痛。
5. 保守治疗适于肾绞痛，结石小于0.6cm、光滑、无尿路梗阻、感染，纯尿酸结石及胱氨酸结石。

9. 女性，45岁，因绞窄性肠梗阻行急诊手术，发病前曾饱食。病人可能发生的最严重的循环系统并发症是

- A. 高血压
- B. 低血压
- C. 心搏停止
- D. 心房颤动
- E. 室性心律失常

答案：C

本题解析：

饱食后手术最好选用全身麻醉，可有效管理呼吸道；全身麻醉后完全清醒的标志是能正确回答问题；前面病人可能发生的最严重的并发症是心搏停止。

10. 患者，女性，35岁，高血压1年，血压165/105mmHg，血钾3.3mmol/L，血钠148mmol/L，HCO₃⁻35mmol/L，肝肾功能正常，尿液pH7.5，静脉尿路造影（一）若检查发现该患者血醛固酮水平升高，最可能的诊断为

- A. 皮质醇症
- B. 肾素瘤
- C. 嗜铬细胞瘤
- D. 醛固酮症
- E. 原发性高血压

答案：D

本题解析：
暂无解析

11. 男性，70岁，有长期便秘史，突然腹痛、腹胀2天，未吐，少量黏液便1次，未排气，2年前曾有类似发作，查体可见全腹高度膨胀，左下腹可见巨大肠型，有轻度压痛、反跳痛，肠鸣音亢进。下列针对病人的处理措施不正确的是

- A. 禁食
- B. 胃肠减压
- C. 应用抗生素
- D. 补液
- E. 立即手术治疗

答案：E

本题解析：
暂无解析

12. 某社区卫生服务站预计对居民进行系统的健康教育，他们通过文献、档案、专题小组讨论等方法对辖区居民的各种基本特征、居民对各种干预措施的看法等进行了评价。健康教育评价的主要目的不包括

- A. 确定健康教育计划的先进性和合理性
- B. 确定健康教育计划的执行情况
- C. 确定健康教育目标的实现及持续性
- D. 总结健康教育成功与不足之处，提出进一步的研究假设
- E. 确定目标人群对各种干预措施的看法

答案：E

本题解析：

1. 形成性评价的方法有文献、档案、资料的回顾、专家咨询、专题小组讨论等，其具体内容包括：①目标人群的各种基本特征；②目标人群对各种干预措施的看法；③教育材料发放系统；④是否在最初的计划执

行阶段根据出现的新情况、新问题对计划进行适度调整。

2. 健康教育评价的目的主要包括：①确定健康教育计划的先进性和合理性；②确定健康教育计划的执行情况；③确定健康教育目标的实现及持续性；④总结健康教育成功与不足之处，提出进一步的研究假设。E选项“确定目标人群对各种干预措施的看法”属于形成性评价的内容而非目标。

13. 患者女性，34岁。反复尿频、尿急及尿痛2年。尿检见大量红细胞及白细胞。IVP发现左肾有破坏灶，形成空腔。此患者最可能的诊断是

- A. 急性肾盂肾炎
- B. 慢性肾盂肾炎
- C. 肾积水
- D. 肾癌
- E. 肾结核

答案：E

本题解析：

肾结核时，若肾盏纤维化狭窄或完全闭塞时，排泄性尿路造影可见空洞充盈不完全或完全不显影。

14. 患者，男性，60岁，2个月来上腹部疼痛，尤以空腹和夜间为重，进食可缓解。钡餐检查日患者突然腹痛剧烈，继而意识不清，应需为患者进行的检查是

- A. 心电图
- B. 腹部超声
- C. CT
- D. 脑血管造影
- E. 腹部X线检查

答案：E

本题解析：

需要禁食10小时以上。

15. 共用题干

女性，52岁，因结节性甲状腺肿接受了甲状腺大部切除术。术中顺利，术后安返病房。护士指导病人在术后当天进温凉流食的目的是

- A. 促进排便
- B. 增进食欲
- C. 观察有无呛咳
- D. 预防甲状腺危象
- E. 避免颈部血管扩张出血

答案：E

本题解析：

呼吸困难和窒息多发生于甲状腺大部切除术后48小时内，是最危急的并发症，因此在术后48小时内，护士最主要的观察内容是呼吸。如发生呼吸道并发症，须立即进行床旁抢救，及时剪开缝线，敞开切口，迅速除去血肿，结扎出血的血管，若呼吸仍无改善则立即行气管切开。通常，术后病人床旁应常规放置气管切开包和无菌手套。9~

16. 患者，20岁，因踢球造成左胫骨骨折，行石膏固定复位。如判断患者患肢血运情况，主要的指标是

- A. 定时测量血压
- B. 观察神志变化
- C. 检测尿量
- D. 观察患肢肢体远端皮肤色泽、温度
- E. 定时检查脉率

答案：D

本题解析：

判断患者患肢血运情况，主要的指标是观察患肢肢体远端皮肤色泽、温度。

17. 患者，男性，73岁，河南林县人。因食管癌入院手术治疗，查体：身高1.75m，体重50kg，P85次/分，R18次/分，既往吸烟50年，平时喜食腌制食品。有一兄因食管癌去世。患者术后可能出现的最严重的并发症是

- A. 感染
- B. 吻合口瘘
- C. 乳糜胸
- D. 出血
- E. 反流性食管炎

答案：B

本题解析：

暂无解析

18. 共用题干

男性，56岁，头痛4个月，多见于清晨，常出现癫痫发作，经检查诊断为颅内占位性病变、颅内压增高，拟行开颅手术。术前病人出现便秘时，不正确的处理方法是

- A. 使用开塞露
- B. 腹部按摩
- C. 使用缓泻剂
- D. 用肥皂水灌肠
- E. 鼓励病人多食蔬菜水果

答案：D

本题解析：

成年人正常颅内压 0.7~2.0kPa。5 题选 B。头痛、呕吐、视神经盘水肿是颅内压增高病人的主要表现，合称颅内压增高三主征。6 题选 E。用肥皂水灌肠可使病人腹内压增高，使颅内压力骤升而导致颅内压危象。7 题选 D。该病人目前已出现小脑幕切迹疝表现，题中的五方面均是脑疝病人急救处理措施，但最先应采取脱水治疗，尽快降低颅内压，在此基础上，采取其他措施。8 题选 C。对于急性颅内压增高、脑疝病人禁忌采用腰椎穿刺，因可诱发或加重脑疝。9 题选 A。出现脑脊液漏时，应取头高患侧卧位，不可堵塞、冲洗、滴药，避免用力咳嗽、打喷嚏。10 题选 E。11~

19. 患者，男性，45 岁。搬抬重物后出现腰痛伴右下肢放射痛 3 天来院就诊，诊断为腰椎间盘突出症。检查时发现患者小腿外侧及趾的针刺觉减退。此患者可能受压的神经根是

- A. 腰 1
- B. 腰 2
- C. 腰 3
- D. 腰 4
- E. 腰 5

答案：E

本题解析：
暂无解析

20. 患者女性，22 岁。自幼发现心脏杂音，在胸骨左缘 2、3 肋间闻及 III 级收缩期杂音，诊断为先天性心脏病，房间隔缺损。择期在低温体外循环下行房缺修补术。为了预防和控制感染，术前应

- A. 指导患者戒烟
- B. 保暖，防止感冒和呼吸道感染
- C. 给予清蛋白、新鲜血浆、全血等，以纠正低蛋白血症和贫血
- D. 注意口腔、皮肤卫生
- E. 避免黏膜和皮肤破损，积极治疗感染病灶

答案：C

本题解析：

2. 心源性恶病质者，术后可给予清蛋白、新鲜血浆、全血等，以纠正低蛋白血症和贫血。

21. 患者，男性，50 岁。患 1 型糖尿病 30 年，因感冒、体温 39℃、食欲减退、恶心呕吐及腹痛而入院。此时抢救的最关键措施不包括

- A. 补液
- B. 积极控制感染
- C. 小剂量持续静脉滴注胰岛素
- D. 纠正电解质及酸碱平衡失调
- E. 留取 24 小时尿，监测微量白蛋白水平

答案：E

本题解析：
暂无解析

22. 患者，男性，25 岁。因高位小肠瘘 1 天入院，入院后经颈内静脉插管滴肠外营养液，两周后突然出现寒战、高热，无咳嗽、咳痰，腹部无压痛、反跳痛。如果 24 小时后仍发热，应该

- A. 使用抗生素
- B. 胸腔穿刺抽气
- C. 停止肠外营养
- D. 气管切开
- E. 增加胰岛素用量

答案：A

本题解析：
患者行中心静脉插管，胸腹无异常表现，找不到原因的寒战、高热考虑导管性脓毒症。

23. 男性，58岁，因右肺中央型肺癌行右肺切除术。术后留置胸管，目前处于钳闭状态。全肺切除患者术后输液滴速一般每分钟不超过

A. 20 滴

B. 30 滴

C. 40 滴

D. 60 滴

E. 80 滴

答案：C

本题解析：

全肺切除术后的胸腔引流管一般呈钳闭状态，以保证术后患侧胸腔内有一定的渗液，减轻或纠正明显的纵隔移位。全肺切除术后患者应控制钠盐摄入量，一般而言，24 小时补液量宜控制在 2000ml 内，速度以 20~40 滴 / 分为宜。避免过度侧卧，可采取 1 / 4 侧卧位，以预防纵隔移位和压迫健侧肺而导致呼吸循环功能障碍。注意观察患者的呼吸情况，出现呼吸困难、胸闷、气管向健侧移位时，可酌情放出适量的气体或引流液，以维持气管、纵隔于中间位置。每次放液量不宜超过 100ml，速度宜慢，避免快速多量放液引起纵隔突然移位，导致心脏骤停。

24. 男性，70 岁，主诉上腹部疼痛 3 个月并逐渐加重来诊，近来疼痛以夜间为重，坐起前倾位疼痛可以减轻，食欲不振，伴腹泻，脂肪餐后腹泻加重。两个月来体重减轻 7.5 千克，曾行胃镜检查诊为“慢性重度萎缩性胃炎”，上消化道钡餐检查无阳性体征，化验发现血糖增高。首先应考虑的诊断是

A. 胃溃疡

B. 萎缩性胃炎

C. 胰体癌

D. 十二指肠球后溃疡

E. 胃癌

答案：C

本题解析：

病人“两个月来体重减轻 7.5 千克”提示可能患有恶性肿瘤，病人“脂肪餐后腹泻加重”提示胆道系统梗阻，只有胰体癌符合诊断。

25. 患者，女性，31 岁。排便时有少量鲜血滴出，同时有一肉芽状组织脱出，可用手还纳，无其他自觉症

状。该患者最可能的诊断为

A. 内痔嵌顿

B. 外痔

C. 内痔

D. 血栓性外痔

E. 直肠息肉脱出

答案：C

本题解析：

1. 内痔主要表现为排便时无痛性出血和痔块脱出。【该题针对“实践能力-直肠肛管疾病的护理”知识点进行考核】
2. 以排便时无痛性出血，痔块不脱出肛门外。【该题针对“实践能力-直肠肛管疾病的护理”知识点进行考核】
3. I~II 期内痔可选用注射疗法，胶圈套扎法。嵌顿性痔初期，应尽早手法还纳痔核。【该题针对“实践能力-直肠肛管疾病的护理”知识点进行考核】

26. 男性，25 岁，因腰部被刺后伤口持续溢出淡红色液体，血压 100 / 70mmHg 脉搏 100 次 / 分。出现休克症状。左上腹有压痛，但无肌紧张和反跳痛。该病人最可能的损伤部位是

A. 左下肺

B. 脾脏

C. 降结肠

D. 左输尿管

E. 左肾

答案：E

本题解析：

暂无解析

27. 病人，男性。急诊在硬膜外麻醉下行阑尾切除术，术后用平车护送病人入病室。病室内适宜的温、湿度是

- A. 温度 14~15℃，湿度 15%~25%
- B. 温度 15~16℃，湿度 60%~70%
- C. 温度 10~17℃，湿度 30%~40%
- D. 温度 20~22℃，湿度 40%~50%
- E. 温度 18~22℃，湿度 50%~60%

答案：E

本题解析：
暂无解析

28. 男性，33岁，左小腿被锈铁钉刺伤一段时间后出现乏力、头痛、打哈欠，继而有张口困难、蹙眉和苦笑面容等表现，全身肌肉阵发性痉挛，但神志一直清醒，诊断为破伤风。该患者治疗的中心环节是

- A. 控制痉挛
- B. 彻底清创
- C. 应用抗生素
- D. 中和游离毒素
- E. 维持水电平衡

答案：A

本题解析：
控制并解除痉挛是破伤风发作时的重要治疗环节，目的是使患者镇静，减少对外界刺激的敏感性，包括保持环境安静、减少一切不必要的刺激、根据病情交替使用镇静及解痉药物。

29. 男性，55岁，患“胃炎”25年，突然出现腹部剧烈疼痛并迅速波及全腹。查体：腹式呼吸减弱，腹肌紧张，全腹压痛及反跳痛阳性，尤以上腹部为重，X线检查示膈下游离气体，拟诊为胃十二指肠穿孔。病人术后留置胃肠减压，提示可以拔除胃管的指征是

- A. 体温正常
- B. 管腔阻塞
- C. 肛门排气
- D. 食欲增加
- E. 肠鸣音恢复

答案：C

本题解析：
暂无解析

30. 共用题干

男性，40岁，尿频、尿急、尿痛5年，有时出现肉眼血尿。体检：贫血貌，血尿素氮33mmol，肌酐612mmol，尿常规脓细胞20~30个/HP，B超显示：膀胱容量小，每次排尿50ml。该病最有意义的诊断方法是

- A. 膀胱镜检查
- B. 膀胱测压
- C. 逆行肾盂造影
- D. 尿液检查
- E. CT检查

答案：D

本题解析：
该病人有膀胱刺激症状，尿中有脓细胞，B超示膀胱容量小，提示存在肾结核引起的膀胱挛缩，同时肾功能较差，只有一侧肾结核，一侧肾积水可能会导致该病人的相应状况。4题选C。尿液检查尿呈酸性，有脓细胞、少量蛋白及红细胞。连续三次进行清晨尿液结核杆菌检查，若结果为阳性对诊断肾结核有决定性意义。5题选D。该病人有膀胱挛缩，若进行膀胱镜检查可能会引起膀胱损伤，6题选A。

31. 男性，58岁，因右肺中央型肺癌行右肺切除术。术后留置胸管，目前处于钳闭状态。此患者术后禁忌的体位是

A. 半卧位

B. 低斜坡卧位

C. 坐位

D. 平卧位

E. 侧卧位

答案：E

本题解析：

全肺切除术后的胸腔引流管一般呈钳闭状态，以保证术后患侧胸腔内有一定的渗液，减轻或纠正明显的纵隔移位。全肺切除术后患者应控制钠盐摄入量，一般而言，24小时补液量宜控制在2000ml内，速度以20~40滴/分为宜。避免过度侧卧，可采取1/4侧卧位，以预防纵隔移位和压迫健侧肺而导致呼吸循环功能障碍。注意观察患者的呼吸情况，出现呼吸困难、胸闷、气管向健侧移位时，可酌情放出适量的气体或引流液，以维持气管、纵隔于中间位置。每次放液量不宜超过100ml，速度宜慢，避免快速多量放液引起纵隔突然移位，导致心脏骤停。

32. 患者女性，15岁。右足底被铁锈钉刺伤7天，突然出现张口困难，继之出现苦笑面容，角弓反张，声响及触碰患者可诱发上述症状，患者神志清楚，体温正常。该病致病菌属于

A. 革兰染色阴性大肠埃希菌

B. 革兰染色阴性厌氧拟杆菌

C. 革兰染色阴性变形杆菌

D. 革兰染色阳性梭形芽孢杆菌

E. 革兰染色阳性厌氧芽孢杆菌

答案：E

本题解析：

1. 破伤风杆菌为革兰染色阳性厌氧芽孢杆菌。
2. 破伤风为毒血症。
3. 持续的呼吸肌痉挛可致窒息。
4. 有主动免疫力的患者，伤后仅需肌肉注射类毒素0.5ml。

33. 男性，25岁，因腰部被刺后伤口持续溢出淡红色液体，血压100/70mmHg 脉搏100次/分。出现休克症状。左上腹有压痛，但无肌紧张和反跳痛。目前应采取的处理原则是

A. 手术探查

B. 择期手术

C. 卧床观察

D. 药物治疗

E. 随访

答案：A

本题解析：

暂无解析

34. 患者，男性，73岁，河南林县人。因食管癌入院手术治疗，查体：身高1.75m，体重50kg，P85次/分，R18次/分，既往吸烟50年，平时喜食腌制食品。有一兄因食管癌去世。食管癌的好发部位为

A. 食管下段

B. 食管上段

C. 食管中段

D. 食管腹段

E. 食管颈段

答案：C

本题解析：

暂无解析

35. 患者女性，15岁。右足底被铁锈钉刺伤7天，突然出现张口困难，继之出现苦笑面容，角弓反张，声响及触碰患者可诱发上述症状，患者神志清楚，体温正常。该病属于

A. 毒血症

B. 菌血症

C. 败血症

D. 脓血症

E. 脓毒血症

答案：A

本题解析：

1. 破伤风杆菌为革兰染色阳性厌氧芽孢杆菌。
2. 破伤风为毒血症。
3. 持续的呼吸肌痉挛可致窒息。
4. 有主动免疫力的患者，伤后仅需肌肉注射类毒素 0.5ml。

36. 男性，70 岁，有长期便秘史，突然腹痛、腹胀 2 天，未吐，少量黏液便 1 次，未排气，2 年前曾有类似发作，查体可见全腹高度膨胀，左下腹可见巨大肠型，有轻度压痛、反跳痛，肠鸣音亢进。在护理该病人时，最重要的观察内容是

A. 腹痛

B. 腹胀

C. 肠绞窄征象

D. 呕吐

E. 排便

答案：C

本题解析：

暂无解析

37. 患者男性，45 岁。晚餐后持续中上腹疼痛 8 小时，上腹部有压痛，向腰背部放射。实验室检查结果：WBC $13.2 \times 10^9 / L$ ，血清淀粉酶 987U / L，尿淀粉酶 1350U / L，血钙 2.5mmol / L，初步诊断为急性胰腺炎。

为了缓解患者疼痛，护理过程中应禁用

A. 奥曲肽

B. 吗啡

C. 哌替啶

D. 阿托品

E. 山莨菪碱

答案：B

本题解析：

急性胰腺炎的常见病因为胆石症和胆道疾病、大量饮酒和暴饮暴食、胰管阻塞

38. 共用题干

某医院对护理质量进行严格的控制和管理，如聘用的护理人员必须经过严格的面试和操作考试，成立护理质量控制小组，进行夜班巡视，调查病人满意度等。“进行夜班巡视”属于质量控制的

A. 基础质量评价

B. 效果质量评价

C. 环节质量评价

D. 基本素质评价

E. 结果质量评价

答案：C

本题解析：

基础质量控制的工作重点是防止所使用的各种资源在质和量上产生偏差，是通过对人力，物力，财力和资源控制来实现的。对聘用人员素质进行考核属此类控制。6 选 A。环节质量评价主要是对护理活动的过程质量进行评价，进行夜班巡视属于环节质量评价。7 选 C。结果质量评价是对护理服务结果的评价，对病人满意度进行评价属于结果质量评价。8 选 E。

39. 共用题干

男性，28 岁。胸部外伤致右侧第 5 肋骨骨折并发气胸，呼吸极度困难，发绀，出冷汗。检查：血压 10.6/8kPa (80/60mmHg)，气管向左侧移位，右胸廓饱满，叩诊呈鼓音，呼吸音消失，颈胸部有广泛皮下气肿等。医师采用闭式胸膜腔引流治疗。搬动此病人时应

A. 保持引流通畅

B. 保持引流瓶直立

C. 嘱病人屏住呼吸

D. 用两把止血钳夹闭引流管

E. 注意观察引流液排出情况

答案：D

本题解析：

本题考查护理措施。该病人因胸部损伤导致气胸，目前胸膜腔内增高，严重影响病人的呼吸和循环功能，血压偏低、脉压减小、皮下气肿，并出现发绀，符合张力性气胸的特点，由于胸膜腔内过高，且伤侧胸腔压力不断升高造成呼吸和循环功能障碍。出现呼吸困难及发绀。5 题选 E。若引流管连接处脱节，管道系统失去密闭性，外界气体可进入形成气胸，应及时钳闭引流管近端，恢复系统的密闭性，之后再进一步处理。6 题选 C。水封瓶中长管与病人的胸腔内引流管相通，若胸腔引流管通畅，随着病人的呼吸，因胸腔内压力的变化，长管内的水柱也可出现波动。7 题选 E。搬运病人的过程中，可能出现连接处脱节、引流瓶破损或高于引流管引、出处等情况，为防止意外发生，应用两把止血钳夹闭引流管。8 题选 D。

40. 共用题干

男性，60 岁，心窝部饥饿性疼痛 10 余年，近年来发作频繁，疼痛规律消失，经胃镜证实为十二指肠球后溃疡。如果该病人住院当日，大量呕血后晕倒，其治疗措施应选用

A. 输平衡氯化钠液

B. 输血 200ml+间羟胺

C. 代血浆 500ml+多巴胺

D. 输血 800ml，静滴西咪替丁

E. 口服去甲肾上腺素 10mg

答案：D

本题解析：

本组题考查十二指肠溃疡相关知识点。对于病史较长的十二指肠溃疡，且从临床表现看其症状逐渐加重，其最合理的治疗方法是外科手术治疗。10 题选 E。多数十二指肠溃疡大出血经非手术治疗止血，病人在大量呕血后晕倒，说明出血量大，应及时输血以补充血容量，同时应用抑酸剂保护胃黏膜。11 题选 D。病人出血后 4 小时，经输血等治疗后，脉搏 140 次/分，血压 80/50mmHg，有休克迹象，此时应立即手术。12 题选 D。大多数溃疡病出血的病人应行胃大部切除术，在病情危急时，可采用贯穿缝扎止血术，待病人情况稳定后再行胃大部切除术。13 题选 B。

41. 共用题干

女 30 岁，3 年前结婚后经常发生腰痛，尿急、尿频、尿痛，并有发热而就诊。如由感染所致。最常见的病原菌是

A. 军团菌

B. 铜绿假单胞菌

C. 葡萄球菌

D. 肺炎球菌

E. 大肠埃希菌

答案：E

本题解析：

暂无解析

42. 共用题干

男性，33 岁，左小腿被锈铁钉刺伤一段时间后出现乏力、头疼、打哈欠，继而有张口困难、蹙眉和苦笑面容等表现，全身肌肉阵发性痉挛，但神志一直清醒，诊断为破伤风。对该病人护理措施正确的是

A. 让家属经常探视

B. 病室阳光充足，经常开窗通风

C. 伤口敷料使用后高压灭菌

D. 避免各种护理操作集中进行

E. 各项操作在注射镇静剂后进行

答案：E

本题解析：

本组题考查破伤风相关考点。控制并解除痉挛是破伤风发作时的重要环节。6题选A。破伤风病人痉挛严重发作时要注意呼吸道通畅，防止病人出现窒息。7题选B。应将病人安置于隔离病室，保持安静，减少一切刺激，遮光，防止噪音。各种动作包括说话、走路都要低声、轻巧，治疗、护理等各项操作尽量集中，可在用镇静药30分钟内进行，以免刺激打扰病人而引起抽搐。破伤风杆菌具有传染性，为防止播散，伤口敷料在使用后应进行高压蒸汽灭菌。8题选E。

43. 患者，男性，73岁，河南林县人。因食管癌入院手术治疗，查体：身高1.75m，体重50kg，P85次/分，R18次/分，既往吸烟50年，平时喜食腌制食品。有一兄因食管癌去世。此患者出院后1个月又出现吞咽不畅，可能的原因是

- A. 反流性食管炎
- B. 吻合口溃疡
- C. 食管癌复发
- D. 吻合口狭窄
- E. 肠梗阻

答案：D

本题解析：
暂无解析

44. 男性，23岁，因第4胸椎椎体单纯压缩骨折卧床休息。骨折后早期胸腰部的功能锻炼方法是

- A. 三点法
- B. 四点法
- C. 五点法
- D. 俯卧挺胸法
- E. 飞燕点水法

答案：C

本题解析：

胸椎骨折后早期胸腰部的功能锻炼方法是五点法；双下肢的功能锻炼方法是主动活动。

45. 患者男性，42岁。于5小时前发生车祸，当时昏迷，无呕吐，急诊收治入院。入院后患者神志恢复清醒，瞳孔左:右=2.5mm:2.5mm，光反应(+)，颈无抵抗，四肢自主活动，躁动不安，头颅CT片示：右颞硬膜外血肿，出血量约15ml，中线未偏移，严密观察病情，给予止血等对症支持治疗。入院后4小时患者再次昏迷，瞳孔左:右=2.5mm:3.5mm，光反应左侧(+)右侧(±)，右侧肢体刺激可动，左侧肢体无活动，并伴有喷射状呕吐。患者再次行头颅CT示：血肿较前增大，中线偏移。患者应紧急接受的治疗是

- A. 继续止血对症治疗
- B. 全麻下行"右颞硬膜外血肿清除术"
- C. 血肿腔钻孔引流术
- D. 进行颅内压监测
- E. 行血管造影术

答案：B

本题解析：

神经系统病变：颅脑外伤、脑梗塞、脑肿瘤、炎症、变性病、先天畸形等，为应用最早的人体系统，尤其是创伤性颅脑急症诊断中属于常规和首选检查方法，可清楚显示脑挫裂伤、急性脑内血肿、硬膜外及硬膜下血肿、颅面骨骨折、颅内金属异物等，而且比其它任何方法都要敏感。CT诊断急性脑血管疾病如高血压脑出血、蛛网膜下腔出血、脑动脉瘤及动静脉畸形破裂出血、脑梗塞等有很高价值，急性出血可考虑作为首选检查，急性脑梗塞特别是发病6小时内者，CT不如MRI敏感。

46. 患者，男性，25岁。因高位小肠瘘1天入院，入院后经颈内静脉插管滴肠外营养液，两周后突然出现寒战、高热，无咳嗽、咳痰，腹部无压痛、反跳痛。观察8小时如仍有高热，应采取的措施为

- A. 肠外营养液中加胰岛素
- B. 雾化吸入
- C. 胸腔穿刺抽气
- D. 拔除中心静脉导管
- E. 咽拭子细菌培养

答案：D

本题解析：

患者行中心静脉插管，胸腹无异常表现，找不到原因的寒战、高热考虑导管性脓毒症。

47. 患者女性，30岁。剖宫产一女，为了做好月子产后未曾下床，20天时，出现左下肢肿胀，剧痛，苍白，有压痛，活动加剧。查体：T38.1℃，P102次/分，R24次/分，足背动脉搏动减弱。该患者可能出现

- A. 浅静脉炎
- B. 原发性大隐静脉曲张
- C. 动脉硬化闭塞症
- D. 下肢深静脉血栓形成
- E. 血栓闭塞性脉管炎

答案：D

本题解析：

1. 该患者剖宫产，为了做好月子产后未曾下床，因此易引发深静脉血栓。
2. 这是一道临床诊断和正确实施护理预防并发症的综合性题目，根据提供的信息，手术，分娩，长期卧床等是引发深静脉血栓形成的重要因素。
4. 为了预防深静脉血栓形成应对手术后，产后妇女进行指导，鼓励其早期床上活动，包括深呼吸，下肢的被动及主动活动，如膝，踝，趾关节的伸屈，举腿活动。若病情允许，鼓励此类病人尽早离床活动。避免用过紧的腰带，丝袜和紧身衣物。

48. 患者男性，32岁。渐进性尿频，尿急，尿痛，血尿3年，近1年来每日排尿数十次，每次尿量不足50ml，尿常规：红细胞(++)白细胞(++)。下列各项检查中不适宜进行的是

- A. 尿培养(普通)
- B. 尿沉渣找抗酸杆菌
- C. 尿结核菌培养与动物接种
- D. B超
- E. 膀胱镜与逆行造影

答案：E

本题解析：
暂无解析

49. 患者，男性，74岁。无痛间歇性血尿2年，反复左肋隙部剧痛三个月。膀胱镜检查膀胱侧壁三角区散在菜花状肿瘤带蒂，左输尿管口喷血。该患者应采用的手术方案是

- A. 膀胱部分切除术
- B. 膀胱全切术
- C. TUPBT
- D. 根治性左肾切除术
- E. 左肾输尿管全切膀胱部分切术

答案：E

本题解析：

1. 根据题干信息，经膀胱镜检查可见膀胱占位性病变，故可判定膀胱癌；继之，左肋隙部剧痛，应考虑为肾癌，故其诊断为膀胱癌和肾癌。【该题针对“实践能力-泌尿，男生殖系疾病的主要症状和检查”知识点进行考核】
2. 肾盂及膀胱造影了解肿瘤大小，形态等情况。【该题针对“实践能力-泌尿，男生殖系疾病的主要症状和检查”知识点进行考核】
3. 根据病理及肿瘤位置，应选择联合治疗方式。【该题针对“实践能力-泌尿，男生殖系疾病的主要症状和检查”知识点进行考核】

50. 女性，65岁，因急性化脓性阑尾炎阑尾穿孔急诊行手术治疗，出院后2个月饱餐后出现腹胀、腹痛、呕吐，呕吐物为胃内容物。查体：全腹膨隆，有轻压痛，无反跳痛及肌紧张。该病人可能出现了

- A. 腹腔脓肿
- B. 腹腔内出血
- C. 粘连性肠梗阻
- D. 胆瘘
- E. 切口感染

答案：C

本题解析：
暂无解析

51. 患者女性，38岁。已婚，2年来常感下腹部隐痛不适，12小时前突起转移性右下腹痛，伴恶心，呕吐，发热，查右下腹明显压痛，反跳痛，肌紧张。血常规：WBC $16\times 10^9/L$ ，N0.88。尿常规无特殊异常。该患者诊断为急性化脓性阑尾炎并腹膜炎，手术后第4天出现下腹坠胀不适，大便次数增多，里急后重，排尿困难等现象。首先考虑可能的原因为

- A. 急性肠胃炎
- B. 盆腔脓肿
- C. 急性附件炎
- D. 直肠癌
- E. 泌尿系感染

答案：B

本题解析：
盆腔脓肿多由急性盆腔结缔组织炎未得到及时的治疗，化脓形成盆腔脓肿，这种脓肿可局限于子宫的一侧或双侧，脓液流入于盆腔深部，甚至可达直肠阴道隔中

52. 共用题干
某一所医院正在筹备建设过程中，医院筹备委员会要求主管护理的委员会成员进行一系列工作。在最终组织设计的结果中，用以说明组织内部的某一特定职位的责任，义务，权力及工作关系的书面文件，称为

- A. 组织职位图
- B. 职位工作内容
- C. 职位工作关系
- D. 职位说明书
- E. 组织职位素质要求

答案：D

本题解析：
按组织设计要求，决定组织的层次及部门结构，形成层次化的组织管理系统是属于提出组织结构的基本框架。7选C。设计组织的运作方式包括：①联系方式的设计，即设计各部门之间的协调方式和控制手段；②管理规范的设计，确定各项管理业务的工作程序，工作标准和管理人员应采用的管理方法等；③各类运行制度的设计。8选E。组织设计的结果是形成组织结构。包括组织图，职位说明书和组织手册。其中职位说明书是说明组织内部的某一特定职位的责任，义务，权力及其工作关系的书面文件。包括：职位名称及素质能力要求，工作内容和劳动关系等。9选D。

53. 共用题干
男性，73岁，下肢骨折术后一直卧床，术后第7天突然出现左小腿剧痛，肿胀且有深压痛，左足过度背屈时小腿肌肉疼痛剧烈。若该病人准备接受手术治疗去除病因，手术最好是在发病后

- A. 3天内
- B. 5天内
- C. 7天内
- D. 10天内
- E. 12天内

答案：A

本题解析：
该病人为老年男性，术后卧床7天出现左小腿剧痛，肿胀且有深压痛，左足过度背屈时小腿肌肉疼痛剧烈，可能出现了下肢深静脉血栓。6题选B。下肢急性深静脉血栓病人，须卧床休息两周，患肢抬高离床面20~30cm，下床活动时穿弹力袜或应用弹力绷带，以增加静脉回流。严禁按摩患肢以防栓子脱落引起栓塞。下肢深静脉血栓形成的并发症较少考到。7题选D。发病72小时以内手术效果较好，因为手术时间越早，血栓与静脉壁粘连和炎症反应的程度越轻，可减少手术取栓后继发性血栓形成。8题选A。

54. 共用题干
男性，56岁，头痛4个月，多见于清晨，常出现癫痫发作，经检查诊断为颅内占位性病变、颅内压增高，拟行开颅手术。颅内压正常值为

- A. 0.2~0.6kPa
- B. 0.7~2.0kPa
- C. 2.1~3.0kPa

D. 3.1~3.6kPa

E. 3.7~4.6kPa

答案：B

本题解析：

成年人正常颅内压 0.7~2.0kPa。5 题选 B。头痛、呕吐、视神经盘水肿是颅内压增高病人的主要表现，合称颅内压增高三主征。6 题选 E。用肥皂水灌肠可使病人腹内压增高，使颅内压力骤升而导致颅内压危象。7 题选 D。该病人目前已出现小脑幕切迹疝表现，题中的五方面均是脑疝病人急救处理措施，但最先应采取脱水治疗，尽快降低颅内压，在此基础上，采取其他措施。8 题选 C。对于急性颅内压增高、脑疝病人禁忌采用腰椎穿刺，因可诱发或加重脑疝。9 题选 A。出现脑脊液漏时，应取头高患侧卧位，不可堵塞、冲洗、滴药，避免用力咳嗽、打喷嚏。10 题选 E。11~

55. 患者，女性，30 岁，半年前扭伤左膝关节，后左膝关节内侧疼痛，肿胀逐渐加重，X 线见左胫骨上段 4cm×5cm 大小的透光区，中央有肥皂泡阴影，骨端膨大。近 1 个月来肿胀明显，但夜间疼痛加剧，关节活动受限，再次拍 X 线片示胫骨上段病变扩大，肥皂泡沫阴影消失，呈云雾状阴影，肿瘤组织已侵入软组织。手术后应定期进行

A. 抗生素治疗

B. 化学药物治疗

C. 放射治疗

D. X 线检查

E. 免疫治疗

答案：B

本题解析：

骨肿瘤病人 X 线见有肥皂泡阴影，骨端膨大。该患者可能的诊断是骨巨细胞恶变最恰当的处理是截肢；手术后应定期进行化学药物治疗。

56. 患者，男性，67 岁，有长期吸烟史，脊柱手术后卧床 2 周，出现右腿小腿疼痛、紧束感，并逐渐出现下肢水肿。护士应考虑到患者可能出现了

A. 肌肉萎缩

B. 水、电解质紊乱

C. 关节炎

D. 切口感染

E. 下肢深静脉血栓形成

答案：E

本题解析：

下肢静脉血栓多见于术后长期卧床、活动减少的老年人和肥胖者，表现为小腿腓肠肌疼痛、静脉血栓以下部位肿胀。

57. 初产妇 25 岁，产后 15 天，右乳胀痛伴发热、寒战。查体：T39℃，右乳出现肿块 4cm×4cm，有压痛感。最可能的诊断为（ ）

A. 急性乳腺炎

B. 乳癌

C. 乳房纤维状瘤

D. 乳管内乳头状瘤

E. 乳腺囊性增生

答案：A

本题解析：

急性乳腺炎的主要症状为患侧乳房红、肿、发热，伴压痛感。当脓肿出现时最佳的处理就是及时排脓，以利于炎症早日消散。胸罩太紧不利于血液循环，即不利于炎症的消散。

58. 共用题干

患者王某，女，32 岁，在得知自己被确诊为乳腺癌早期时，忍不住躺在病床上失声痛哭。这时护士小高轻轻走近王某，在她的床边坐下，默默递给她一张面巾纸，并轻轻地拍拍她的肩膀。从人际传播技巧上说，小王的传播行为属于

A. 谈话技巧

B. 提问技巧

C. 倾听技巧

D. 反馈技巧

E. 非语言传播技巧

答案：E

本题解析：

动态体语是通过无言的动作传情达意，在这里小王正是以动作来表示对患者的关心和理解。17 选 A。非语言传播技巧是通过动作、体态、姿势、仪表以及人际交往的时间、空间等来传递信息和情感，这里针对患者激动的情绪，小王正是采用了非语言传播技巧中的动态体语来表达对患者的理解和安慰。18 选 E。19～

59. 男性，65 岁，有慢性便秘多年。近半年来发现站立时阴囊部位出现肿块，呈梨形，平卧时可还纳。体检发现外环扩大，压迫内环嘱患者咳嗽，指尖有冲击感，平卧回纳肿块后，手指压迫内环处，站立咳嗽，肿块不再出现。术后当天患者宜采用的体位是

A. 半卧位

B. 端坐位

C. 斜坡卧位

D. 头低脚高位

E. 平卧位

答案：E

本题解析：

1. 根据该患者的表现考虑为腹股沟斜疝。2. 术前最重要的是解除腹内压增高的因素，即解除便秘。4. 可托起阴囊，用沙袋压迫伤口以减轻阴囊血肿。5. 正常情况下，因为疝修补术为非胃肠道手术，术后第二天可进普食。

60. 男性，28 岁，被沸水烫伤，左上肢，颈部，胸腹部，双足和双小腿均有水泡，有剧痛，右手掌焦痂呈皮革样，不痛，面部红斑，表面干燥，低容量性休克。估计该病人烧伤面积为

A. 54%

B. 49%

C. 58%

D. 50%

E. 39%

答案：D

本题解析：

左上肢为 9，颈部为 3，手掌为 5，胸腹部为 13，双足为 7，双小腿为 13，合计 50(%)。

61. 患者，男性，42 岁。甲亢病史 5 年，经内科治疗无效决定手术治疗。术后患者饮水呛咳，有可能为手术引起

A. 双侧喉返神经损伤

B. 单侧喉返神经损伤

C. 喉上神经外侧支损伤

D. 喉上神经内侧支损伤

E. 气管软化塌陷

答案：D

本题解析：

饮水呛咳，为手术引起喉上神经内侧支损伤；喉上神经内侧支是感觉支；患者服用碘化钾溶液的目的是减轻甲状腺血管充血，手术时减少出血，抑制甲状腺素的释放。

62. 病人，男性，36 岁，暴饮暴食后突发腹痛，疼痛呈持续性并阵发加重，伴呕吐，体温升高，被诊为急性坏死性胰腺炎，急诊行手术治疗。术后第 4 天病人体温降至正常后又升高至 39.5℃，精神不振，寒战，无腹痛腹胀，伤口引流液少，应警惕其可能发生了

- A. 空气栓塞
- B. 低血糖症
- C. 高血糖症
- D. 导管败血症
- E. 急性胰腺炎复发

答案：D

本题解析：

急性坏死性胰腺炎行手术治疗后第2天营养供给应采取完全胃肠外营养，避免刺激胰腺分泌胰液；术后第4天病人体温降至正常后又升高至39.5℃，精神不振，寒战，无腹痛腹胀，伤口引流液少，应警惕其可能发生了导管败血症；给此病人静脉输注20%脂肪乳剂250ml需要4~5小时，输注太快容易发生高脂血症。

63. 患者，男性，77岁，不慎跌倒时以手掌撑地，造成Colles骨折。该患者患处的典型表现可能是

- A. 方肩畸形
- B. 肘后三角关系失常
- C. 旋前、屈腕、尺偏位
- D. 正面观"餐叉"畸形
- E. 正面观"枪刺刀"畸形

答案：E

本题解析：

1. 不慎跌倒时以手掌撑地为间接暴力。
2. 桡骨远端骨折侧面可见"餐叉"样畸形，正面观呈"枪刺刀"畸形。手法复位：患肢前臂固定于旋前、屈腕、尺偏位。

64. 患者男性，45岁。行"全麻下胃大部切除术"后被送回病房。监测患者意识清醒，T37.8℃，P95次/分钟，R24次/分钟，BP140/90mmHg。患者出现呼吸困难，呼吸有鼾声，继而出现鼻翼扇动，三凹征。预

防和处理该并发症的措施不包括

- A. 及时清除咽喉分泌物或异物
- B. 轻度喉头水肿者给予糖皮质激素
- C. 喉痉挛者必要时行气管内插管
- D. 舌后坠者迅速将下颌托起，放入口咽或鼻咽通气管
- E. 立即静注支气管解痉剂

答案：E

本题解析：

1. 全麻并发症呼吸道梗阻包括上呼吸道梗阻和下呼吸道梗阻，上呼吸道梗阻时，如为不全梗阻时表现为呼吸困难并有鼾声，完全梗阻时有鼻翼煽动和三凹征。下呼吸道梗阻轻者出现肺部啰音，重者出现呼吸困难，潮气量降低，发绀，心率加快，血压下降等表现。
2. 上呼吸道梗阻常见原因为机械性梗阻，如舌后坠，口腔分泌物阻塞，异物阻塞，喉头水肿，喉痉挛等。下呼吸道梗阻常见原因为气管导管扭折，导管斜面过长而紧贴在气管壁上，分泌物或呕吐物误吸，支气管痉挛等。
3. 患者为上呼吸道梗阻，不存在支气管痉挛，因此无需应用支气管解痉剂。

65. 患者女性，52岁。晚餐后洗衣时突发剧烈头痛、恶心、喷射性呕吐，随后意识模糊，被家人送至医院，急行CT检查呈高密度影，脑膜刺激征阳性，无肢体瘫痪，既往体健。该患者相关描述不正确的是

- A. 脑血管造影是确诊颅内动脉瘤必需的检查方法
- B. 破裂出血流至蛛网膜下隙导致患者出现上述临床表现
- C. 严重者因颅内压增高引发脑疝而危及生命
- D. 为了防止出血和再出血，应及早行手术或介入治疗
- E. 降颅压应缓慢，防止出现并发症

答案：E

本题解析：

2. 对于蛛网膜下腔出血造成颅内压增高的患者，应在及时降颅压治疗的前提下尽早完成脑血管造影检查，为防止再次出血，及早手术或介入治疗。

66. 某社区卫生服务站预计对居民进行系统的健康教育，他们通过文献、档案、专题小组讨论等方法对辖区居民的各种基本特征、居民对各种干预措施的看法等进行了评价。该社区卫生服务站所实施的评价属于

- A. 形成性评价
- B. 过程评价
- C. 效应评价
- D. 结局评价
- E. 总结评价

答案：A

本题解析：

1. 形成性评价的方法有文献、档案、资料的回顾、专家咨询、专题小组讨论等，其具体内容包括：①目标人群的各种基本特征；②目标人群对各种干预措施的看法；③教育材料发放系统；④是否在最初的计划执行阶段根据出现的新情况、新问题对计划进行适度调整。
2. 健康教育评价的目的主要包括：①确定健康教育计划的先进性和合理性；②确定健康教育计划的执行情况；③确定健康教育目标的实现及持续性；④总结健康教育的成功与不足之处，提出进一步的研究假设。E 选项“确定目标人群对各种干预措施的看法”属于形成性评价的内容而非目标。

67. 某病房患者总数为 40 人，其中一级护理 9 人，二级护理 16 人，三级护理 15 人。经测定各级护理中每名患者在 24 小时内所需的平均护理时数分别为 5.5 小时，3 小时，1 小时。按一个病房 40 张床测算一日间接护理所需时间为 20 小时。该病房平均护理时数约是

- A. 12.4 小时
- B. 9.5 小时
- C. 3.75 小时
- D. 3.31 小时
- E. 2.5 小时

答案：D

本题解析：

1. 病房各级患者护理时数的总和= $5.5 \times 9 + 3 \times 16 + 1 \times 15 + 20 = 132.5$ 小时。
2. 平均护理时数=各级患者护理时数的总和 ÷ 该病房患者总数，即：该病房平均护理时数= $(5.5 \times 9 + 3 \times 16 + 1 \times 15 + 20) \div 40 \approx 3.31$ (小时)。
3. 按工作量计算护理人员编制时，应编护士数=病房床位数 × 床位使用率 × 平均护理时数 ÷ 每名护士每日工作时间，其中床位使用率=占用床位数 ÷ 开放床位数 × 100%。因此，护士数= $40 \times 100\% \times 3.3 \div 8 \approx 17$ (人)。
4. 一般机动编制数占 20%，故应编护士数=病房床位数 × 床位使用率 × 平均护理时数 ÷ 每名护士每日工作时间 + 机动数，应编护士数= $40 \times 100\% \times 3.3 \div 8 \times (1 + 20\%) \approx 20$ (人)，即该医院应实际配置 20 名护理人员。

68. 患者，女性，50 岁。破伤风住院，全身肌肉紧张性收缩，阵发性痉挛。治疗的中心环节是以下哪项

- A. 隔离
- B. 应用青霉素
- C. 应用 TAT
- D. 密切观察
- E. 应用镇静解痉药

答案：E

本题解析：

TAT 可以中和游离毒素。

69. 共用题干

女性，42 岁。主诉：因无意中发现左乳肿物半年、无疼痛，近日逐渐增大而来院就诊。体检：触及左乳外上象限 3cm 肿物，质硬、边界不清，腋下可触及多个淋巴结。术后患者出院指导哪一项是错误的

- A. 术后 3~5 年内避免妊娠，因妊娠常使乳腺癌复发
- B. 出院时帮助患者戴上暂时性无重量假乳房
- C. 遵医嘱坚持放疗、化疗，并定期到医院复查
- D. 出院后不用患侧上肢测血压、静脉穿刺，避免皮肤破损，减少感染发生

E. 注意功能锻炼，患肢作爬墙运动、举杠运动、转绳运动、提拉搬动重物

答案：E

本题解析：

本组题考查乳腺癌的相关考点。乳腺癌早期为无痛、单发的小肿块，质硬，表面不光滑，与周围组织分界不清。病人常无自觉症状，肿块多在无意中发现。根据病人的临床表现，乳腺癌的可能性最大。5题选E。该病人肿块直径3cm，腋下可触及多个淋巴结，为II期乳腺癌，可采用乳腺癌改良根治术来治疗。6题选A。乳腺癌病人出院后要注意保护患侧上肢，不在患侧上肢测血压、静脉穿刺，避免皮肤破损；术后5年内应避免妊娠，防止乳腺癌复发；遵医嘱坚持放疗、化疗，定期到医院复查；根据病人需要可佩戴暂时性无重量假乳房；注意功能锻炼，患肢可做爬墙运动、转绳运动等，但应避免举杠运动及提拉搬动重物。7题选E，2013年有考察。

70. 患者男性，32岁。渐进性尿频，尿急，尿痛，血尿3年，近1年来每日排尿数十次，每次尿量不足50ml，尿常规：红细胞(++)白细胞(++)。病人应首选的检查是

- A. 肾图
- B. 前列腺液常规检查
- C. KUB+IVP
- D. 膀胱镜
- E. 双肾、膀胱CT扫描

答案：C

本题解析：

暂无解析

71. 患者，男性，74岁。无痛间歇性血尿2年，反复左肋间隙剧痛三个月。膀胱镜检查膀胱侧壁三角区散在菜花状肿瘤带蒂，左输尿管口喷血。该患者首选的检查是

- A. CT
- B. 肾盂造影+膀胱造影
- C. 尿脱落细胞检查

D. B超

E. 腹部平片

答案：B

本题解析：

1. 根据题干信息，经膀胱镜检查可见膀胱占位性病变，故可判定膀胱癌；继之，左肋间隙剧痛，应考虑为肾癌，故其诊断为膀胱癌和肾癌。【该题针对“实践能力-泌尿，男生殖系疾病的主要症状和检查”知识点进行考核】
2. 肾盂及膀胱造影了解肿瘤大小，形态等情况。【该题针对“实践能力-泌尿，男生殖系疾病的主要症状和检查”知识点进行考核】
3. 根据病理及肿瘤位置，应选择联合治疗方式。【该题针对“实践能力-泌尿，男生殖系疾病的主要症状和检查”知识点进行考核】

72. 男性，65岁，有慢性便秘多年。近半年来发现站立时阴囊部位出现肿块，呈梨形，平卧时可还纳。体检发现外环扩大，压迫内环嘱患者咳嗽，指尖有冲击感，平卧回纳肿块后，手指压迫内环处，站立咳嗽，肿块不再出现。医生决定为该患者行疝修补术，为避免术后疾病复发，术前准备中最重要的

- A. 灌肠
- B. 备皮
- C. 排尿
- D. 治疗便秘
- E. 麻醉前用药

答案：D

本题解析：

1. 根据该患者的表现考虑为腹股沟斜疝。
2. 术前最重要的是解除腹内压增高的因素，即解除便秘。
4. 可托起阴囊，用沙袋压迫伤口以减轻阴囊水肿。
5. 正常情况下，因为疝修补术为非胃肠道手术，术后第二天可进普食。

73. 患者女性，57岁。阵发性右上腹绞痛伴高热，体温38.5℃，诊断为急性化脓性胆管炎，急诊行胆囊切除术，胆总管探查，T管引流术。术后放置T管的目的不包括

A. 预防胆汁性腹膜炎

B. 防止胆管狭窄、梗阻等并发症

C. 支撑胆道

D. 防止胆道出血

E. 引流胆汁

答案：D

本题解析：

试行夹管 1~2 日，夹管期应注意观察病情，病人若无发热、腹痛、黄疸等症状，可行 T 管作胆道造影，若造影无异常发现，在持续开放 T 管 24 小时充分引流造影剂后，再次夹管 2~3 日，病人仍无不适时即可拔管。

74. 男性，58 岁，进行性贫血、消瘦、乏力半年，有时右腹有隐痛，无腹泻。查体：贫血貌，右中腹可触及肿块，肠鸣音活跃。考虑该病人的诊断可能为

A. 胆囊肿瘤

B. 结肠癌

C. 阑尾周围脓肿

D. 克罗恩病

E. 溃疡性结肠炎

答案：B

本题解析：

暂无解析

75. 4 岁患儿，3 天前突发高热，体温 39.5℃，伴寒战，诉右膝部疼痛，给予抗生素治疗后效果不明显，发病后每天只进少量饮食，现患儿膝部皮肤发红发热，肿胀和疼痛越来越严重，膝关节呈半屈曲状，血白细胞计数 $20.5 \times 10^9/L$ ，X 线检查示膝关节周围软组织肿胀，关节间隙增宽。最可能发现的阳性体征是

A. 拾物试验阳性

B. 浮髌试验阳性

C. "4" 字试验阳性

D. 托马斯实验阳性

E. 脊柱过伸试验阳性

答案：B

本题解析：

暂无解析

第 II 卷

一. 单选题(共 75 题)

1. 某病房患者总数为 40 人，其中一级护理 9 人，二级护理 16 人，三级护理 15 人。经测定各级护理中每名患者在 24 小时内所需的平均护理时数分别为 5.5 小时，3 小时，1 小时。按一个病房 40 张床测算一日间接护理所需时间为 20 小时。病房各级患者总护理时数和约为

A. 495 小时

B. 380 小时

C. 150 小时

D. 132.5 小时

E. 100 小时

答案：D

本题解析：

1. 病房各级患者护理时数的总和= $5.5 \times 9 + 3 \times 16 + 1 \times 15 + 20 = 132.5$ 小时。

2. 平均护理时数=各级患者护理时数的总和÷该病房患者总数，即：该病房平均护理时数= $(5.5 \times 9 + 3 \times 16 + 1 \times 15 + 20) \div 40 \approx 3.31$ (小时)。

3. 按工作量计算护理人员编制时，应编护士数=病房床位数×床位使用率×平均护理时数÷每名护士每日工作时间，其中床位使用率=占用床位数÷开放床位数×100%。因此，护士数=40×100%×3.3÷8≈17（人）。

4. 一般机动编制数占20%，故应编护士数=病房床位数×床位使用率×平均护理时数÷每名护士每日工作时间+机动数，应编护士数=40×100%×3.3÷8×（1+20%）≈20（人），即该医院应实际配置20名护理人员。

2. 患者男性，61岁。腹部挤压伤后48小时发生急性腹膜炎，立即给予手术，术中发现结肠穿孔，放置腹腔引流，术后带呼吸机返回ICU。患者烦躁，体温39℃，呼吸急促，FiO₂75%，PaO₂80mmHg，心率110次/分，血压100/70mmHg。对该患者护理措施不正确的是

- A. 动态监测患者的心率, 血压, CVP 和尿量
- B. 预防感染
- C. 对患者隐瞒病情, 防止焦虑
- D. 保持人工气道湿化
- E. 做好心理护理

答案：C

本题解析：

1. 根据病情介绍，患者既往无慢性肺部疾患，术后早期心率, 血压正常可排除心脏原因。在呼吸机辅助呼吸下，氧合指数 PaO₂ / FiO₂ = 80 / 0.75 < 200mmHg，加之重症创伤后，存在发生 ARDS 的诱因，考虑 ARDS。此题选 B。

2. 该患者体温高，在呼吸机辅助呼吸下，氧合指数 < 200mmHg，为 ARDS 进展期，应给予 PEEP 通气治疗。目的是使肺泡在整个呼吸周期保持开放，此题选择 B。

3. 做好 ARDS 的呼吸道管理，保持人工通气管的湿化，每小时评估病人的呼吸状况，有效叩背，维护循环功能持续监测病人的心率, 血压变化，监测尿量，合理补液，监测中心静脉压的变化。预防感染，提供足够的营养，做好心理护理是护理 ARDS 患者正确的护理措施。此题选 C。

3. 患者，男性，77岁，不慎跌倒时以手掌撑地，造成 Colles 骨折。手法复位纠正该畸形时，应将骨折远端

- A. 向手背侧挤压
- B. 向手掌侧挤压

- C. 向手臂桡侧挤压
- D. 向手臂尺侧挤压
- E. 轻柔旋转复位

答案：D

本题解析：

1. 不慎跌倒时以手掌撑地为间接暴力。

2. 桡骨远端骨折侧面可见“餐叉”样畸形，正面观呈“枪刺刀”畸形。手法复位：患肢前臂固定于旋前、手腕、尺偏位。

4. 患者，男性，35岁。尺骨骨折，小夹板固定。夹板固定适当的扎带松紧度是

- A. 活动范围 1cm
- B. 活动范围 1.5cm
- C. 活动范围 2cm
- D. 活动范围 3cm
- E. 扎带后不能活动

答案：A

本题解析：

暂无解析

5. 患者男性，62岁。高血压史20年，情绪激动后突发剧烈头痛，头晕，呕吐继而出现意识障碍，立即送医院行立即开颅血肿清除术，术中置入脑室外引流管一根。术后护理措施不妥的是

- A. 手术后若昏迷不醒，鼻饲后可随意搬动患者不易引发呕吐和误吸
- B. 待意识清醒后抬高床头 15° ~ 30°，以利颅内静脉回流
- C. 注意观察切口敷料及引流情况，加强敷料更换和保持清洁干燥
- D. 全麻未清醒时取侧卧位，以利于呼吸道护理

E. 密切观察患者有无呼吸困难、烦躁不安等呼吸道梗阻的情况，以便及时处理误吸

答案：A

本题解析：

3. 手术后长期昏迷的患者，鼻饲后不可随意搬动患者以免引发呕吐和误吸；每天更换引流袋时应夹闭引流管，以免引起逆行感染；若引流管无脑脊液流出原因中，引流管放入脑室过短为错误，应为引流管过长继而盘旋成角。

6. 张女士，70岁，独居。双手腕、掌指、肘关节疼痛、肿胀，时轻时重，病程约25年，诊断为“类风湿性关节炎”。护理体检发现，患者双手呈天鹅颈样畸形，饮食起居困难。目前最主要的护理诊断是

- A. 疼痛、关节痛
- B. 自理缺陷
- C. 功能障碍性畸形
- D. 有废用综合征的危险
- E. 焦虑

答案：D

本题解析：

类风湿性关节炎目前认为主要是免疫性疾病，与情绪关系不大；关节畸形有废用综合征的危险。指导病人在病情许可的情况下应鼓励病人尽早活动，活动前关节局部辅以温热疗法，按摩，改善局部循环，达到去肿和镇痛的效果。

7. 共用题干

男性，40岁，尿频、尿急、尿痛5年，有时出现肉眼血尿。体检：贫血貌，血尿素氮 33mmol，肌酐 612mmol，尿常规脓细胞 20~30 个/HP，B超显示：膀胱容量小，每次排尿 50ml。该病不宜检查的项目为

- A. 膀胱镜
- B. 尿结核菌培养
- C. CT 检查

D. 尿培养+药敏

E. B超

答案：A

本题解析：

该病人有膀胱刺激症状，尿中有脓细胞，B超示膀胱容量小，提示存在肾结核引起的膀胱挛缩，同时肾功能较差，只有一侧肾结核，一侧肾积水可能会导致该病人的相应状况。4题选C。尿液检查尿呈酸性，有脓细胞、少量蛋白及红细胞。连续三次进行清晨尿液结核杆菌检查，若结果为阳性对诊断肾结核有决定性意义。5题选D。该病人有膀胱挛缩，若进行膀胱镜检查可能会引起膀胱损伤，6题选A。

8. 共用题干

某医院有开放病床 1000 张，按照卫生部《综合医院组织编制原则试行草案》的最高要求标准回答下列问题。全体工作人员的最大编制数约为

- 1000
- 1200
- 1300
- 1400
- 1500

答案：D

本题解析：

根据卫生部《编制原则》，500张床位以上的，病床与工作人员之比按 1: 1.60~1: 1.70 计算。即 1000*1.6~1000*1.7=1600~1700 (人)。3 选 D。根据卫生部《编制原则》，卫生技术人员占医院总编制的 70%~72%，则最多配置 1700*72%=1224 (人)。4 选 B。根据卫生部《编制原则》，护理人员占卫生技术人员最大编制数的 50%，应为 1224*50%=612 (人)。5 选 B。6~

- 1000
- 1200
- 1300
- 1400
- 1500

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

答案: B

本题解析:

暂无解析

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

答案: C

本题解析:

全肺切除术后的胸腔引流管一般呈钳闭状态,以保证术后患侧胸腔内有一定的渗液,减轻或纠正明显的纵隔移位。全肺切除术后患者应控制钠盐摄入量,一般而言,24小时补液量宜控制在2000ml内,速度以20~40滴/分为宜。避免过度侧卧,可采取1/4侧卧位,以预防纵隔移位和压迫健侧肺而导致呼吸循环功能障碍。注意观察患者的呼吸情况,出现呼吸困难,胸闷,气管向健侧移位时,可酌情放出适量的气体或引流液,以维持气管、纵隔于中间位置。每次放液量不宜超过100ml,速度宜慢,避免快速多量放液引起纵隔突然移位,导致心脏骤停。

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

答案: D

本题解析:

暂无解析

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

答案: B

本题解析:

盆腔脓肿多由急性盆腔结缔组织炎未得到及时的治疗,化脓形成盆腔脓肿,这种脓肿可局限于子宫的一侧或双侧,脓液流入于盆腔深部,甚至可达直肠阴道隔中

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

答案：A

本题解析：

病人目前出现腹痛、腹胀、呕吐、停止排气排便，病人有脱水症，查体全腹膨隆，可见肠型和蠕动波，脐区压痛，但无腹肌紧张和反跳痛，肠鸣音活跃，有气过水声，考虑为肠梗阻，考虑其在1年前曾因胃穿孔做过胃大部切除术，故粘连性肠梗阻的可能性较大，目前病人未出现肠较窄迹象，故为单纯性的肠梗阻。19题选A。单纯性、粘连性肠梗阻一般采用非手术疗法，包括禁食水、胃肠减压、应用抗生素，纠正水电解质紊乱等。手术治疗适用于绞窄性肠梗阻、非手术治疗无效的肠梗阻、或必须用手术解除梗阻的肠梗阻。20题选E。

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

答案：A

本题解析：

成年人正常颅内压0.7~2.0kPa。5题选B。头痛、呕吐、视神经盘水肿是颅内压增高病人的主要表现，合称颅内压增高三主征。6题选E。用肥皂水灌肠可使病人腹内压增高，使颅内压力骤升而导致颅内压危象。7题选D。该病人目前已出现小脑幕切迹疝表现，题中的五方面均是脑疝病人急救处理措施，但最先应采取脱水治疗，尽快降低颅内压，在此基础上，采取其他措施。8题选C。对于急性颅内压增高、脑疝病人禁忌采用腰椎穿刺，因可诱发或加重脑疝。9题选A。出现脑脊液漏时，应取头高患侧卧位，不可堵塞、冲洗、滴药，避免用力咳嗽、打喷嚏。10题选E。11~

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

答案：E

本题解析：

本组题考查甲亢手术的相关考点。甲亢病人术前准备的重要环节是通过药物降低基础代谢率，常用的药物是复方碘化钾溶液。9题选C。复方碘化钾的服用方法为每日3次，第1日每次3滴，第2日每次4滴，依次逐日每次增加1滴至每次16滴为止，然后维持此剂量。10题选A。甲状腺大部切除术后应注意观察病人生命体征、注意颈部肿胀情况，观察发音和进食情况，嘱病人继续服用复方碘化钾溶液，而不是甲状腺片。11题选E。

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

答案：E

本题解析：

暂无解析

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

答案：D

本题解析：

病人“两个月来体重减轻7.5千克”提示可能患有恶性肿瘤，病人“脂肪餐后腹泻加重”提示胆道系统梗阻，只有胰体癌符合诊断。

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

答案：B

本题解析：

1. 内痔主要表现为排便时无痛性出血和痔块脱出。【该题针对“实践能力-直肠肛管疾病的护理”知识点进行考核】

2. 以排便时无痛性出血，痔块不脱出肛门外。【该题针对“实践能力-直肠肛管疾病的护理”知识点进行考核】

3. I～II期内痔可选用注射疗法，胶圈套扎法。嵌顿性痔初期，应尽早手法还纳痔核。【该题针对“实践能力-直肠肛管疾病的护理”知识点进行考核】

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

答案：D

本题解析：

暂无解析

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

答案：E

本题解析：

暂无解析

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

答案：E

本题解析：

内痔病人痔核脱出肛门外，排便后需用手才能还纳，还纳后不再脱出属于内痔第三期手术前应采取的正确护理措施的是前3天禁食补液，延缓术后排便；第一次排便前适当给予止痛药；因为大便对伤口的刺激会很痛；病人痊愈后应养成定时排便的习惯，避免辛辣食物，加强肛门括约肌舒缩功能练习，每次排便后清洁肛周皮肤。

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

答案：C

本题解析：

胸壁有伤口该损伤的类型为开放性损伤；现场应给予的主要急救措施是封闭伤口，变开放性气胸为闭合性气胸；在运送过程中病人应采取的卧位是患侧卧位。

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

答案：B

本题解析：

成年人正常颅内压0.7~2.0kPa。5题选B。头痛、呕吐、视神经盘水肿是颅内压增高病人的主要表现，合称颅内压增高三主征。6题选E。用肥皂水灌肠可使病人腹内压增高，使颅内压力骤升而导致颅内压危象。7题选D。该病人目前已出现小脑幕切迹疝表现，题中的五方面均是脑疝病人急救处理措施，但最先应采取脱水治疗，尽快降低颅内压，在此基础上，采取其他措施。8题选C。对于急性颅内压增高、脑疝病人禁忌采用腰椎穿刺，因可诱发或加重脑疝。9题选A。出现脑脊液漏时，应取头高患侧卧位，不可堵塞、冲洗、滴药，避免用力咳嗽、打喷嚏。10题选E。11~

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

答案：A

本题解析：

本组题考查乳腺癌的相关考点。乳腺癌早期为无痛、单发的小肿块，质硬，表面不光滑，与周围组织分界不清。病人常无自觉症状，肿块多在无意中发现。根据病人的临床表现，乳腺癌的可能性最大。5 题选 E。该病人肿块直径 3cm，腋下可触及多个淋巴结，为 II 期乳腺癌，可采用乳腺癌改良根治术来治疗。6 题选 A。乳腺癌病人出院后要注意保护患侧上肢，不在患侧上肢测血压、静脉穿刺，避免皮肤破损；术后 5 年内应避免妊娠，防止乳腺癌复发；遵医嘱坚持放疗、化疗，定期到医院复查；根据病人需要可佩戴暂时性无重量假乳房；注意功能锻炼，患肢可做爬墙运动、转绳运动等，但应避免举杠运动及提拉搬动重物。7 题选 E，2013 年有考察。

答案：C

本题解析：

暂无解析

答案：E

本题解析：

1. 根据该患者的表现考虑为腹股沟斜疝。2. 术前最重要的是解除腹内压增高的因素，即解除便秘。4. 可托起阴囊，用沙袋压迫伤口以减轻阴囊水肿。5. 正常情况下，因为疝修补术为非胃肠道手术，术后第二天可进普食。

答案：C

本题解析：

体位：麻醉清醒前采取平卧位，麻醉清醒后，如生命体征平稳，可取半卧位；肺叶切除后可取完全侧卧位，但病情较重、呼吸功能较差者，应避免健侧卧位，以防健侧肺受压，限制其通气；全肺切除后常规取平卧位或 1/4 侧卧位。故该题选 D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/337166121066006143>