

上海肿瘤学模拟题 2021 年(95)

(总分 95.XX02,考试时间 120 分钟)

A1/A2 题型

1. 关于肝血管瘤的描述, 哪项不对()
 - A. 女性发生率比男性略高
 - B. 终生缓慢生长
 - C. 多数血管瘤直径 $\geq 3\text{cm}$
 - D. 多发血管瘤发生率并不低
 - E. 血管瘤无恶变倾向
2. 胆囊癌 MRI 检查主要的表现为()
 - A. 淋巴结转移
 - B. 肿瘤侵犯肝脏
 - C. 胆囊壁增厚和肿块
 - D. 梗阻性胆道扩张
 - E. 合并胆结石
3. 胃癌化疗栓塞的特点是()
 - A. 易合并败血症
 - B. 坏死严重
 - C. 对胃组织损伤可修复
 - D. 出血多
 - E. 易引起脾梗死
4. 经动脉导管栓塞治疗上消化道出血最常见的并发症是()
 - A. 肺栓塞
 - B. 腹腔出血
 - C. 败血症
 - D. 门静脉血栓形成
 - E. 栓塞脏器组织缺血坏死
5. 男, 71 岁, 反复膀胱炎多年, B 超示双侧肾积水, 血肌酐及尿素氮都升高, 查体膀胱膨胀达脐下两指, 常见的原因是()
 - A. 肾功能不全
 - B. 前列腺增生
 - C. 双侧肾积水
 - D. 膀胱颈硬化症
 - E. 神经源性膀胱功能障碍
6. 肾动脉沿以下规律分布()
 - A. 肾动脉-肾段动脉-弓形动脉-叶间动脉

- B. 肾动脉-肾段动脉-叶间动脉-叶间动脉-弓形动脉
 C. 肾动脉-肾段动脉-弓形动脉-叶间动脉-叶间动脉
 D. 肾动脉-肾段动脉-叶间动脉-弓形动脉-小叶间动脉
 E. 肾动脉-肾段动脉-叶间动脉-叶间动脉-弓形动脉-叶间动脉
7. 肾自截的 X 线征象表现为()
 A. 肾盂呈虫蚀样破坏, 并累及几个肾盂
 B. 肾小盏扩大, 显影变淡
 C. 肾功能丧失, 静脉尿路造影不显像, 肾实质钙化
 D. 肾轮廓明显增大
 E. 以上均可
8. 下列肾脏病变, 哪种无"钙化"表现()
 A. 肾癌
 B. 肾结核
 C. 急性肾小球肾炎
 D. 肾错构瘤
 E. 慢性肾小球肾炎
9. 下列哪种病变, 不出现局部肾影增大表现()
 A. 肿瘤
 B. 囊肿
 C. 局限性肾积水
 D. 驼峰肾
 E. 肾梗死
10. 最常见的女性生殖系统结核是下列哪种()
 A. 子宫内膜结核
 B. 子宫颈结核
 C. 输卵管结核
 D. 卵巢结核
 E. 盆腔结核
11. 关于异位肾的表现, 下列说法错误的是()
 A. 肾脏位于盆腔内
 B. 肾脏位于髂窝内
 C. 立卧位肾脏位置不变
 D. 肾脏位于胸 12 与腰 3 之间
 E. 常伴输尿管过短或过长
12. 下列描述输尿管结核的影像学改变中, 哪项不正确()
 A. 迂曲、延长
 B. 钙化
 C. 僵直
 D. 短缩
 E. 串珠状
13. 膀胱腺癌与移行上皮癌鉴别诊断的主要方法为()
 A. B 超
 B. CT 增强
 C. MRI

- D. 膀胱造影
- E. 膀胱镜检查
14. 采用下列哪种方法有助于鉴别小的肾血管平滑肌脂肪瘤与小肾癌()
- A. 薄层连续扫描以发现脂肪成分
- B. 增强扫描观察肿瘤强化情况
- C. 螺旋 CT 扫描
- D. 冠状位重建
- E. 以上都不是
15. 下列哪项不是肾上腺腺瘤的 CT 表现()
- A. 密度均匀的一类圆形实性肿块
- B. 边缘光滑清晰与肾上腺相连
- C. 常可见条或斑片状钙化
- D. 常因含有脂类而呈低密度
- E. 增强扫描呈轻度强化
16. 肾门向肾内延续于一个较大的腔称为()
- A. 肾大盏
- B. 肾盂
- C. 肾蒂
- D. 肾门
- E. 肾窦
17. 下列关于肾盂癌的描述, 哪项说法错误()
- A. 平扫肾窦内不规则软组织密度肿物
- B. 肿物周围常有肾窦脂肪包绕
- C. 侵入肾实质, 局部呈低密度肿块
- D. 增强扫描常掩盖肾盂内肿物
- E. 需除外肾盂内阴性结石及凝血块
18. 女, 19 岁, 左下腹疼痛 1 个月。CT: 左下腹 111mm×120mm 椭圆形囊性团块, 边缘光滑, 包膜完整, 密度均匀 CT 值 26HU, 无强化, 病变推移子宫、肠管。最先考虑为()
- A. 卵巢囊肿
- B. 卵巢囊腺瘤
- C. 卵巢畸胎瘤
- D. 卵巢皮样囊肿
- E. 卵巢脓肿
19. 转移性肝癌 MRI 检查最具特征性的征象是()
- A. 不定型征
- B. 水上浮莲征
- C. 灯泡征
- D. 包膜征
- E. 牛眼征
20. 下列哪项是慢性胰腺炎最具特征性的征象()
- A. 胰腺腺体萎缩变小
- B. 胰腺肿大, 局限或弥漫性
- C. 胰腺和胰管钙化
- D. 胰管扩张, 呈不规则串珠状

E. 胰腺假囊肿

21. 关于 HCC 的介入治疗方式, 下述错误的是()

A. TAI

B. 化疗泵留置化疗

C. TAE

D. PTA

E. 硬化剂治疗

22. 应用球囊扩张术治疗贲门失弛症时选用球囊的直径是()

A. 2cm

B. 2.5cm

C. 3~4cm

D. 4cm 以上

E. 以上均可

23. 下述为节育器在盆腔正位投照时的正常形态, 但除外()

A. 扁圆形

B. 长圆形

C. 圆形

D. 纵"一"字形

E. 横"一"字形

24. 患者中年男性, 无痛性全程血尿半月余, IVP 示同侧肾盂、输尿管及膀胱均见充盈缺损。可能性最大的诊断是()

A. 肾癌+种植转移

B. 转移癌

C. 腺瘤

D. 肾结核

E. 移行细胞癌

25. 尿路结石最常用的检查方法是()

A. B 超检查

B. 腹部平片检查

C. 腹部 CT 检查

D. 静脉尿路造影检查

E. 逆行尿路造影检查

26. 下述"腺性膀胱炎"特点, 不正确的是()

A. 女性多见

B. 尿常规、活检提示有细菌感染

C. 影像表现有时与膀胱癌鉴别困难

D. 部分病例可恶变

E. 可能与炎症慢性刺激有关

27. 腹部平片对下述哪种病变价值最低()

A. 尿路结石

B. 肾结核

C. 膀胱癌

D. 了解节育环位置

E. 肾萎缩

28. 静脉肾盂造影见输尿管膀胱开口处有一圆形充盈缺损，轮廓光滑，呈"蛇头状"或"光晕"征，常见于下列哪种病变()
- A. 膀胱憩室
 - B. 输尿管下段结石
 - C. 膀胱癌
 - D. 膀胱结石
 - E. 输尿管囊肿
29. 子宫输卵管造影的适应证包括下列哪项()
- A. 不孕症
 - B. 生殖道畸形
 - C. 子宫不正常出血
 - D. 观察各种绝育措施后输卵管的情况
 - E. 以上全是
30. 有关正常成人肾脏，描述正确的是()
- A. 左肾体积较右肾略大，右肾位置较左肾低
 - B. 左肾体积较右肾略大，右肾位置较左肾高
 - C. 右肾体积较左肾略大，右肾位置较左肾高
 - D. 右肾体积较左肾略大，右肾位置较左肾低
 - E. 右肾体积与左肾等大，右肾位置较左肾高
31. 下列关于肾上腺皮质腺瘤的临床表现哪项正确()
- A. 阵发性血压升高
 - B. 库欣(Cushing)综合征
 - C. 多囊卵巢
 - D. 停经泌乳
 - E. 肢端肥大
32. 关于肾上腺外嗜铬细胞瘤，不是常见发生部位的是()
- A. 脊柱旁两侧
 - B. 后腹膜附近
 - C. 胰腺内
 - D. 下腔静脉前方
 - E. 膀胱
33. 膀胱癌的 CT 检查，无法显示()
- A. 突入膀胱内的肿瘤
 - B. 输尿管开口肿瘤阻塞
 - C. 膀胱壁局部浸润增厚
 - D. 肿瘤侵入黏膜或黏膜下层的深度
 - E. 精囊、前列腺和盆腔内邻近组织受侵
34. 下列哪种病变或组织的增强 CT 扫描无强化()
- A. 动静脉畸形
 - B. 炎症
 - C. 囊变
 - D. 肿瘤
 - E. 正常软组织
35. 肾血管平滑肌脂肪瘤与肾癌的鉴别诊断要点应该根据()

- A. 瘤内有无脂肪
 - B. 肿瘤大小
 - C. 肿瘤密度均匀
 - D. 肿瘤境界
 - E. 肿瘤有无强化
36. 移植肾常位于()
- A. 原肾位置
 - B. 右髂窝
 - C. 原肾上方
 - D. 原肾下方
 - E. 左髂窝
37. 典型肝脏血管瘤的 MRI 表现是()
- A. 灯泡征
 - B. 靶征
 - C. 牛眼征
 - D. 爆米花状染色
 - E. 胡椒盐征
38. 不属于 PTCD 术的方法的是()
- A. 固定引流管
 - B. 胆管造影
 - C. 经皮肝穿
 - D. 放置引流管
 - E. 脾动脉造影
39. 肝癌患者行介入栓塞化疗术最常用栓塞剂是()
- A. NBCA 胶
 - B. 38%碘化油
 - C. 40%碘苯酯
 - D. 60%泛影葡胺
 - E. 40%Gd-DTPA
40. 有关膀胱癌和结石的鉴别, 下列错误的是()
- A. 双重对比造影两者等同
 - B. 癌与结石均不随体位改变而移动
 - C. 膀胱癌浸润膀胱壁, 使膀胱壁不光整和硬化
 - D. 膀胱癌的充盈缺损边缘不光整, 而结石则光滑
 - E. X 线平片易于诊断结石
41. 在立位透视时, 节育环正常位置通常在()
- A. 与耻骨联合重叠
 - B. 耻骨联合上 2~5cm
 - C. 耻骨联合上 5~8cm
 - D. 耻骨联合上 8cm 以上
 - E. 耻骨联合下 2~5cm
42. X 线平片上, 肾结石可以表现为()
- A. 圆形
 - B. 卵圆形

- C. 桑椹形
 - D. 鹿角形
 - E. 以上都可
43. IVP 示肾盏破坏, 则可排除下列哪项()
- A. 肾结核
 - B. 肾盂旁囊肿
 - C. 肾盂肿瘤
 - D. 肾乳头坏死
 - E. 肾腺癌
44. 输尿管结核患者, 静脉肾盂造影的典型表现为()
- A. 输尿管不规则狭窄和扩大, 呈串珠状, 边缘呈虫蚀状
 - B. 输尿管囊样扩张
 - C. 输尿管内见圆形致密影
 - D. 输尿管扭曲
 - E. 输尿管内见不规则透光影
45. 鹿角状结石多发生在()
- A. 肾盂及肾盏内
 - B. 膀胱
 - C. 输尿管
 - D. 肾盂
 - E. 肾盏
46. 肾盂积水的影像改变, 最早出现在()
- A. 肾盂
 - B. 肾柱
 - C. 肾小盏穹隆部
 - D. 肾小盏杯口
 - E. 肾大盏
47. 关于膀胱癌的 CT 表现, 错误的是()
- A. 突入膀胱腔内的结节肿物
 - B. 肿瘤可以是单发, 也可是多发
 - C. 肿瘤可以是带蒂生长
 - D. 肿瘤累及黏膜下层和肌层表现为膀胱壁增厚
 - E. 可区分肿瘤限于黏膜内或侵入黏膜下层
48. 肾动脉的分支栓塞后, 立即出现的反应是()
- A. 从毛细血管建立侧支循环
 - B. 从输尿管动脉建立侧支循环
 - C. 从肾上腺内动脉建立侧支循环
 - D. 相应供血区肾梗死
 - E. 相应供血区肾萎缩
49. 鉴别肾盂旁囊肿和肾盂积水扩张, 应采用下列哪种方法()
- A. 薄层扫描
 - B. 增强扫描
 - C. 冠状图像重建
 - D. 平扫并测 CT 值

E. 以上都不是

50. CT 诊断肾血管平滑肌脂肪瘤的关键是()

- A. 肿瘤境界清楚
- B. 合并结节硬化
- C. 肿瘤血管组织增强
- D. 瘤内容易出血
- E. 瘤内有脂肪成分

51. 不属于 CT 特殊功能的是()

- A. 定位扫描
- B. 动态扫描
- C. 靶扫描
- D. 轴位扫描
- E. 特殊重建扫描

52. 男, 64 岁, 血尿待查, CT: 双肾明显增大, 正常轮廓消失, 边缘呈分叶状, 结节状, 全肾无数大小不一, 低密度囊性结节影, 无强化, 肾皮质菲薄, 残存的肾实质强化尚可。最可能的诊断为()

- A. 双肾结核
- B. 双肾癌
- C. 双侧多囊肾
- D. 海绵肾
- E. 肾多发脓肿

53. 关于肾梗死的 CT 表现, 错误的是()

- A. 包膜下高密度影
- B. 梗死区的实质及包膜均无增强
- C. 包膜下低密度影
- D. 增强可见皮质边缘征
- E. 增强扫描病变区与正常区分界清楚

54. 胰腺癌的好发部位是()

- A. 胰头、颈部
- B. 胰头、尾部
- C. 胰体、尾部
- D. 胰颈、尾部
- E. 胰体部

55. 划分左、右肝叶的解剖标志是()

- A. 肝动脉
- B. 门静脉
- C. 肝中静脉
- D. 肝左静脉
- E. 肝右静脉

56. 关于食管内支架置入术的适应证, 下述正确的是()

- A. 食管癌狭窄
- B. 食管结核
- C. 完全梗阻
- D. 弥漫性狭窄

- E. 食管平滑肌瘤
57. 关于消化道出血灌注并发症，正确的是()
- A. 急性外伤出血
 - B. 心绞痛
 - C. 食管破裂
 - D. 消化道出血
 - E. 以上都不是
58. 经动脉导管化疗药物灌注术治疗胰腺癌，能明显缓解疼痛，改善生活质量的药物是()
- A. 丝裂霉素
 - B. 5-氟尿嘧啶
 - C. 阿霉素
 - D. 羟基喜树碱
 - E. 健择
59. 无法发现透光性结石的检查方法为()
- A. B超
 - B. CT
 - C. 腹部平片
 - D. IVP
 - E. MRI
60. 影像学表现为"双侧肾影增大"，则可除外()
- A. 急性肾小球肾炎
 - B. 油灰肾，即结核性肾自截
 - C. 双侧重复肾
 - D. 双侧肾盂积水
 - E. 多囊肾
61. 在下列病变中，对"输尿管移位"特点描述，错误的是()
- A. 肾上极肿瘤：输尿管可不移位
 - B. 腹膜后纤维化：输尿管中段向内移位
 - C. 恶性淋巴瘤：输尿管中段向外移位
 - D. 子宫肌瘤：输尿管下段向外移位
 - E. 肾旋转不良：输尿管上段向内移位
62. 下述病变，哪项不引起肾脏位置的异常改变()
- A. 马蹄肾
 - B. 肾上腺肿瘤
 - C. 肾实质内肿瘤
 - D. 肾结核
 - E. 异位肾
63. 正常情况下，子宫腔和输卵管内对比剂应在多少时间内排空()
- A. 12h
 - B. 24h
 - C. 36h
 - D. 48h
 - E. 48h~60h
64. 单侧肾影增大，则可除外下列哪项()

- A. 重复肾
 - B. 肾囊肿
 - C. 肾肿瘤
 - D. 多囊肾
 - E. 肾盂积水
65. 肾内的"蛋壳样钙化", 常见于下列哪种疾病()
- A. 甲状旁腺功能亢进
 - B. 肾囊肿
 - C. 慢性肾小球肾炎
 - D. 急性肾小球肾炎
 - E. 高尿钙症
66. 在慢性输尿管阻塞时输尿管表现为()
- A. 蠕动增强
 - B. 正常蠕动
 - C. 蠕动减弱
 - D. 肿块形波纹
 - E. 蠕动增强与弛缓交替出现
67. 肾结核的静脉肾盂造影最早出现的肾盂改变是()
- A. 肾皮质结核球
 - B. 肾柱钙化
 - C. 肾盂狭窄
 - D. 肾乳头及肾小盏破坏
 - E. 肾盂积水
68. 下列关于肾筋膜和肾间隙的正确描述是()
- A. 肾脏前缘和吉氏筋膜前层之间为肾前间隙
 - B. 两侧肾周间隙之间没有交通
 - C. 左右肾后间隙之间相通
 - D. 肾筋膜外为液体
 - E. 肾上腺、肾血管位于肾周间隙
69. 下列哪种情况可见肾囊肿 CT 值升高()
- A. 肾囊肿合并肾结石和肾盂积水
 - B. 肾囊肿合并肾盂肾炎
 - C. 囊肿内出血和囊液蛋白含量增高
 - D. 注射对比剂后作增强扫描
 - E. 以上都不是
70. 下列哪种方法可以减少影像的部分容积效应()
- A. 提高扫描条件(kV 值, mA 值)
 - B. 缩短扫描时间
 - C. 减小扫描层厚
 - D. 改变重建方法
 - E. 选择适当的窗宽窗位
71. 下列不属于先天性畸形的是()
- A. 单肾
 - B. 马蹄肾

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/345131324134011102>