

超声波医学与技术(主管技师)《综合考试题》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题:胰腺癌与慢性胰腺炎的超声鉴别诊断,下列不正确的是()。

A. 胰腺癌多局限性肿大

B. 肿瘤后方回声多衰减

C. 胰腺癌胰管多呈不均匀串珠样轻度增宽

D. 慢性胰腺炎体积多轻度肿大或萎缩

E. 胰腺癌可伴淋巴结肿大及腹水

2、单项选择题:眼疾病可以用超声诊断的有:①视网膜、脉络膜脱离;②眼内出血、异物;③眼内和眶内肿瘤;④眼肌异常()。A. ①②③

B. ①③

C. ②④

D. ①②④

E. ①②③④

3、单项选择题:多普勒频移与下面哪项无关()。A. 探头发射的频率

B. 输出功率

C. 声速

D. 红细胞的流速

E. 多普勒角度

4、单项选择题:患者,女,26岁,停经一个半月,有时恶心,呕吐。经腹盆腔超声检查发现:子宫纵断时腔内发现一个妊娠囊,横断时发现双孕囊。最可能是以下哪种伪像所致()。A. 镜面伪像

B. 侧边折射声影伪像

C. 声速失真伪像

D. 棱镜伪像

E. 主声束以外旁瓣伪像

5、单项选择题:进行心肌造影对造影剂的要求是()。A. 微气泡直径小于8微米

B. 微气泡要有厚的包裹膜

C. 微气泡的压缩系数要小

D. 微气泡密度要高

E. 微气泡直径要大(大于红细胞)

6、单项选择题:颈内动脉与颈外动脉分叉处,在解剖学上称为()。A. 冠状窦

B. 矢状动脉窦

C. 颈动脉窦

- D. 主动脉窦
 - E. 海绵状窦
- 7、单项选择题：肾囊肿的超声鉴别诊断，下列错误的是（ ）。A. 多囊肾与多发性肾囊肿的鉴别
- B. 肾肿瘤与出血性肾囊肿的鉴别
 - C. 肾积水与肾盂旁囊肿的鉴别
 - D. 肾髓质囊肿与肾乳头坏死的鉴别
 - E. 多发肾囊肿与重度肾积水的鉴别
- 8、单项选择题：皮下脂肪组织常呈（ ）。A. 强回声
- B. 高回声
 - C. 等回声
 - D. 低回声
 - E. 无回声
- 9、单项选择题：人体组织与体液中，下列哪种最能使声衰减程度加重（ ）。A. 胆汁
- B. 血液
 - C. 脂肪
 - D. 胶原纤维
 - E. 钙质
- 10、单项选择题：组织多普勒超声显像不能够以下列方式显示的是（ ）。A. 解剖 M 型
- B. 二维成像
 - C. 三维成像
 - D. 连续波频谱多普勒
 - E. 脉冲波频谱多普勒
- 11、单项选择题：超声仪的组织定征技术的作用是（ ）。A. 可对细胞学进行分析
- B. 分析组织结构的声学特征的改变
 - C. 无任何价值
 - D. 虽影响因素较多，但结果非常准确
 - E. 可代替心导管检查方法
- 12、单项选择题：关于心包积液，下列不正确的是（ ）。A. 心包积液时心包腔可向内侧、外侧及心尖方向扩大
- B. 心包积液时心底部上方及心房后方很少发生液体积聚
 - C. 壁层和脏层心包分离的宽度与积液量相关
 - D. M 型超声心动图评价心包积液优于二维超声心动图
 - E. 心包积液时心包膜被分开，形成两条回声带，中间出现异常的无回声区
- 13、单项选择题：关于子宫畸形的描述，下列正确的是（ ）。A. 始基子宫的宫腔线回声清晰
- B. 双子宫分为单颈子宫及双颈子宫
 - C. 单角子宫，双侧附件均正常
 - D. 纵隔子宫的宫底外形有显著改变
 - E. 子宫畸形不合并阴道畸形
- 14、单项选择题：怎样消除彩色多普勒技术的彩色信号闪烁（ ）。A. 屏住呼吸
- B. 用低的滤波
 - C. 用大的取样框
 - D. 低的速度标尺

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/346151220131010133>