

护理中级试题

一、A1/A2 型题

1. 不属于中度危险性物品的是
A. 体温表 B. 呼吸机管道 C. 透吸器 D. 麻醉机管道 E. 气管镜
2. 医院感染爆发流行时，以下哪项措施不正确
A. 先将发病患者转移到安全区
B. 分组护理
C. 进行流行病学调查
D. 先将未发病患者转移到安全区
E. 单元隔离
3. 抗菌药物是治疗感染的主要药物，所以
A. 对一切感染症都应尽早使用高效广谱抗菌药物
B. 在治疗感染性疾病时，考虑使用抗菌药物同时要考虑病原体对抗菌药物的敏感性
C. 抗菌药物可用作消毒剂，对皮肤伤口消毒
D. 有了各种抗菌药物，预防医院感染就不成问题了
E. 发烧病人都是感染，均可用抗菌药物治疗
4. 可确诊糖尿病的有关检查指标是
A. 空腹血糖 $\geq 7.8\text{mmol/l}$ 和/或餐后 2 小时血糖 $\geq 11.1\text{mmol/l}$ 水平
B. 糖耐量试验 2 小时 $\geq 7.8\text{mmol/l}$
C. 空腹血糖 $> 5.6\text{mmol/l}$
D. 随机血糖 $\geq 7.8\text{mmol/l}$
E. 口服葡萄糖后 1 小时血糖 $\geq 7.8\text{mmol/l}$
5. 胸部触觉语颤增强见于哪种疾病
A. 肺气肿
B. 肺心病
C. 胸腔积液
D. 慢性支气管炎
E. 大叶性肺炎
6. 下列哪一项检查可直接观察溃疡的部位、病变大小
A. X 线钡餐检查
B. 超声检查
C. 幽门杆菌感染的检测
D. 胃镜检查
E. 胃液检查
7. 甲胎蛋白阳性对下列哪种疾病最有诊断价值
A. 原发性肝癌
B. 急性肝坏死

- C. 肝血吸虫
- D. 肝转移癌
- E. 肝硬化

8. 急性心肌梗塞临床上最常见的心电图改变是

- A. ST 段弓背向上抬高
- B. 异常高大两支不对称的 T 波
- C. ST 段压低
- D. 高大的 R 波

9. 创伤性休克的紧急扩容措施首选液是

- A. 葡萄糖液 B. 全血 C. 血浆 D. 平衡液 E. 右旋糖苷

10. 下列哪种抗生素联合使用会导致抗生素毒性增加

- A. 庆大霉素+卡那霉素 B. 庆大霉素+红霉素
- C. 青霉素+先锋霉素 D. 青霉素+红霉素 E. 红霉素+磺胺类

11. 病人告诉护士他怕在术中死亡，此时护士如何做最恰当

- A. 坐在病人旁边了解他的感受并给予解释
- B. 告诉他毫无必要恐惧，鼓励患者进行日常活动以建立信心
- C. 向或者保证将他的问题记在病历里，这样医生可能和他讨论这个问题
- D. 给他服药使他休息，解除恐惧 E. 立刻通知医生来解决问题

12. 血钠过高时，中枢神经的主要表现是

- A. 口渴软弱谵妄昏迷 B. 呆滞腱反射减弱昏迷
- C. 兴奋腱反射亢奋 D. 头晕视力减弱抽筋

E. 淡漠反应迟缓嗜睡 13 服用洋地黄的患儿以下不是中毒表现的为

- A. 心动过缓 B. 恶心呕吐 C. 激惹惊厥 D. 心律失常 E. 头晕嗜睡

14. 急性肾小球肾炎患儿当出现严重循环充血时首选的治疗药物是

- A. 强心药 B. 降压药 C. 抗感染药 D. 利尿药 E. 扩张血管药

15. 下列哪项为等渗溶液

- A. 1.4%碳酸氢钠 B. 3%氯化钠 C. 5%氯化钾 D. 11.2%乳酸钠 E. 10%葡萄

二. B 型题

- A. 过氧乙酸 B. 甲醛 C. 碘酊 D. 新洁尔灭 E. 乙醇

1. 可用于深部伤口冲洗的化学消毒剂是

2. 需加防锈剂的化学消毒剂是

3. 对呼吸道和眼睛有刺激性的化学消毒剂是

A. 稽留热型

B. 回归热型

C. 波状热型

D. 弛张热型

E. 不规则热型

4. 败血症热型常是

5. 肺炎球菌性肺炎热型常是

A. 无盐低钠饮食

B. 低脂饮食

C. 低蛋白饮食

D. 高蛋白饮食

- E. 高热量饮食
- 6. 肝硬化严重腹水病人应给予
- 7. 尿毒症的病人应给予

费试题 10

一、A1/A2 型题

1. 新生儿可从母体获得，但 3~5 个月后逐渐消失的抗体是
A. 免疫细胞 B. 补体 C. IgG D. IgM E. IgA
2. 为增加血浆渗透压，应选用
A. 5%葡萄糖液 B. 0.9%氯化钠溶液 C. 低分子右糖酐
D. 10%葡萄糖溶液 E. 5%碳酸氢钠
3. 引起小儿秋季腹泻常见的病原体是
A. 空肠弯曲菌 B. 大肠杆菌 C. 链球菌 D. 轮状病毒 E. 流感嗜血杆菌
4. 乳癌病变发展过程中最易受染的是
A. 肺 B. 肝 C. 腋窝淋巴结 D. 锁骨下淋巴结 E. 胸骨旁淋巴结
5. 婴儿每昼夜排尿量为
A. 200~300ml B. 400~500ml C. 600~700ml D. 800~900ml
E. 1000~1100ml
6. 气胸病人患侧肺部叩诊音为
A. 清音 B. 浊音 C. 鼓音 D. 实音 E. 过清音
7. 新生儿生理性黄疸出现于生后
A. 1 天 B. 2~3 天 C. 4~6 天 D. 7~8 天 E. 9~10 天
8. 皮肤异常干燥见于
A. 虚脱 B. 休克 C. 甲亢 D. 风湿热 E. 脱水
9. 男性，58 岁，拟行左结肠癌根治术，术前需几日开始服用肠道消炎药
A. 1 日 B. 2 日
C. 3 日
D. 4 日
E. 5 日
10. 高血压发病机理中占主导地位的是
A. 血容量过多
B. 内分泌因素
C. 肾功能异常
D. 高级神经中枢功能失调
E. 血管内皮功能异常
11. 应首先抢救的伤员是
A. 脑挫伤
B. 肠胃炎
C. 小腿挫裂伤
D. 张力性气胸
E. 上肢开放性骨折

12. 正常人每日无形失水量为

- A. 200ml
- B. 850ml
- C. 400ml
- D. 1000ml
- E. 1200ml

13. 舟状腹常见于

- A. 肝硬化
- B. 低血糖
- C. 恶液质
- D. 腹膜炎
- E. 胃扩张

14. 某病人食用带皮的水果半小时后出现恶心、呕吐、腹痛等中毒症状。下列何种农药引起中毒的可能性最小

- A. 敌敌畏
- B. 内吸磷
- C. 对硫磷
- D. 乐果
- E. 甲拌磷

15. 腰麻后头痛的主要原因是

- A. 术中血压下降
- B. 脑脊液外漏
- C. 颅内压增高
- D. 迷走神经亢进
- E. 精神因素

16. 颅脑手术后健侧卧位，是为了

- A. 防止呕吐
- B. 防止脑疝
- C. 防止伤口感染
- D. 缓解疼痛
- E. 便于观察

17. 护士巡视发现某咯血病人出现表情恐怖，张口瞪目，两手乱抓等窒息现象，首先应该

- A. 准备抢救用品
- B. 行人工呼吸
- C. 使用呼吸中枢兴奋剂
- D. 使用镇咳药
- E. 立即置病人头低足高位

二、B型题

- A. 产后 3 天内分泌的乳汁
- B. 产后 5 天内分泌的乳汁
- C. 产后 7 天内分泌的乳汁
- D. 产后 7~14 天分泌的乳汁
- E. 产后 14 天以后分泌的乳汁

- 1. 初乳是
- 2. 过渡乳是
- 3. 成熟乳是

- A. 流行性乙型脑炎
 - B. 脊髓灰质炎
 - C. 中毒性痢疾
 - D. 乙型肝炎
 - E. 腮腺炎
- 4. 由飞沫呼吸道传播的是
 - 5. 由虫媒传播的是

三、A3/A4 型题

男性，35 岁，患腹外疝一年，站立或咳嗽时右侧腹股沟区出现疝块，可进入阴囊，平卧或用手推送，疝块可回纳腹腔而消失。

- 1. 其疝环是

- A. 股环
- B. 卵圆窝
- C. 腹股沟管浅环
- D. 腹股沟管深环
- E. 腹股沟三角

- 2. 回纳疝块时，可闻及肠鸣音，疝内容物最可能的是

- A. 乙状结肠
- B. 小肠
- C. 膀胱
- D. 大网膜
- E. 直肠

3. 若病人用力排便时，疝块突然增大不能回纳，伴有局部疼痛和压痛，此时疝的临床类型属于

- A. 易复性疝
- B. 难复性疝
- C. 嵌顿性疝
- D. 滑动性疝
- E. 绞窄性疝

赵先生，50 岁，因肝硬化食道静脉曲张、腹水入院治疗。放腹水后出现精神错乱、昏睡，伴有扑翼样震颤、脑电图异常等肝昏迷表现。

- 4. 此时病人可能处于肝昏迷的哪一期

- A. 前驱期

- B. 昏迷前期
 - C. 昏睡期
 - D. 浅昏迷期
 - E. 深昏迷期
5. 目前给病人安排哪种饮食为宜
- A. 给予低蛋白饮食
 - B. 保证总热量和糖类摄入
 - C. 补充大量维生素 A
 - D. 给予富含粗纤维饮食
 - E. 限制含钾食物的摄入

内科学免费习题集

1. 在支气管哮喘与心源性哮喘鉴别困难时应选 ()

- A. 吗啡
- B. 氨茶碱
- C. 肾上腺素
- D. 速尿
- E. 毒毛花苷 K 或毛花苷 C

支气管哮喘简称哮喘，是一种肥大细胞、嗜酸粒细胞、淋巴细胞等多种炎症细胞介导的气道慢性变态反应性炎症性疾病。本病常存在气道高反应性和广泛的、可逆性气流阻塞。临床以反复发作的喘息、呼气性呼吸困难、胸闷或咳嗽为特征，常在夜间和/或清晨发作。

心源性哮喘是指由于左心衰竭引起肺血管外液体量过度增多甚至渗入肺泡而产生的哮喘。临床表现为呼吸困难、紫绀、咳嗽、咳白色或粉红色泡沫痰，与支气管哮喘症状相似。但心源性哮喘多有高血压、冠状动脉粥样硬化性心脏病、风心病二尖瓣狭窄等病史和体征，两肺不仅可闻及哮鸣音，尚可闻及广泛的水泡音；左心界扩大，心率增快，心尖部可闻及奔马律；影像学表现为以肺门为中心的蝶状或片状模糊阴影。鉴别困难者，可先静脉注射氨茶碱或雾化吸入 β 受体激动剂，待症状缓解后再做进一步的检查。注意，此时忌用肾上腺素和吗啡，以免抑制呼吸，造成生命危险。

2. 高血压合并肾功能不全时宜选用的降压药是 ()

- A. 美托洛尔
- B. 卡托普利
- C. 氨酰心安
- D. 心得安
- E. 胍乙啶

答案：B

解析：

- ①合并有心力衰竭者宜选用利尿剂、ACEI 受体阻滞剂，不宜选用 β 受体阻滞剂。
- ②轻、中度肾功能不全用 ACEI。
- ③老年人收缩压高者宜选用利尿剂、长效双氢吡啶类 (CCB)。
- ④糖尿病用 CCB、ACEI 受体阻滞剂。
- ⑤冠心病心梗后患者，可用 β 受体阻滞剂，ACEI、CCB。
- ⑥伴高脂血症者用 CCB、ACEI 受体阻滞剂，不宜用利尿剂。
- ⑦脑血管动脉粥样硬化可用 ACEI、CCB。

3. 肝硬化时肝功能减退，雌激素增多，出现 ()

A. 出血倾向 B. 黄疸 C. 腹水 D. 蜘蛛痣、肝掌 E. 肝臭

答案：D

解析：

由于雌性激素和雄性激素之间的平衡失调，男性患者常有性欲减退、睾丸萎缩、毛发脱落及乳房发育等；女性患者有月经不调、闭经、不孕等。此外有些患者可在面部、颈、上胸、背部、两肩及上肢等有腔静脉引流区域出现蜘蛛痣和/或毛细血管扩张；在手掌大、小鱼际肌和指端部发红，称肝掌。一般认为蜘蛛痣及肝掌的出现与雌激素增多有关，还有一些未被肝脏灭能的血管舒张活性物质也有一定作用。当肝功能损害严重时，蜘蛛痣的数目可增多增大，肝功能好转则可减少、缩小或消失。

4. 门静脉高压，出现()

- A. 出血倾向
- B. 黄疸
- C. 腹水
- D. 蜘蛛痣、肝掌
- E. 肝臭

答案：C

解析：

(1) 脾脏肿大 脾脏呈充血性肿大，多为轻、中度肿大，部分可达脐下。上消化道大出血时，脾可短暂缩小。晚期常继发脾功能亢进，白细胞、血小板和红细胞计数减少。脾周围炎、脾梗死时可有左上腹疼痛。

(2) 侧支循环建立和开放 门静脉压力增高，超过 14.6mmHg 时，消化器官和脾脏回心血液流经肝脏受阻，为了减少淤滞在门静脉系统的血液回流，门静脉与体静脉间的交通支大量开放并扩张为曲张的静脉，建立门体侧支循环。主要有：①食管和胃底部静脉曲张；②腹壁和脐周静脉曲张；③痔静脉曲张及腹膜后组织间隙静脉曲张。其中食管和胃底静脉曲张，常因食物的摩擦，门静脉压力显著增高，引起破裂大出血。

(3) 腹水 是肝硬化失代偿期最突出的体征之一。腹水一般发展缓慢，出现腹水前常有腹胀、上消化道大出血、感染等原因，则可促使腹水迅速增长。中等以上腹水常伴下肢浮肿。大量腹水使腹部膨隆，状如蛙腹，有时抬高横膈引起呼吸困难，出现端坐呼吸和脐疝。腹水形成的最基本始动因素是门静脉高压和肝功能减退，与门静脉压力增高、低白蛋白血症、肝淋巴液生成过多有关。继发性醛固酮增多、抗利尿激素增多与有效循环血容量不足致肾小球滤过率降低，导致钠、水潴留，亦是腹水形成和加重的重要原因。部分患者同时伴有胸水，多见于右侧，系腹水通过横膈淋巴管或经膈肌缺损处进入胸腔所致。

5. 急性白血病高热是因为()

- A. 代谢亢进
- B. 化疗反应
- C. 白血病细胞浸润
- D. 广泛出血
- E. 合并感染

答案：E

解析：

急性白血病的临床表现是因正常血细胞减少和白血病细胞浸润各组织、器官所引起。各型急性白血病的临床表现大致相同。

①起病 起病急缓不一。急者可以是突然高热，类似“感冒”，也可以是严重的出血倾向，甚至全身衰竭。缓慢者常为脸色苍白、疲乏或轻微出血。有的病人因皮肤紫癜、月经过多或拔牙后出血难止而就医才发现。

②发热和感染 约半数以上的患者以发热起病，当体温 $>38.5^{\circ}\text{C}$ 时常常是由感染引起。感染是AL最常见的死亡原因之一。

③出血 以出血为早期表现者近40%。出血可发生在全身各部。以皮肤瘀点、瘀斑、鼻出血、牙龈出血、月经过多、阴道流血为多见。眼底出血可致视力障碍。急性早幼粒白血病易并发弥散性血管内凝血(DIC)而出现全身广泛性出血。颅内出血时有头痛、呕吐、瞳孔不对称，甚至昏迷而死亡。

④贫血 往往是首起表现，呈进行性发展。半数病人就诊时已有重度贫血。贫血的原因主要是由于正常红细胞生成减少。此外，与无效性红细胞生成、溶血及失血等因素也有关系。

⑤各组织和器官浸润的表现，如淋巴结和肝脏肿大等。

医学伦理学免费专题

一、不属于预防医学的道德要求的是

- A. 爱岗敬业，宣传大卫生观，言传身教
- B. 改善工作和学习环境，严把防疫与食品卫生观
- C. 严格监管，控制污染，保护生态环境，促进社会文明，科学严谨，实事求是，

信息透明公开

- D. 防疫工作者有权在疫区切断传染病传播途径的各种措施
- E. 提高社区服务水平，保障妇女儿童和老年人权益

答案及解析：D

医学道德的基本原则，要求医务人员关心和爱护患者的健康，尊重患者的生命价值、人格和权利，平等待人，维护患者的利益和幸福等，并且正确处理人道与功利的关系；全心全意为人民的健康服务，要求医务人员将其作为追求的理想和目标，使医学道德不断升华。同时，医务人员要顾全大局、识大体，讲利人、奉献和牺牲精神，把维护病人、集体、社会的利益放在首位，当前还要把全心全意为人民健康服务的原则与“端正服务思想，增强服务意识，改善服务态度，提高服务质量”结合起来。

D. 防疫工作者有权在疫区切断传染病传播途径的各种措施属于 传染病的预防工作

二、对三种医德评价方式相互关系的正确理解是

- A. 相辅相成、互相补充
- B. 完全一致、可以替代
- C. 互相冲突、都不可信
- D. 比较混乱、说不清楚
- E. 以上都不是

答案及解析：A

医德评价最一般的方式为社会舆论、内心信念和传统习俗这三种无形而深刻的伦理力量。在进行医德评价时，上述的三种评价方式相辅相成、互相补充，起到了全方位、多角度地评判、裁决医务人员行为和活动的作用。同时，上述的三种评价方式也是紧密联系、

互相影响的，即医务人员内心信念的形成离不开社会舆论和传统习俗，而社会舆论和传统习俗在医德评价中作用的发挥也必须通过医务人员的内心信念来实现。

三、基层工作者的行为规范不包括

A. 尊重病人人格，开展人性化服务和连续性服务

B. 言传身教，以身作则，作好宣教工作，落实各项公共卫生措施；做到分工协作，认真履行自己职责

C. 勤俭节约卫生资源

D. 树立新的卫生管理道德理念，完善为基层群众服务的三级医疗预防体系

E. 把维护所有人群的健康权益放在首位道德观

答案及解析：E

基层卫生保健人员是实现政府道德责任与公众健康利益的桥梁，其行为不仅要遵循临床医疗和预防医学工作者的道德准则，还要根据其特殊的工作职责从以下方面进行规范：

1. 尊重病人人格，开展人性化服务。

2. 不辞辛苦，为病人提供连续性服务。

3. 言传身教，科学地做好卫生宣教工作。

4. 以身作则，认真落实各项公共卫生措施。

5. 分工协作，认真履行自己的职责。

6. 勤俭节约，不浪费卫生资源。

7. 树立新的卫生管理道德理念，完善为基层群众服务的三级医疗预防体系。

8. 把维护基层人群的健康权益放在首位的道德观。

四、以下不是预防医学工作的主要特点的是

A. 价值导向的超前性，服务对象的整体性，研究方法的独特性

B. 工作效率的紧迫性、时效性，工作过程的长期性和艰巨性

C. 工作效果评价的滞后性、效益影响的深远性

D. 社会效益、经济效益的可观性

E. 以上均不是

答案及解析：D

预防医学工作有如下的特点：

1. 价值导向的超前性。 2. 服务对象和研究对象的整体性。

3. 研究方法的独特性。 4. 工作范围的全球性和广泛性。

5. 工作效率的紧迫性和时效性。 6. 工作过程的长期性和艰巨性。

7. 工作效果评价的滞后性和效益影响的深远性。

【外科护理学】

某男，

45岁，慢性肾衰竭多年，近期已行肾移植，在观察急性排斥反应时，要注意该类排斥反应多发生在移植后

A. 1~2个月

B. 3~4周

C. 1~2周

D. 2~3d

E. 24h内

【答案及解析】本题选 C

分类

(1) 急性排斥反应：移植后 1~2 周内即可出现。表现为发热，局部出现炎性反应，如肿胀、疼痛、白细胞增多、小血管栓塞、移植的器官功能减弱或丧失等。

(2) 超急性排斥反应：在移植手术后 24 小时内或更短时间内发生，如误输异型血液，可在数分钟内即可发生溶血反应。这是因为体内早已具有对该种抗原的抗体，故一旦移植，反应很快发生。

(3) 慢性排斥反应：在移植后数年内，移植器官的功能逐渐减退，最后功能完全丧失，增加免疫抑制剂也难奏效。

【外科护理学】急性阑尾炎，当腹痛尚未转移到右下腹前，在诊断上具有重要意义的是

- A. 已出现发热
- B. 已有血白细胞显著升高
- C. 脐区压痛及反跳痛
- D. 脐区及右下腹均有压痛，反跳痛
- E. 压痛已固定在右下腹

【答案及解析】E

1. 症状 典型的症状是转移性右下腹疼痛，少数病例开始即出现右下腹疼痛，伴有胃肠功能紊乱症状。阑尾穿孔后可出现腹膜炎和麻痹性肠梗阻症状。盆腔位阑尾炎或出现盆腔脓肿时，可有大便次数增多、里急后重、黏液便等直肠刺激症状。炎症较重者可出现体温升高、脉率增快等全身中毒症状，如发生门静脉炎时出现寒战高热和轻度黄疸，严重者可发生感染性休克。

2. 体征 最重要的体征是右下腹固定的压痛，如阑尾炎症扩散，疼痛范围也随之扩大，但仍以阑尾部位压痛最为明显。阑尾化脓、坏疽时有腹肌紧张、反跳痛，如腹膜刺激征范围扩大，说明阑尾发生穿孔。阑尾周围脓肿形成后，可在右下腹触及边界不清和较为固定的压痛性包块。此题选择 E。

【妇产科护理学】枕右前位胎头通过软产道时进行内旋转，是使胎头的

- A. 矢状缝与骨盆入口横径相一致
- B. 矢状缝与中骨盆横径相一致
- C. 矢状缝与中骨盆前后径相一致
- D. 前囟转至耻骨弓下面
- E. 后囟转至骶骨前方

【答案及解析】本题选 C

枕左前位的分娩机制：

(1) 衔接 胎头双顶径进入骨盆入口平面，胎头颅骨最低点接近或达到坐骨棘水平，称为衔接。

(2) 下降 胎头沿骨盆轴前进的动作，称为下降。胎头在下降过程中，受骨盆底的阻力发生俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转等动作。

(3) 俯屈 胎头以枕额径进入骨盆腔后，胎头枕部遇肛提肌阻力，变胎头枕额径为枕下前囟径。

(4) 内旋转 胎头为适应骨盆纵轴而旋转，使矢状缝与中骨盆及出口前后径相一致，胎头于第一产程末完成内旋转动作。

(5) 仰伸 胎头下降达阴道外口时，宫缩和腹压继续迫使胎头下降，而肛提肌收缩力又将胎头向前推进，胎头枕骨下部达耻骨联合下缘时，以耻骨弓为支点，使胎头逐渐仰伸，当胎头仰伸时，胎儿双肩径沿左斜径进入骨盆入口。

(6) 复位及外旋转 胎头娩出后，为使胎头与胎肩恢复正常关系，胎头枕部向左旋转 45°，称为复位。胎肩在盆腔内继续下降，前（右）肩向前向中线旋转 45° 时，胎儿

双肩径转成与出口前后径相一致的方向，胎头枕部需在外继续向左旋转 45°，以保持胎头与胎肩的垂直关系，称为外旋转。

(7) 胎儿娩出 胎头完成外旋转后，胎头及双肩相继娩出，胎体及胎儿下肢随之顺利娩出。

根据上述文字，此题应该选择 C.

三、A3/A4 型题

女性，68 岁，脑血管意外，经过抢救治疗，生命体征趋于平稳，但处于昏迷状态，护士交接班时发现病人骶尾部皮肤 2cm×3cm 呈紫红色，并有小水泡形成。

1. 此时病人褥疮的临床分期是
A. 淤血红润期 B. 炎性红润期 C. 炎性浸润期
D. 淤血浸润期 E. 溃疡期
2. 为防止褥疮进一步发展，护理措施正确的是
A. 给病人 3 小时翻身一次
B. 为病人骶尾部垫气圈
C. 保持皮肤清洁干燥，避免潮湿等刺激
D. 局部按摩时护士手掌紧贴病人患处
E. 定期用 50% 的酒精按摩骶尾部
3. 若骶尾部的小水泡融合成大水泡，护士应采取的正确措施是
A. 保持局部皮肤湿润，防止水泡破裂
B. 以无菌操作方法抽出水泡内液体后，用无菌敷料包扎
C. 用酒精按摩水泡局部，使其吸收
D. 剪破水泡表皮后，涂以消毒液
E. 减少局部摩擦，防止破裂，让其自然吸收

朱女士，45 岁，因蛛网膜下腔出血，昏迷 3 天，经抢救后病情渐稳定。现持续输液，鼻饲供给营养。

4. 插入鼻饲管至会咽部时，托起病人头部，使其下颌靠近胸骨柄的目的是
A. 使鼻道通畅
B. 避免咽后壁刺激
C. 加大咽喉部通道的弧度
D. 使喉肌放松便于胃管通过
E. 使食管第一狭窄消失
5. 鼻饲管留置期间的护理下列哪项错误
A. 每日做口腔护理
B. 每次喂食间隔时间不少于 2h
C. 灌流质前后注入少量温开水
D. 每日晚上拔出胃管，次晨换管插入
E. 鼻饲用物每日消毒一次

2. 静脉导管留置时间过长易发生感染，一般导管留置时间不易超过

- A. 1 天 B. 3 天 C. 2 天 D. 4 天 E. 5 天

参考答案：B

3. 灭菌后的治疗巾包打开后，剩余的治疗巾有效期为

- A. <4H B. <24H C. <48H
D. <12H
E. <36H

参考答案：B

4. 医院感染研究的主要对象是

- A. 探视者
B. 陪护家属
C. 门诊病人
D. 医护人员
E. 住院病人

参考答案：E

5. 夏天高压蒸汽灭菌后的无菌包，保存有效期最长时间不能超过

- A. 3天 B. 14天 C. 28 D. 7天 E. 21天

参考答案：D

6. 医疗用品按其污染后造成危险的程度，可分几类

- A. 1类 B. 3类 C. 5类 D. 2类 E. 4类

参考答案：B

7. 医院感染不包括下列哪一类

- A. 病人在医院内获得的感染 B. 入院时已处于潜伏期的感染
C. 新生儿经产道分娩时发生的感染
D. 出院时已处于潜伏期且出院后不久发生的感染
E. 手术后输血造成的病毒感染

参考答案：B

8. 对无明显潜伏期的疾病，判断医院感染的原则是

- A. 入院后 24 小时发生感染 B. 入院后 32 小时发生感染
C. 入院后 8 小时发生感染 D. 入院后 48 小时发生感染
E. 入院后 16 小时发生感染

参考答案：D

9. 高压蒸汽灭菌有效监督最有效的方法是

- A. 化学指示胶带 B. 程序监测 C. 化学指示卡 D. 生物监测
E. 温燃

参考答案：D

10. 下列哪项不需要手术消毒

- A. 进入和离开隔离病房 B. 接触特殊感染病原体后 C. 脱无菌手套
D. 接触病人血液后 E. 接触病人体液后

参考答案：C

11. 口腔科牙钻结构复杂，经常接触破损的黏膜，常有血液污染，牙钻属于

- A. 高度危险性物品
B. 低度危险性物品
C. 需中水平消毒的物品
D. 中度危险性物品

E. 需高水平消毒的物品

参考答案：A

12. 预防术后切口感染使用抗菌药物的最佳时间是

A. 术前三天给药 B. 术前 30-60 分钟给药

C. 术前一天给药 D. 术前 6 小时给药

E. 术后回病房即给药

参考答案：B

13. 促进长期卧床病人排痰的有效措施是

A. 负压吸引 B. 提高机体免疫力

C. 翻身，叩背 D. 体液引流 E. 药物去痰

参考答案：C

14. 静脉采血以下哪几项符合要求

A. 一人一针一管 B. 一人一针一管一巾一带

C. 一人一针一带 D. 一人一针一管一巾

E. 一人一针一巾

参考答案：B

15. 凡高度危险性物品，必须选用

A. 高效消毒法 B. 中效消毒法 C. 灭菌法

D. 低效消毒法 E. 机械清洗法

参考答案：C

16. 移位菌群失调原因与那些因素无关

A. 不适当使用抗菌药物

B. 插管或介入治疗

C. 细菌结构变化

D. 外科手术

E. 免疫功能下降

参考答案：C

17. 一旦医院发生急性胃肠道感染的爆发流行不应

A. 立即将发病患者转入传染病院

B. 调查了解发病情况

C. 掌握爆发流行的时间分布

D. 查阅病历及细菌检查结果

E. 切断传染途径

参考答案：A

二. B 型题

A. 败血症 B. 风湿热 C. 支气管肺炎 D. 咽后壁脓肿 E. 胃肠炎

1. 上感时炎症向邻近器官蔓延 D

2. 上感时炎症向下蔓延 C

3. 感染通过血行蔓延 A

4. 引起变态反应性疾病：B

A. 社区保健服务

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/356125240223010045>