




深秋猪易发生裂蹄病

汇报人：

日期：



contents

目录

- 裂蹄病简介
- 裂蹄病的病因分析
- 裂蹄病的症状与诊断
- 裂蹄病的预防与治疗
- 实例分析

01

裂蹄病简介





裂蹄病的定义

- 裂蹄病是一种常见的猪只疾病，主要特征是猪蹄部出现裂纹、开裂或溃疡等病变。这种病症通常由多种因素引起，包括管理不当、营养不足、环境恶劣等。



裂蹄病在深秋季节的易发性

气候干燥

深秋季节气候干燥，猪蹄部皮肤水分易蒸发，导致皮肤变得干燥、脆弱，容易出现裂纹。



温度波动

深秋时节温度起伏较大，白天温暖晚上凉爽，这种温度变化会使猪蹄部皮肤收缩和舒张频繁，增加裂蹄的风险。



饲料变化

秋季是饲料转换时期，饲料品种和营养成分的改变可能影响猪蹄部的健康。




裂蹄病对猪只的影响

生长迟缓：裂蹄病导致猪只行走不便，减少活动量和采食量，从而影响生长发育。

因此，在深秋季节，养殖户应加强对猪只的管理和护理，预防裂蹄病的发生，提高养殖效益。

增加养殖成本：治疗裂蹄病需要额外的药物和人力成本，增加养殖的经济负担。



感染风险：裂开的蹄部容易感染细菌、病毒等病原体，引发更严重的疾病。

降低肉质品质：患有裂蹄病的猪猪肉质往往较差，影响肉品的市场价值。

02

裂蹄病的病因分析





饲养环境不良



地面硬度

猪舍地面过硬，尤其是水泥地面，没有适当的垫料，使得猪蹄部长时间承受过大压力，容易导致蹄部裂伤。



湿度过高

猪舍内湿度过大，猪蹄部皮肤长期处于潮湿环境中，容易变软、破损，从而引发裂蹄病。



温度变化

深秋季节温度骤降，猪蹄部皮肤收缩，容易出现干裂，进而引发裂蹄病。




营养不均衡

缺乏矿物质

如钙、磷等矿物质摄入不足，影响猪蹄部骨骼和角质的正常生长，容易导致裂蹄病。

缺乏维生素

如维生素A、E等，这些维生素对于维持猪蹄部皮肤和角质的健康状态具有重要作用，缺乏时容易引发裂蹄病。





生物学因素

01

品种差异

不同品种的猪对裂蹄病的敏感性不同，一些品种的猪蹄部结构天生较薄弱，容易发病。

02


年龄和体重

随着年龄增长和体重增加，猪蹄部承受的压力增大，容易出现裂蹄病。尤其在深秋季节，猪为了抵御寒冷，食欲增加，体重增长较快，蹄部负担加重。

03


疾病感染

如猪蹄部感染真菌、细菌等病原体，导致蹄部皮肤炎症、角质软化，容易引发裂蹄病。



03

裂蹄病的症状与诊断



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/357000023025006126>