

血液透析专科知识试题含答案

1、低分子肝素的缺点（ ）

- A、半衰期长
- B、出血风险降低
- C、价格昂贵
- D、拮抗药不容易中和
- E、稳定性好

答案：C

2、为了避免透析器“首次使用反应”，通常选择（ ）透析器消毒方式

- A、环氧乙烷消毒
- B、蒸汽高压灭菌
- C、 β 射线照射消毒
- D、生理盐水预冲
- E、肝素生理盐水预冲

答案：B

3、给昏迷病人保暖，用热水袋的温度是（ ）

- A、40 度
- B、50 度
- C、60 度
- D、65 度
- E、55 度

答案：B

4、血液透析中可以监测血液透析的抗凝指标（ ）

- A、循环血路眼观检查
- B、循环血路压力测定
- C、透析器凝血程度
- D、凝血试验
- E、以上都对

答案：E

5、患者女性，47 岁。突然神志丧失，呼吸不规则，判断发生心脏停搏的指标是（ ）

- A、血压
- B、瞳孔散大
- C、桡动脉搏动消失
- D、颈动脉搏动消失

E、心音消失

答案：D

6、水处理系统的日常监测包括（ ）

- A、定期监测记录压力参数
- B、定期检测余氯、硬度水平
- C、定期检测反渗水细菌培养
- D、定期检测反渗水内毒素
- E、消毒时间

答案：E

7、透析机及床位要求正确的是（ ）

- A、透析单元床间距离不小于 0.6 米
- B、透析单元床间距离不小于 0.8 米
- C、实际占用面积不小于 2.2 平方米
- D、实际占用面积不小于 3.4 平方米
- E、实际占用面积不小于 3.6 平方米

答案：B

8、反渗水微生物标准正确的是（ ）

- A、细菌水平不得超过 200CUF/ml，内毒素不得超过 2EU/ml
- B、细菌水平不得超过 300CUF/ml，内毒素不得超过 2EU/ml
- C、细菌水平不得超过 150CUF/ml，内毒素不得超过 4EU/ml
- D、细菌水平不得超过 200CUF/ml，内毒素不得超过 2.5EU/ml
- E、细菌水平不得超过 100CUF/ml，内毒素不得超过 2.5EU/ml

答案：A

9、哪些表现不能提示自体动静脉内瘘已成熟（ ）

- A、血管壁增厚，显露清晰
- B、有明显动脉震颤或搏动
- C、内瘘直径增粗，能保证成功的穿刺
- D、提供足够的血流量
- E、动静脉内瘘术后一月

答案：E

10、不属于 ARF 临床表现的是（ ）

- A、高钾血症
- B、水中毒
- C、代谢性酸中毒
- D、高磷低钙血症

E、以上都不是

答案：D

11、下列哪项不是深静脉穿刺置管的适应症（ ）

A、长期输液治疗

B、大量、快速扩容

C、血液净化

D、心功能不全

E、以上都不对

答案：D

12、护士在血液透析医务人员组成中约占（ ）

A、0.9

B、0.8

C、0.7

D、0.6

E、0.5

答案：B

13、透析管路预冲后必须（ ）内使用，否则要重新预冲

A、2 小时

B、4 小时

C、6 小时

D、8 小时

E、12 小时

答案：B

14、血栓闭塞性脉管炎的早期最主要的临床表现是（ ）

A、患肢肌肉萎缩

B、患肢趾甲生长缓慢、增厚变形

C、间歇性跛行

D、持续性静息痛

E、足背动脉搏动消失

答案：C

15、患者，男性，40 岁。因急性腹膜炎入院，手术治疗后 1 周，体温升高至 38.2℃，伴腹泻、里急后重，最有意义的检查是（ ）

A、CT 检查

B、腹部 X 线平片

C、大便常规化验

D、腹腔穿刺术

E、直肠指检

答案：E

16、正确的封管方法（ ）

A、生理盐水给药生理盐水

B、给药生理盐水肝素稀释液

C、生理盐水给药生理盐水肝素稀释液

D、脉冲式正压冲洗导管

E、脉冲式负压冲洗导管

答案：D

17、妊娠透析患者合并高血压危象首选药物（ ）

A、肼屈嗪

B、甲基多巴

C、拉贝洛尔

D、二氮嗪

E、硝普钠

答案：A

18、下列良性肿瘤的特点中，错误的是（ ）

A、细胞分化程度高

B、多呈膨胀性生长，不发生转移

C、永不威胁生命

D、有包膜与周围组织分界明显

E、少数可恶变

答案：C

19、水处理设备系统水硬度超标常见原因不包括（ ）

A、盐缸加盐不及时

B、盐水未饱和

C、树脂罐容量不合理

D、没定期再生

E、消毒不彻底

答案：E

20、前列腺增生排尿困难的程度主要决定于（ ）

A、前列腺的大小

B、患者年龄

C、增生的部位

D、是否癌变

E、是否钙化

答案：C

21、人工血管患者自我护理指导时保持手臂清洁止血敷料覆盖（ ）防止感染

A、6

B、8

C、12

D、24

E、36

答案：D

22、下列哪项是颈内静脉置管的优点（ ）

A、易感染

B、对气管插管有影响

C、留置时间长

D、易发生严重并发症

E、产生血栓

答案：C

23、有明显腹膜刺激征的疾病是（ ）

A、急性阑尾炎穿孔

B、肾结石

C、不完全性肠梗阻

D、急性胆囊炎

E、上消化道出血

答案：A

24、普通肝素在血液透析结束前（ ）停止追加

A、30min

B、60min

C、30--60min

D、1--2 小时

E、20--40min

答案：C

25、透析器超滤系数是指（ ）

A、每分钟能够通过透析器的液体量

B、单位时间内能够超滤的毫升数

- C、单位跨膜压下，每小时能超滤的毫升数
- D、每小时的脱水速率
- E、反应透析器对小分子毒素的清除能力

答案：C

26、下列哪些是动静脉内瘘冷敷的适应症（ ）

- A、功能不好
- B、血流量差
- C、血管不充盈
- D、炎症引起的局部红、肿、热、痛，有使炎症局限化的作用
- E、容易发生栓塞

答案：D

27、透析患儿透析过程中发生低血压的护理错误的是（ ）

- A、限制小儿体外循环血量 $<5\text{ml/kg}$
- B、控制超滤量和超滤速度
- C、采用钠曲线或序贯透析
- D、适当进行低温透析
- E、透析中进行在线血容量监测

答案：A

28、透析液成分中钙中毒的毒性表现不包括（ ）

- A、恶心、呕吐
- B、无力
- C、头痛
- D、发绀
- E、高血压

答案：D

29、不是血浆置换的适应症是（ ）

- A、血栓性血小板减少性紫癜
- B、格林—巴利综合症
- C、系统性红斑狼疮
- D、慢性肾衰.尿毒症期
- E、抗肾小球基底膜病

答案：D

30、对中心静脉压和血压均低于正常值的休克病人，应采取的措施是（ ）

- A、大量输液，加快滴速
- B、控制滴速，减慢输液

- C、暂停输液，用强心剂
- D、用升压药物
- E、控制低速、用强心剂

答案：A

31、CKD3 期病人，指导病人饮食中蛋白质摄入量应限制在（ ）

- A、0.4g/（kg·d）
- B、0.6g/（kg·d）
- C、0.8g/（kg·d）
- D、1.0g/（kg·d）
- E、1.2g/（kg·d）

答案：B

32、患者男性，47 岁。昨晚饮白酒 400ml 后现呕血来院急诊。既往无溃疡、肝病史。查体：血压 100/60mmHg，脉搏 95 次 / 分，肝、脾未触及。患者出血的原因最可能是（ ）

- A、应激性溃疡
- B、消化性溃疡出血
- C、反流性食管炎出血
- D、食管胃底静脉曲张破裂出血
- E、急性胃黏膜损伤

答案：E

33、血液净化护士需要经过（ ）的基本岗前培训和考核

- A、2~3 个月
- B、3~5 个月
- C、4~5 个月
- D、3~6 个月
- E、8~10 个月

答案：D

34、急性肾衰竭透析治疗适应征不包括（ ）

- A、利尿剂难以控制的水超负荷
- B、药物难以控制的高血压
- C、 $\text{CO}_2\text{CP} < 13\text{mmol/L}$
- D、明显的尿毒症表现
- E、肌酐升高

答案：E

35、临时性中心静脉置管单腔导管一般长（ ）

- A、13-15cm
- B、15-18cm
- C、18-21cm
- D、15-20cm
- E、19-24cm

答案：D

36、肺泡表面活性物质不能起到的作用是（ ）

- A、维持肺泡的扩张状态
- B、降低肺泡表面张力
- C、稳定肺泡容积
- D、降低肺的顺应性
- E、防止毛细血管内液体滤入肺泡

答案：D

37、现有市场上商品用枸橼酸钠抗凝剂的浓度是（ ）

- A、0.04
- B、0.06
- C、0.02
- D、0.08
- E、0.1

答案：A

38、口服铁剂的时间应在（ ）

- A、清晨
- B、饭前
- C、饭后
- D、睡前
- E、两餐之间

答案：E

39、糖尿病肾病患者，严重水肿，肾功能正常，最适的 CRRT 治疗模式是（ ）

- A、S C U F
- B、C V V H D
- C、C H F D
- D、C V V H D F
- E、C V V H

答案：A

40、尿毒症时脂质代谢紊乱突出表现是（ ）

- A、血三酰甘油明显升高
- B、血高密度脂蛋白降低
- C、血低密度脂蛋白增高
- D、血高密度脂蛋白增高
- E、血低密度脂蛋白降低

答案：A

41、慢性肾炎的治疗，主要目的是（ ）

- A、消除蛋白尿、血尿
- B、防止心脑血管并发症
- C、防止腹腔积液
- D、防止或延缓肾功能的进行性减退
- E、防止高血压脑病

答案：D

42、导致肾损害的药物最常见的是（ ）

- A、解热镇痛药
- B、脱水药
- C、抗生素
- D、中药
- E、免疫抑制剂

答案：C

43、透析后穿刺部位局部压迫止血，力量要适宜，一般要求动脉或静脉穿刺部位压迫止血时间应（ ）分钟，应同时按压皮肤穿刺点和血管穿刺点，压迫部位应在距穿刺针尖方向（ ）处

- A、6-12, 0.5-1cm
- B、15-20, 0.3-0.5cm
- C、20-30, 1-2cm
- D、10-15, 0.3-0.5cm
- E、15-20, 0.5-1cm

答案：A

44、高位动静脉内瘘穿刺时静脉穿刺点应优先选择（ ）

- A、对侧肢体
- B、动静脉穿刺于同一条血管
- C、颈部静脉
- D、下肢静脉

E、足背静脉

答案：B

45、腹膜透析每次灌注量为（ ）

A、300~500ml

B、500~1000ml

C、1000~1500ml

D、1500~2000ml

E、2000~2500ml

答案：B

46、血液透析疗法对药物具有一定的清除作用，影响药物清除的因素不包括（ ）

A、药物相对分子质量及大小

B、蛋白结合率

C、药物分布容积

D、透析器膜性能

E、血流量、透析液流量及超滤量

答案：A

47、以下不是肾病综合征的临床特征（ ）

A、大量蛋白尿

B、低白蛋白血症

C、水肿

D、高血压

E、高脂血症

答案：D

48、关于高渗性脱水，说法不正确的是（ ）

A、以丢失水分为主

B、细胞内脱水严重

C、Na⁺从细胞外向细胞内流

D、抗利尿激素增加

E、尿比重增高

答案：C

49、急性左心衰竭治疗药物中不包括（ ）

A、吗啡

B、西地兰

C、氨茶碱

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/358065077140006033>