



急疹的急救与护 理办法



目录

- 急疹概述
- 急疹的急救措施
- 急疹的护理办法
- 预防急疹的注意事项
- 急疹的常见误区与澄清





01

急疹概述





急疹的定义

急疹是一种急性发作的皮肤病，通常由过敏反应或感染引起。



它通常在短时间内出现，并伴随着明显的瘙痒和疼痛。

急疹可以出现在身体的任何部位，但最常见于手臂、腿部和躯干。





急疹的症状和表现

急疹的症状包括皮肤发红、肿胀、瘙痒和疼痛。



症状的严重程度因人而异，有些人可能只出现轻微的瘙痒和红肿，而有些人则可能出现严重的疼痛和全身症状。



可能出现水疱、脓疱或溃疡，并伴随发热和淋巴结肿大。





急疹的分类



根据病因，急疹可以分为感染性急疹和过敏性急疹。



感染性急疹通常由病毒或细菌感染引起，如水痘、带状疱疹等。



过敏性急疹通常由过敏反应引起，如荨麻疹、接触性皮炎等。



02

急疹的急救措施



急救原则

01



腹部手拳冲击法

快速反应



一旦发现急疹，应立即采取急救措施，以降低病死率。

02



保持呼吸道通畅



确保患者呼吸道畅通，必要时进行人工呼吸或吸氧。

03



维持生命体征



监测患者生命体征，如心率、血压、呼吸等，并采取相应措施保持稳定。



现场急救措施



止血

对于出血性急疹，应立即采取压迫止血或止血剂止血。



止痛

对于疼痛性急疹，可适当使用止痛药缓解疼痛。



抗过敏

对于过敏反应，应立即使用抗过敏药物。



急救药物的使用

肾上腺素

用于过敏性急疹，可快速缓解过敏症状。



镇静剂

用于焦虑、烦躁的患者，有助于稳定情绪。



抗生素

对于感染性急疹，应使用适当的抗生素进行治疗。



03

急疹的护理办法



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/365043002320011141>