

## 住院医师规范化培训-全科医学专业结业考试

一、A1型题（每题1.0分，共63.0分）

1. 《中华人民共和国执业医师法》所称医师，包括

- A. 执业医师和执业助理医师
- B. 执业医师和执业实习医师
- C. 执业医师、执业助理医师和执业实习医师
- D. 临床医师、中医医师、口腔医师和公共卫生医师
- E. 医师和住院医师

正确答案：(A)

得分：0

2. 临终关怀的道德要求中，下列适度治疗的原则哪一项是正确的

- A. 解除痛苦、无痛苦地死去
- B. 完全放弃治疗
- C. 以延长生命过程的治疗为主
- D. 以治疗疾病为主
- E. 加速患者死亡

正确答案：(A)

得分：1

3. 孕产期保健服务不包括

- A. 母婴保健
- B. 孕产妇保健
- C. 胎儿保健
- D. 新生儿保健
- E. 新生儿预防接种

正确答案：(E)

得分：1

4. 做好医患沟通的基本原则是

- A. 换位思维，站到病人的立场上，理解病人，为病人着想
- B. 尊重患者所作出的决定
- C. 采取行动，帮助患者
- D. 化危机为机遇，留住患者
- E. 迅速反应，不拖延

正确答案：(A)

得分：1

5. 对急诊患者，当手术是抢救患者的唯一方案时，最符合医学道德的做法是

- A. 首先考虑患者的选择
- B. 立即进行手术
- C. 在征得其家属或单位同意后，立即进行手术
- D. 放弃手术
- E. 患者拒绝手术时可不手术

得分：1

6. 从事药品研制、生产、经营、使用活动，应当遵守法律、法规、规章、标准和规范，保证全过程信息（）。

- A.真实、精确、完整和可追溯
- B.真实、准确、完整和可追溯
- C.详实、准确、完整和可追溯
- D.真实、准确、完全和可追溯
- E.真实、准确、完整和可查找

正确答案：（B）

得分：1

7. 用血者血液调配工作由\_\_\_\_\_负责

- A.血液中心
- B.血站
- C.中心血库
- D.医疗机构输血科
- E.省级卫生行政部门

正确答案：（B）

得分：0

8. 以下哪项是《新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版）》增加的诊断标准

- A.新冠病毒核酸检测阳性
- B.新冠病毒抗原检测阳性
- C.新冠病毒分离、培养阳性
- D.恢复期新冠病毒特异性 IgG 抗体水平为急性期 4 倍或以上升高
- E.新冠病毒抗原检测阳性加新冠病毒核酸检测阳性

正确答案：（B）

得分：0

9. 《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》对“乙类乙管”实施的具体时间是

- A.即日起
- B.2022 年 1 月 1 日起
- C.2023 年 1 月 8 日起
- D.公布之日起
- E.2023 年 1 月 1 日起

正确答案：（C）

得分：1

10. 通过内心信念来实现的道德评价是

- A.患者评价
- B.群众评价
- C.领导评价
- D.同行评价
- E.自我评价

正确答案：（E）

得分：1

11. 老年期抑郁症病人与其他年龄段抑郁症相比，其特点是

- B.自卑观念突出、自我评价低
- C.孤独感突出，多疑、敏感，病态观念突出
- D.记忆力、注意力障碍突出
- E.躯体不适，情绪不稳，易激惹突出

正确答案：(E)

得分：0

12. 利多卡因抗心律失常的主要机制是

- A.阻断  $K^+$ 通道，抑制  $K^+$ 外流
- B.阻断  $Na^+$ 通道，抑制  $Na^+$ 内流
- C.阻断  $Ca^{2+}$ 通道，抑制  $Ca^{2+}$ 内流
- D.阻断  $Cl^-$ 通道，抑制  $Cl^-$ 内流
- E.提高心肌细胞自律性

正确答案：(B)

得分：0

13. 不属于中毒性细菌性痢疾临床表现的是

- A.起病时肠道症状可不明显
- B.迅速发生休克与呼吸衰竭
- C.均有脑膜刺激征
- D.多见于 2~7 岁儿童
- E.急起高热，反复惊厥

正确答案：(C)

得分：1

14. 异物进入鼻腔或鼻腔外伤史中植物性异物多见，如豆类、果核等，并在（ ）中发病率较高

- A.儿童
- B.老年人
- C.残疾人
- D.成年人
- E.婴儿

正确答案：(A)

得分：1

15. 慢性肾衰竭患者发生纤维性骨炎的主要原因是

- A.尿钙排泄增多
- B.继发性甲状旁腺功能亢进
- C.尿磷排泄减少
- D.营养不良和低蛋白血症
- E.活性维生素

正确答案：(B)

得分：1

16. 以下关于艾滋病传染途径说法不正确的是

- A.可以通过血液传播
- B.主要为性接触传染
- C.可以通过母婴传播

E.同患者握手可以引起传播

正确答案：(E)

得分：1

17. 患高血压的育龄期妇女，宜选用的避孕方法是

A.安全期避孕

B.皮下埋置缓释剂

C.阴茎套

D.复方短效口服避孕药

E.复方长效避孕针

正确答案：(C)

得分：1

18. 对于抑郁症的患者，其最基本的症状为

A.焦虑

B.情绪低落

C.精力明显减退、疲乏

D.无望、无助、无价值

E.自责、自罪、自杀

正确答案：(B)

得分：1

19. 心绞痛及昏厥常见于

A.二尖瓣狭窄

B.二尖瓣关闭不全

C.主动脉瓣狭窄

D.主动脉瓣关闭不全

E.三尖瓣狭窄

正确答案：(C)

得分：1

20. 湿疹一般不宜使用的药物是

A.苯海拉明

B.氯苯那敏

C.氯雷他定

D.糖皮质激素

E.10%葡萄糖酸钙

正确答案：(D)

得分：0

21. 以下关于围绝经期综合征的说法中，哪项是错误的

A.围绝经期雌激素分泌逐渐减少，促性腺激素升高

B.围绝经期妇女均会出现自主神经紊乱症状

C.围绝经期综合征指因性激素减少所致的一系列症状

D.围绝经期包括绝经前期和绝经后1年内的期间

E.在人工绝经或自然绝经后出现症状

正确答案：(B)

得分：1

22.

- A. 阑尾残株炎
- B. 切口感染
- C. 粪瘘
- D. 粘连性肠梗阻
- E. 出血

正确答案：(B)

得分：1

23. 腹股沟斜疝的特点为

- A. 经 Hesselbach 三角突出
- B. 精索在疝囊后方
- C. 疝囊颈在腹壁下动脉内侧
- D. 多见于老年
- E. 回纳疝块后压住深环，疝块仍可突出

正确答案：(B)

得分：1

24. 二尖瓣狭窄并发心房颤动和右心衰竭时，可在右房形成附壁血栓，可能致

- A. 脑栓塞
- B. 肾栓塞
- C. 肠系膜栓塞
- D. 肺栓塞
- E. 脾栓塞

正确答案：(D)

得分：0

25. 引起子宫脱垂的最常见原因是

- A. 分娩损伤
- B. 长期重体力劳动
- C. 肥胖体型
- D. 慢性咳嗽
- E. 习惯性便秘

正确答案：(A)

得分：1

26. 育龄期女性月经的发生是由于

- A. 雌激素减少
- B. 孕激素减少
- C. 雌激素和孕激素均减少
- D. 黄体生成素减少
- E. 绒毛膜促性腺激素减少

正确答案：(C)

得分：1

27. 结膜充血的颜色是

- A. 呈鲜红色
- B. 呈暗红色
- C. 呈紫红色

E.呈粉红色

正确答案：(A)

得分：0

28. 长期大量口服氯丙嗪治疗精神病最常见的不良反应是

A.锥体外系反应

B.中枢抑制症状

C.体位性低血压

D.过敏反应

E.锥体系反应

正确答案：(A)

得分：0

29. 发生动脉粥样硬化最多的动脉是

A.肾动脉

B.冠状动脉

C.脾动脉

D.肺动脉

E.肱动脉

正确答案：(B)

得分：1

30. 以下关于分泌性中耳炎的说法，不正确的是

A.分泌性中耳炎是以传导性聋和鼓室积液为特征的中耳非化脓性炎性疾病

B.夏季多发，成人发病率明显高于儿童

C.症状为听力下降伴自声增强，急性发病时可有耳痛，耳内闭塞感或闷胀感也是常见症状，按压耳屏后可暂时减轻

D.鼓膜内陷，鼓室积液时，鼓膜失去正常光泽，呈淡黄、橙红或琥珀色

E.鼓气耳镜检查见鼓膜活动受限

正确答案：(B)

得分：0

31. 首选糖皮质激素治疗的肾脏疾病是

A.隐匿性肾炎

B.急性肾小球肾炎

C.乙肝病毒相关性肾炎

D.急性肾小管坏死

E.微小病变肾病

正确答案：(E)

得分：1

32. 关于荨麻疹的病因，下列说法错误的是

A.与食物有关

B.与药物有关

C.感染可引起

D.精神因素不可引起

E.与遗传相关

正确答案：(D)

1

33. 关于口服降糖药物的临床应用，正确的是
- A. 糖尿病合并严重的感染时，应增加口服降糖药的剂量
  - B. 1 型糖尿病应用时应同时使用磺脲和双胍类降糖药物
  - C. 肥胖的 2 型糖尿病饮食治疗控制不佳时应加用口服降糖药物
  - D. 磺胺类能降低磺脲类药物的降糖效果
  - E. 磺脲类药物可能诱发乳酸性酸中毒

正确答案：(C)

得分：1

34. 新生儿溶血病属于
- A. 同族免疫性溶血
  - B. 异族免疫性溶血
  - C. 红细胞膜受损所致溶血
  - D. 红细胞酶缺乏所致溶血
  - E. 血红蛋白异常所致溶血

正确答案：(A)

得分：1

35. 根据异物大小、形状、部位和性质的不同，采用不同的异物取出方法。针对动物性异物，下列方法正确的是

- A. 用头端是钩状或环状的器械，从前鼻孔轻轻进入，绕至异物后方再向前钩出
- B. 用镊子夹取
- C. 先用 1% 丁卡因麻醉鼻腔黏膜，再用鼻钳取出
- D. 用医学专用鼻钳取出
- E. 定期观察，不必急于取出

正确答案：(C)

得分：0

36. 系统性红斑狼疮的病因与下列哪项无关
- A. 遗传
  - B. 化学药物
  - C. 紫外线
  - D. 雄激素
  - E. 感染

正确答案：(D)

得分：1

37. 慢性肺源性心脏病最常见的死亡原因是
- A. 肺性脑病
  - B. 心律失常
  - C. 心力衰竭
  - D. 重症呼吸道感染
  - E. 消化道出血

正确答案：(A)

得分：0

38. 下列哪种物品不宜用高压蒸汽灭菌法
- A. 手术剪

- C.内镜
- D.玻璃注射器
- E.瓶装溶液

正确答案：(C)

得分：0

39. 绞窄性肠梗阻的腹痛特点是

- A.持续性钝痛
- B.持续性剧痛
- C.阵发性绞痛
- D.阵发性剧痛
- E.持续性隐痛，阵发性加剧

正确答案：(B)

得分：1

40. 胸部 X 线片阴影具有易变性，常形成单个或多发液气囊腔的肺炎是

- A.肺炎球菌肺炎
- B.金黄色葡萄球菌肺炎
- C.克雷伯菌肺炎
- D.肺炎支原体肺炎
- E.病毒性肺炎

正确答案：(B)

得分：1

41. 肝硬化失代偿期突出的临床表现是

- A.食管、胃底静脉曲张
- B.腹腔内出现漏出液
- C.消瘦贫血营养不良
- D.皮肤色泽变黑
- E.全血细胞减少

正确答案：(B)

得分：1

42. 下列情况下，肺泡呼吸音增强的是

- A.胸痛
- B.代谢性酸中毒
- C.支气管狭窄
- D.气胸
- E.重症肌无力

正确答案：(B)

得分：0

43. 左心衰竭患者在出现右心衰竭时，呼吸困难减轻的原因是

- A.体循环淤血减轻
- B.肺动脉压降低
- C.血压下降
- D.右心室排血量减少
- E.左心室收缩力相对

得分：1

44. 上消化道出血病人的粪便颜色一般为

- A. 绿色
- B. 红色
- C. 柏油色
- D. 果酱色
- E. 白陶土色

正确答案：(C)

得分：1

45. 苯二氮草类中毒的常见药物不包括

- A. 氟西洋
- B. 氯氮草
- C. 地西洋
- D. 吩噻嗪
- E. 三唑仑

正确答案：(D)

得分：1

46. 骨折治疗原则中的首要步骤是

- A. 功能锻炼
- B. 内固定
- C. 复位
- D. 包扎
- E. 外固定

正确答案：(C)

得分：1

47. 创伤现场急救的通气措施不包括

- A. 手指掏出口腔内血凝块
- B. 呼吸末正压给氧
- C. 气管插管
- D. 气管切开
- E. 环甲膜穿刺

正确答案：(B)

得分：0

48. 下列有关疝的叙述，哪项是正确的

- A. 未进入阴囊的疝为腹股沟直疝
- B. 疝囊在精索前外方的疝为腹股沟直疝
- C. 极易嵌顿的疝为腹股沟斜疝
- D. 腹股沟周围呈半球状的腹外疝为直疝
- E. 压住内环让病人站立咳嗽，疝块复现的疝为直疝

正确答案：(E)

得分：1

49. 属于骨折早期并发症的是

- A. 脂肪栓塞综合征

- C.创伤性关节炎
- D.损伤性骨化
- E.急性骨萎缩

正确答案：(A)

得分：1

50. 慢性肾炎合并高血压尿毒症，同时伴有水肿，下列药物应首先应用

- A.呋塞米
- B.甘露醇
- C.氢氯噻嗪
- D.氨苯蝶啶
- E.利尿合剂

正确答案：(A)

得分：0

51. 最常发生转移性腹痛的疾病是

- A.急性肠穿孔
- B.急性阑尾炎
- C.急性胃炎
- D.急性胰腺炎
- E.急性胆囊炎

正确答案：(B)

得分：1

52. 下列哪项不是中毒性痢疾的临床表现

- A.惊厥
- B.神志不清
- C.休克
- D.呼吸衰竭
- E.皮疹

正确答案：(E)

得分：1

53. 以下哪项治疗蛛网膜下腔出血的措施不妥

- A.卧床休息 4~6 周
- B.应用止血药
- C.低分子肝素注射
- D.静脉滴注 20%甘露醇
- E.口服尼莫地平

正确答案：(C)

得分：1

54. 别嘌醇治疗痛风的机制是该药抑制

- A.鸟嘌呤脱氢酶
- B.黄嘌呤脱氢酶
- C.黄嘌呤氧化酶
- D.腺苷脱氨酶
- E.尿酸氧化酶

得分：0

55. 以下治疗青光眼的药物中哪一种的降压机制是使阻塞房角开放

- A. 醋唑磺胺
- B. 甘露醇
- C. 噻吗洛尔
- D. 甘油盐水
- E. 毛果芸香碱

正确答案：(E)

得分：1

56. 结核性胸膜炎患者，除抗结核治疗外，减轻胸膜肥厚最重要的措施是

- A. 反复胸腔穿刺抽液
- B. 胸腔内注入抗结核药物
- C. 胸腔内注射糜蛋白酶
- D. 口服糖皮质激素
- E. 胸腔内注射尿激酶

正确答案：(A)

得分：1

57. 闭合性颅脑损伤早期治疗的要点是

- A. 防止休克
- B. 防止癫痫
- C. 气管切开
- D. 控制水入量
- E. 防止脑水肿和颅内血肿

正确答案：(E)

得分：1

58. 关于慢性鼻窦炎的鼻窦炎症说法错误的是

- A. 鼻窦炎症持续超过3天以上即为慢性鼻窦炎
- B. 慢性鼻窦炎主要表现为鼻塞、脓涕、嗅觉减退，头痛多不明显或为钝痛，偶有眼部并发症如视力减退或失明
- C. 鼻黏膜呈慢性充血、肿胀、肥厚
- D. 中鼻甲肥大或息肉样变，中鼻道狭窄、黏膜水肿或息肉形成
- E. 前组鼻窦炎时，中鼻道可见有脓性分泌物流出，后组鼻窦炎脓液可位于嗅裂或蓄积于鼻腔后端流入鼻咽部

正确答案：(A)

得分：1

59. 有关淋病和梅毒的治疗，下列错误的是

- A. 头孢曲松钠对淋菌性咽炎疗效较好
- B. 妊娠期梅毒用喹诺酮类和四环素类药物
- C. 新生儿淋菌性眼炎的治疗中单剂头孢曲松钠的剂量不能超过125mg
- D. 淋菌性脑膜炎的疗程应满2周，心内膜炎的疗程应满4周
- E. 治疗淋球菌性盆腔炎时，除应用头孢曲松钠外，还同时口服甲硝唑或多西环素

正确答案：(B)

得分：1

60.

24

A.300 ml

B.400 ml

C.500 ml

D.600 ml

E.700 ml

正确答案：(C)

得分：1

61. 引起慢性肾衰竭的最常见继发性肾脏病是

A.乙肝相关性肾炎

B.淀粉样变肾病

C.糖尿病肾病

D.良性肾小动脉硬化

E.系统性红斑狼疮

正确答案：(C)

得分：1

62. 关于子宫下段的说法错误的是

A.临产后长达7~10cm

B.由非妊娠时的子宫峡部伸展形成

C.位于宫颈内口与外口之间

D.临产后是软产道的一部分

E.至妊娠晚期形成

正确答案：(C)

得分：0

63. 关于菌痢的病理改变，不正确的是

A.病变主要累及乙状结肠和直肠

B.急性期肠黏膜基本病变是渗出性炎症

C.病变通常可侵犯黏膜肌层

D.中毒性菌痢肠道病变多轻微

E.慢性期可有肠壁增厚、息肉形成

正确答案：(C)

得分：0

二、A2型题（每题1.0分，共87.0分）

64. 肘伤后肿痛、活动障碍48小时。查体见肘关节半屈位，肿胀重，压痛重，手指主动活动丧失，桡动脉搏动弱，手指凉、麻木，X线片示肱骨髁上骨折，移位重，应诊断为肱骨髁上骨折合并

A.广泛软组织挫伤

B.主要浅表静脉破损

C.桡、尺、正中神经损伤

D.肱动脉损伤

E.肌肉断裂

正确答案：(D)

得分：0

65. 成年男尸，双肾明显缩小，表面呈细颗粒状，质硬，切面皮质明显变薄。病理诊断最大

- A.慢性肾盂肾炎
- B.膜性肾炎(dbs)
- C.膜性增生性肾炎
- D.慢性硬化性肾炎
- E.IgA 肾病

正确答案：(D)

得分：1

66. 女性，58岁，5年前诊断为肝硬化，近日来进行性消瘦，面色晦暗，皮肤黄染，肝区疼痛，肝剑突下4.5cm，质硬，表面可触及大结节，有腹水，下肢浮肿。应诊断为

- A.肝血管瘤
- B.胆汁性肝硬化
- C.坏死后性肝硬化
- D.门脉性肝硬化
- E.肝硬化合并肝癌

正确答案：(E)

得分：1

67. 中年女性，1年前有流产史。现阴道流血不止，严重贫血外观，子宫体积增大。近来咳嗽、咯血。最可能的诊断是

- A.肺癌
- B.肺结核
- C.子宫绒毛膜癌
- D.葡萄胎
- E.子宫内膜癌

正确答案：(C)

得分：1

68. 男性，60岁。多饮多尿2周，神志不清1天，有脱水表现，测血糖40.3 mmol/L，血尿素氮42.9 mmol/L，血钠170 mmol/L，尿酮体阴性。对此患者宜采取的措施是

- A.大剂量胰岛素+等渗盐水
- B.小剂量胰岛素+等渗盐水
- C.大剂量胰岛素+低渗盐水
- D.小剂量胰岛素+低渗盐水
- E.小剂量胰岛素+低渗盐水+碳酸氢钠

正确答案：(D)

得分：1

69. 男性患者，38岁，腰痛伴左下肢放射痛15天。查体：下腰椎旁压痛，左下肢直腿抬高试验阳性，加强试验阳性，左侧小腿外侧及足背内侧皮肤感觉减弱，左侧伸（足母）肌力减弱，考虑为腰椎间盘突出症，最可能的节段为

- A.L<sub>4-5</sub>
- B.L<sub>5</sub>~S<sub>1</sub>
- C.L<sub>1-2</sub>
- D.L<sub>2-3</sub>
- E.L<sub>3-4</sub>

正确答案：(A)

1

70. 女，55岁。咳嗽、咳脓血痰伴高热2天，糖尿病病史8年。胸部X线片示双肺多发团片状阴影，有空洞形成。查体：背部可见多个疖肿，双肺少量湿啰音，心腹未见异常。最可能的诊断为

- A.肺结核
- B.血源性肺脓肿
- C.肺炎克雷伯菌肺炎
- D.大肠埃希菌肺炎
- E.军团菌肺炎

正确答案：(B)

得分：1

71. 患者，女性，28岁，发热1周，每天午后开始发热，最高体温达39.6℃，次日晨可降至37.7℃。该患者的热型是

- A.稽留热
- B.间歇热
- C.弛张热
- D.回归热
- E.不规则热

正确答案：(C)

得分：1

72. 患者，女，48岁，近2年来月经周期紊乱，经期长短不一，经量时多时少。诊断性刮宫示子宫内膜简单型增生过长，诊断为围绝经期无排卵性功血。治疗措施不妥的是

- A.治疗原则是止血、调整周期、防止子宫内膜病变
- B.可用小剂量单一雌激素治疗
- C.急性大出血时可通过刮宫快速有效止血
- D.补充钙剂
- E.可采取雌孕激素合并疗法

正确答案：(B)

得分：1

73. 女性，24岁，多饮、多食10年，空腹血糖经常大于10.8mmol/L。近2个月来眼睑及下肢轻度水肿，血压160/100mmHg，尿蛋白(++)。最可能的诊断为

- A.高血压病
- B.糖尿病肾病
- C.糖尿病合并肾盂肾炎
- D.糖尿病合并膀胱炎
- E.糖尿病合并心功能不全

正确答案：(B)

得分：1

74. 患者，女，26岁，产后40天出现乳房红肿疼痛3天，伴寒战，发热，无局部皮肤溃烂，疼痛呈搏动性。体格检查：T38.8℃，P98次/分，R23次/分，BP130/80mmHg，右乳腺明显肿大，变硬，有压痛，可及3.0cm×4.0cm肿块，局部皮肤红肿热痛，乳头无脓性分泌物，未及波动感。患者最有可能的诊断是下列哪项

- A.乳腺纤维腺瘤
- B.乳腺结核

- D.乳腺癌
- E.乳腺囊肿病

正确答案：(C)

得分：1

75. 男性，45岁。因右足第一跖趾关节肿痛1天就诊，经检查确诊为痛风，给予非甾体抗炎药及秋水仙碱治疗疼痛缓解不明显。考虑的治疗是

- A.别嘌醇
- B.糖皮质激素
- C.苯溴马隆
- D.丙磺舒
- E.碳酸氢钠

正确答案：(B)

得分：1

76. 男性，74岁。渐进性乏力伴面色苍白2个月。查体为贫血貌，有反甲，巩膜无黄染，浅表淋巴结无肿大，心率102次/分，肝脾肋下未触及。血常规Hb 79g/L，RBC  $2.82 \times 10^{12}/L$ ，MCV 78fl，WBC  $5.0 \times 10^9/L$ ，血小板  $220 \times 10^9/L$ ，首先考虑

- A.缺铁性贫血
- B.再生障碍性贫血
- C.海洋性贫血
- D.巨幼细胞贫血
- E.溶血性贫血

正确答案：(A)

得分：1

77. 糖尿病患者空腹血糖14mmol/L，尿酮体(+)，尿蛋白(++)，最适合的治疗是

- A.双胍类降糖药
- B.磺脲类降糖药
- C.双胍类+磺脲类降糖药
- D.单纯饮食治疗
- E.胰岛素

正确答案：(E)

得分：1

78. 患者，女性，60岁。因车祸致严重面部创伤1小时入院，半小时前出现反应迟钝，呼吸40次/分，在使用高流量面罩给氧的情况下查血气示pH7.22，PaCO<sub>2</sub>67mmHg，PaO<sub>2</sub>55mmHg，值班医师决定建立人工气道并使用呼吸机，你认为这种情况下最佳的方式是

- A.纤支镜经鼻插管
- B.颈圈固定后经口插管
- C.环甲膜切开术
- D.经口插管
- E.紧急气管切开

正确答案：(E)

得分：1

79. 患者，男性，50岁。突然发冷、发热，咳嗽，咳脓性痰，痰黏稠带血。白细胞  $18 \times 10^9/L$ ，经青霉素治疗无效。X线见右上肺大片实变影，叶间隙下坠。诊断可能为

**B.克雷伯杆菌肺炎**

C.葡萄球菌性肺炎

D.肺结核

E.渗出性胸膜炎

正确答案：(B)

得分：1

80. 男，31岁。精神分裂症急性发作入院，因兴奋躁动、敌对攻击严重，给予氟哌啶醇5mg一天2次肌肉注射。次日患者出现双眼上翻、斜颈、面肌痉挛、角弓反张。此时首选的处理方法是

**A.立即停药**

B.口服普萘洛尔

C.口服苯二氮草药物

D.电抽搐治疗

E.肌肉注射东莨菪碱

正确答案：(E)

得分：0

81. 患儿，女，7岁。1月前患急性扁桃体炎，近10天不规则发热、咳嗽，咳粉红色泡沫痰，下肢水肿，抗“O”增高。应诊断为

A.急性大叶性肺炎

B.风湿性心脏病，左心衰

C.风湿性心脏病，右心衰

**D.风湿性心脏病，全心衰**

E.肺淤血

正确答案：(D)

得分：1

82. 某地因工业事故，使多人一氧化碳中毒，其中昏迷者被送到医院。此时最有效的抢救措施是

A.鼻导管吸氧

B.20%甘露醇快速静脉滴注

C.亚冬眠治疗

**D.高压氧治疗**

E.血液透析

正确答案：(D)

得分：1

83. 女，25岁。妊娠37周，G<sub>1</sub>P<sub>0</sub>，因羊膜破裂入院待产。既往身体健康，无传染病及遗传性疾病史，分娩过程顺利，产一男婴7斤重。分娩后突然出现呼吸困难、发绀、抽搐、休克死亡。最可能发生的是

A.血栓形成

B.空气栓塞

C.脂肪栓塞

D.心肌梗死

**E.羊水栓塞**

正确答案：(E)

1

84. 患者发热、乏力、食欲不振、腹痛，以左下腹明显，腹泻，早期稀便，后期为粘液脓血便，并有里急后重感。应诊断为

- A.急性肠炎
- B.消化不良性腹泻
- C.肠结核
- D.食物中毒
- E.急性细菌性痢疾

正确答案：(E)

得分：1

85. 男，68岁。间断咳嗽5年。近1年来自觉长距离行走时感气短，休息后可好转，否认呼吸系统疾病及心脏病史。查体未见明显异常。血常规及胸部X线片检查大致正常。为明确诊断，应首先进行的检查是

- A.UCG
- B.胸部CT
- C.肺功能
- D.动脉血气分析
- E.D-二聚体

正确答案：(C)

得分：0

86. 休克患者经扩容后，测中心静脉压 $20\text{cmH}_2\text{O}$ ，血压 $80/50\text{mmHg}$ 。应考虑

- A.血容量严重不足
- B.动-静脉短路开放
- C.心功能不全
- D.容量血管收缩过度
- E.容量血管扩张过度

正确答案：(C)

得分：1

87. 男孩，5岁。咳嗽4个月，凌晨及活动后加剧，服用多种抗生素无效，服用特布他林后有缓解。查体：无发热，面及颈部散在湿疹。两肺呼吸音粗。该患儿最可能的诊断是

- A.毛细支气管炎
- B.支气管异物
- C.咳嗽变异性哮喘
- D.支气管淋巴结核
- E.儿童哮喘

正确答案：(C)

得分：1

88. 62岁男性患者，既往健康，最近4个月出现乏力加重，活动后气短，近1个月自觉腹部不适；体格检查发现颈部无压痛性淋巴结肿大，肝脏右肋下 $15\text{cm}$ 可触及，脾脏吸气时左肋缘下 $3\text{cm}$ 可触及；实验室检查：WBC  $23.1 \times 10^9/\text{L}$ ，分叶核 $16\%$ ，杆状核 $2\%$ ，淋巴细胞 $78\%$ ，单核细胞 $4\%$ ；Hb  $11.9\text{g/dL}$ ，Hct  $36\%$ ，MCV  $90$ ，血小板计数  $277\ 300/\mu\text{l}$ 。Coombs 直接实验阳性，以下诊断可能性最大的是

- A.类白血病反应
- B.慢性髓系白血病

D.急性淋巴细胞白血病

E.慢性淋巴细胞白血病

正确答案：(E)

得分：1

89. 患儿5岁，半年来全身逐渐水肿，食欲减退，有时恶心呕吐，尿少。查：尿蛋白(++)，血浆蛋白减少为15g/L，血胆固醇升高为13mmol/L。此病例临床表现属于

A.急性肾炎综合征

B.快速进行性肾炎综合征

C.肾病综合征

D.慢性肾炎综合征

E.肺出血-肾炎综合征

正确答案：(C)

得分：1

90. 患者男性，21岁，出现转移性右下腹部疼痛4小时，伴体温升高、呕吐等表现，最可能的诊断是

A.慢性胃溃疡

B.慢性十二指肠溃疡

C.大肠癌

D.胃癌

E.急性阑尾炎

正确答案：(E)

得分：1

91. 有一名中年妇女，患高血压病，心前区不适感，与其丈夫吵架后，出现头痛晕厥，急送医院途中死亡，家属拒绝解剖。引起患者死亡的可能性最大的病变是

A.心肌梗死

B.胰腺炎

C.脑出血

D.中毒

E.心力衰竭

正确答案：(C)

得分：1

92. 男，65岁。大量饮酒30年，临床诊断肝硬化失代偿期。近期性格有改变，对评估病情最重要的临床表现是

A.肝掌加深

B.脾进行性增大

C.计算能力下降

D.尿量变少

E.牙龈出血

正确答案：(C)

得分：0

93. 男，28岁。少尿、水肿1月余，7岁时曾发现尿蛋白阳性。血压180/120mmHg，尿蛋白(-)，红细胞5~10/HP，白细胞3~5/HP，BUN 30mmol/L，血肌酐860μmol/L，血红蛋白65g/L。初步诊断为

- B.高血压肾病
- C.肾病综合征
- D.慢性肾盂肾炎，肾功能不全
- E.慢性肾小球肾炎，肾功能不全

正确答案：(E)

得分：1

94. 男，32岁。发热、腹泻3个月，大便每天7~10次，稀便，无脓血及黏液。有吸毒史2年。查体：体温37.5℃，消瘦，神志清楚，肛门周围可见疱疹。实验室检查：粪便镜检偶见白细胞。为明确诊断，最重要的检查是

- A.抗单纯疱疹病毒 IgM
- B.抗 EBV IgM
- C.结核抗体
- D.抗 CMV IgM
- E.抗 HIV

正确答案：(E)

得分：1

95. 一患者需要大声唤醒，醒后可简单回答问题及勉强配合检查，停止刺激后即入睡，这种意识状态是

- A.嗜睡
- B.昏睡
- C.昏迷
- D.谵妄
- E.意识模糊

正确答案：(B)

得分：0

96. 男性，57岁，诊断肺癌，出现肌肉松弛，眼球震颤，小脑性运动失调，最可能的癌细胞类型为

- A.鳞状上皮细胞癌
- B.大细胞未分化癌
- C.小细胞未分化癌
- D.腺癌
- E.细支气管-肺泡癌

正确答案：(C)

得分：1

97. 患者，女，30岁。月经量增多、牙龈出血伴头晕、心悸1年。查体见双下肢散在瘀斑，肝脾肋下未触及。实验室检查：Hb 65g/L，RBC  $2.1 \times 10^{12}/L$ ，WBC  $3.1 \times 10^9/L$ ，Plt  $35 \times 10^9/L$ ，网织红细胞0.005。骨髓穿刺检查：骨髓有核细胞减少，淋巴细胞占33%，粒系及红系减少，巨核细胞明显减少。骨髓铁染色细胞外铁(+++)。本例最可能的诊断是

- A.急性白血病
- B.再生障碍性贫血
- C.巨幼细胞性贫血
- D.缺铁性贫血
- E.原发性免疫性血小板减少症

得分：1

98. 男，8岁，母有哮喘史。患儿自幼对花粉过敏，反复发作喘息4次以上，昨日又突发喘息，查两肺满布哮鸣音，皮下注射肾上腺素后，哮鸣音明显减少。对该患儿紧急处理最有效的是

- A. 甘露醇
- B. 美托洛尔
- C. 苯巴比妥
- D. 氢化可的松
- E. 氨茶碱

正确答案：(D)

得分：1

99. 患者男，40岁，曾患风湿性心内膜炎，近日发热，白细胞增高，皮肤黏膜有出血点，住院治疗，医嘱绝对卧床休息。今晨患者自行起床，突感头痛，呕吐，左下肢麻木，倒地死亡。该患者最可能的死因是

- A. 心肌梗死
- B. 脑出血
- C. 脑动脉栓塞
- D. 肺动脉栓塞
- E. 肺炎

正确答案：(C)

得分：1

100. 女性，20岁。间断上腹痛3年，加重1周，3小时前出现呕吐暗红色血液，量约1000ml。查体：血压95/65mmHg，脉搏102次/min。首选治疗为

- A. 急诊胃镜检查
- B. 给予升压药物
- C. 外科手术治疗
- D. 血管造影
- E. 输血、补液、纠正血容量不足

正确答案：(E)

得分：1

101. 女婴，4个月，因受凉后突然喘憋急诊入院。入院体检：T 37.5℃，烦躁，气促。口周发绀，心率196次/分。心音被响亮的哮鸣音掩盖，吸气末少量中细湿性啰音。腹软，肝肋下2cm，剑下2cm，上界第6肋间，脾未触及。WBC 9.8×10<sup>9</sup>/L，N 0.5，以下诊断可能性最大的是

- A. 金黄色葡萄球菌肺炎
- B. 腺病毒肺炎
- C. 白色念珠菌性肺炎
- D. 呼吸道合胞病毒肺炎
- E. 肺炎支原体肺炎

正确答案：(D)

得分：1

102. 男，65岁。平时有高血压、糖尿病多年。一天前发现左侧上、下肢活动受限，吐词不清，神志清楚。无明显头痛、呕吐。检查发现左侧上、下肢肌力3级，左半身痛觉减退。临

- A.脑出血
- B.脑栓塞
- C.短暂性脑缺血发作
- D.蛛网膜下腔出血
- E.脑血栓形成

正确答案：(E)

得分：1

103. 老年患者，既往无心肺基础疾病。因下肢静脉曲张入院手术治疗，卧床一周，在与老伴散步时突然出现面色青紫，呼吸急促，最可能的原因是

- A.继发严重的肺部感染
- B.医院空气过敏
- C.突发冠心病
- D.肺动脉血栓形成
- E.肺动脉血栓栓塞

正确答案：(E)

得分：1

104. 男性，51岁。十二指肠球部溃疡病史6年，未系统治疗。3小时前大量饮酒后出现上腹部烧灼感，恶心，呕吐暗红色血，量约1000ml，排柏油样便共约300ml。查体：血压80/40mmHg，脉搏122次/min，神志清楚，巩膜无黄染，结膜苍白，腹平软，无压痛，肠鸣音8次/min。该患者首选的治疗是

- A.急诊胃镜检查
- B.手术治疗
- C.输血补液
- D.法莫替丁
- E.三腔二囊管

正确答案：(C)

得分：1

105. 女性，33岁。与4岁儿子一同居住，因发热流涕3天、皮疹2天前来就诊。查体：T 39°C，R 35次/分，BP 90/60 mmHg，双侧近第1臼齿颊黏膜上见0.5~1 cm白色小点，周围有红晕，互相融合，眼球结膜充血、畏光，咽充血，头面部、颈部皮肤见淡红色斑丘疹，躯干部皮肤见出血点样皮疹及红色斑丘疹，双肺呼吸音粗，未闻及啰音，心律齐，腹平软。应询问的病史不包括

- A.是否接种麻疹疫苗
- B.病前3周内是否接触过麻疹患者
- C.是否患过麻疹
- D.其儿子有无类似症状
- E.是否接种卡介苗

正确答案：(E)

得分：1

106. 某患者血氧检查为：血氧容量12 ml/dl，动脉血氧含量为11.4 ml/dl，氧分压100 mmHg (13.3 kPa)，动静脉氧差3.5 ml/dl，患下列哪一种疾病的可能性最大

- A.慢性支气管炎
- B.急性呼吸窘迫综合征

- D.慢性阻塞性肺疾病
- E.慢性充血性心力衰竭

正确答案：(C)

得分：0

107. 男，20 岁。汽车肇事致小腿开放性骨折，局部出血，在现场运送途中，止血宜首选哪种方法

- A.止血带
- B.局部压迫包扎
- C.指压出血血管
- D.抬高伤肢
- E.结扎出血血管

正确答案：(B)

得分：1

108. 患者，女性，30 岁，剖宫产后 3 周，出现乳房肿胀，局部硬结，进而红、肿、热、压痛。考虑哪种疾病的可能性大

- A.乳房结节
- B.慢性乳腺炎
- C.急性乳腺炎
- D.乳腺增生
- E.乳腺癌

正确答案：(C)

得分：1

109. 女，10 岁，主诉咽痛、高热三天伴膝关节红肿、疼痛入院。查扁桃体红肿化脓，咽拭子经血平板培养出现无色透明溶血环，抗“O”试验阳性。引起感染的病原体可能是

- A.金黄色葡萄球菌
- B.甲型溶血性链球菌
- C.乙型溶血性链球菌
- D.肺炎链球菌
- E.脑膜炎奈瑟菌

正确答案：(C)

得分：0

110. 女性，35 岁。诊断甲亢后即行甲状腺次全切手术，术后患者出现高热，心率 160 次/分，烦躁不安，大汗淋漓，腹泻，应首先考虑的诊断是

- A.甲亢症状加重
- B.甲亢术后感染
- C.甲亢危象
- D.甲亢危象前期
- E.甲亢术后感染性腹泻

正确答案：(C)

得分：1

111. 患者，男，35 岁，农民。因发热 6 天，少尿 3 天入院。患者于 1 月 5 日突然高热，最高体温 39.8℃，伴恶心，腹痛，曾排水样便 6 次，自服“感冒药”，症状未见好转。3 天前尿量减少，昨日尿量仅 300ml。入院查体：体温 37.0℃，颜面、结膜、前胸皮肤充血明显，臀

16 10g/L

9/L

尿蛋白(+++), 血 BUN 30.7mmol/L, 血 K<sup>+</sup> 6.6 mmol/L。心电图示心率 48 次/分, 高尖 T 波。

该患者最可能的诊断是

- A. 流行性脑脊髓膜炎
- B. 流行性乙型脑炎
- C. 败血症
- D. 肾综合征出血热
- E. 钩端螺旋体病

正确答案: (D)

得分: 1

112. 男, 10 岁。发现眼睑水肿 3 天, 尿如深茶色 1 天, 病前 3 周曾患皮肤脓疱疮。查体: 血压 130/90mmHg, 心率 110 次/分, 肝于右肋下 1cm, 有压痛, 双下肢轻度凹陷性水肿。目前首选的治疗措施是给予

- A. 限盐
- B. 青霉素
- C. 呋塞米
- D. 氢氯噻嗪
- E. 卡托普利

正确答案: (C)

得分: 0

113. 男, 1 岁, 智能落后, 表情呆滞, 鼻梁低, 舌宽大并常伸出口外, 皮肤苍黄、粗糙, 四肢粗短, 腱反射减弱。最可能的诊断是

- A. 唐氏综合征 (21-三体综合征)
- B. 软骨发育不良
- C. 先天性甲状腺功能减低症
- D. 佝偻病
- E. 苯丙酮尿症

正确答案: (C)

得分: 1

114. 男性患者 5 年前因甲亢作手术治疗近半年甲亢复发, 甲状腺肿大 II°, <sup>131</sup>I 甲状腺扫描显示结节摄碘功能良好。治疗应选择方案是

- A. 抗甲状腺药物治疗
- B. 复方碘液治疗
- C. 外科手术治疗
- D. 放射性 <sup>131</sup>I 治疗
- E. 中药+针灸治疗

正确答案: (D)

得分: 0

115. 患者男性, 48 岁, 长期反复发作的嗝气、反酸、中上腹疼痛。胃镜检查, 见胃小弯侧胃窦部一直径 1.2cm 溃疡, 溃疡底部平坦, 边缘整齐, 溃疡周围黏膜向溃疡集中, 最可能的诊断是

- A. 慢性胃溃疡癌变
- B. 溃疡型胃癌
- C. 慢性胃溃疡

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/367020156066006041>