

2021-2022 护师类之护师（初级）精选试题及答案一

单选题（共 80 题）

1、患者，女，26 岁。夜间急诊入院，表情痛苦，呼吸急促，伴有鼻翼扇动，口唇疱疹，面色潮红，体温 39℃。该患者属于

- A. 急性病容
- B. 慢性病容
- C. 病危病容
- D. 休克病容
- E. 恶性病容

【答案】 A

2、患者，男性，28 岁，与女友争吵后服大量毒药，药名不详，立即急诊入院。胃管插入后第一步是

- A. 导泻
- B. 问病人服的是何种药物
- C. 抽取毒物立即送检
- D. 先灌入生理盐水
- E. 先催吐

【答案】 C

3、已使用过的隔离衣外面属于（ ）。

- A. 污染区
- B. 清洁区
- C. 半污染区

D. 半清洁区

E. 无菌区

【答案】 A

4、某产妇，26岁，第一胎足月临产14小时，肛查：宫口开全，胎膜已破，左枕前位。胎头刚开始“拨露”，胎心140次/分。首要的护理措施是

A. 指导产妇正确使用腹压

B. 给产妇吸氧

C. 胎心监护

D. 消毒外阴

E. 准备接生

【答案】 A

5、患者，男性，50岁。因肝硬化食管静脉曲张、腹水入院治疗。放腹水后出现意识不清，呼之不醒，但压迫其眶上神经仍有痛苦表情。此时患者可能处于肝性脑病的

A. 前驱期

B. 昏迷期

C. 昏睡期

D. 浅昏迷期

E. 深昏迷期

【答案】 D

6、II度营养不良患儿的体重低于正常均值的

A. 25%~35%

- B. 25%~40%
- C. 50%以上
- D. 10%~20%
- E. 5%~10%

【答案】 B

7、观察休克病情变化简便而有效的指标是

- A. 精神状态
- B. 脉搏
- C. 尿量
- D. 中心静脉压
- E. 血压

【答案】 C

8、等渗性脱水血清钠的浓度为

- A. <130mmol/L
- B. 130~150mmol/L
- C. 140~160mmol/L
- D. 160~180mmol/L
- E. 180~200mmol/L

【答案】 B

9、颈部淋巴结清扫术指导患者锻炼应

- A. 进行握拳、屈肘、屈腕、上举或肩关节活动范围的锻炼

- B. 应加强患侧手臂上举及肩关节活动的锻炼，注意纠正肩下垂
- C. 伤口愈合后应开始进行肩关节及颈活动范围的锻炼，随时保持术侧肩略高于健侧
- D. 要求术后两周达到术侧手臂能越过头顶摸到对侧耳朵
- E. 进行全身关节的功能锻炼

【答案】 C

10、特布他林属于

- A. β_1
- B. β_2
- C. 抗胆碱能药
- D. 糖皮质激素
- E. 肥大细胞膜稳定剂

【答案】 A

11、孕妇，29岁，双胎妊娠，37周分娩。产后1小时余，阴道出血100ml，挤压宫底排出血块约200ml后，子宫轮廓不清，测血压110 / 70mmHg，首先需给的处理是

- A. 输血补液
- B. 检查软产道
- C. 应用子宫收缩剂
- D. 阴道填塞纱布条
- E. 查血小板量和出凝血时间

【答案】 C

12、小儿补液原则为（ ）。

- A. 先慢后快，先糖后盐，先浓后淡，见尿补钾，防惊补钙
- B. 先快后慢，先糖后盐，先浓后淡，见尿补钾，防惊补钙
- C. 先快后慢，先盐后糖，先浓后淡，见尿补钾，防惊补钙
- D. 先慢后快，先盐后糖，先浓后淡，见尿补钾，防惊补钙
- E. 先快后慢，先盐后糖，先淡后浓，见尿补钾，防惊补钙

【答案】 C

13、患者，女性，70岁。有高血压病史25年，突然出现剧烈头痛伴左侧上下肢瘫痪，诊断为“脑出血”。此时正确的护理措施是

- A. 头部热敷
- B. 补充血容量
- C. 去枕平卧位
- D. 发病48小时内避免搬动
- E. 12小时后给予鼻饲流质饮食

【答案】 D

14、对轻症中暑者应给予

- A. 静脉注射生理盐水
- B. 物理降温
- C. 药物降温
- D. 阴凉通风处休息，饮清凉饮料
- E. 吸氧3~5L/min

【答案】 D

15、对张力性气胸的现场抢救，首先应

- A. 立即排气减压
- B. 立即封闭伤口
- C. 气管切开
- D. 镇静止痛
- E. 闭式胸膜腔引流

【答案】 A

16、手足搐搦症患儿最危险的症状是

- A. 惊厥
- B. 手足搐搦
- C. 喉痉挛
- D. 夜惊
- E. 烦躁

【答案】 C

17、肾性水肿早期常发生于

- A. 眼睑
- B. 下肢
- C. 尾骶部
- D. 背部
- E. 髋部

【答案】 A

18、急性主动脉夹层动脉瘤患者最典型的胸痛性质是（ ）。

- A. 压榨性疼痛
- B. 撕裂性剧痛
- C. 窒息样疼痛
- D. 针刺样疼痛
- E. 刀割性疼痛

【答案】 B

19、风湿热最严重的临床表现是

- A. 关节炎
- B. 心脏炎
- C. 皮下结节
- D. 环形红斑
- E. 舞蹈病

【答案】 B

20、患者在上班途中发生车祸，当即昏迷，持续时间约 30 分钟，醒后主诉有轻微头痛，四肢活动好，次日感到头痛加重，呕吐数次，嗜睡而就诊，最恰当的处理方式是

- A. 给予止呕处理，休息 1 周
- B. 给予镇痛处理，休息 1 周
- C. 给予脱水利尿治疗，同时进一步检查
- D. 立即行脑室穿刺外引流术
- E. 给予口服脱水、利尿药随诊

【答案】 C

21、静脉滴入氯化钾溶液时，临床观察应注意的是

- A. 肠鸣音
- B. 尿量
- C. 呼吸
- D. 心率
- E. 神志

【答案】 B

22、甲状腺危象最主要的表现是

- A. 高热 $>39^{\circ}\text{C}$ ，脉快 >120 次/分、大汗、腹泻
- B. 心率快、呕吐、腹泻
- C. 高热 $>39^{\circ}\text{C}$ ，呕吐、腹泻、呼吸困难
- D. 心悸、大汗、呼吸困难
- E. 面色苍白、出冷汗、呼吸困难

【答案】 A

23、结核性腹膜炎可查出移动性浊音是当腹水量超过

- A. 400ml
- B. 600ml
- C. 800ml
- D. 1000ml
- E. 1200ml

【答案】 D

24、体外冲击波碎石适用于结石直径小于

- A. 1cm
- B. 1.5cm
- C. 2cm
- D. 2.5cm
- E. 3cm

【答案】 D

25、心肺复苏初期，首先恢复的是（ ）。

- A. 体温
- B. 血压
- C. 呼吸
- D. 心搏
- E. 皮肤

【答案】 D

26、患儿，1岁半。发热、流涕成，今日外耳道流出少量脓性分泌物，考虑为中耳炎。小儿易患中耳炎的原因是（ ）。

- A. 后鼻道狭窄
- B. 鼻腔相对较小
- C. 鼻窦口相对较大
- D. 咽鼓管宽、短、直

E. 喉部较长，呈漏斗状

【答案】 D

27、患者男性，32岁，在10米高处维修电缆时不幸触电摔落地面。患者神志不清，血压96/60mmHg，心率60次/分，头部肿胀明显，颈部有严重的青紫瘀血。为使病人安全，现场为有效保证病人呼吸道通畅可应用

A. 气管插管

B. 托下颌法

C. 协助病人取侧卧位

D. 协助病人取平卧位，头偏向一侧

E. 气管切开

【答案】 B

28、下列关于乳房脓肿的处理不当的是

A. 脓肿切开引流

B. 切口呈放射状

C. 乳晕部做放射状切口

D. 分离脓肿的多房间隔以利引流

E. 深部脓肿在乳房下缘做弓形切口

【答案】 C

29、1岁小儿因呕吐、腹泻5天，4个小时无尿入院。体检：重度脱水貌，四肢凉，首选的措施是

A. 快速滴注2:1等张含钠液20ml/kg

B. 快速滴注生理盐水20ml/kg

- C. 快速滴注 5%碳酸氢钠 20ml/kg
- D. 快速滴注 1/2 张含钠液 20ml/kg
- E. 快速滴注 5%葡萄糖液 20ml/kg

【答案】 A

30、护士在静脉注射氨茶碱速度过快时，患者可能会出现下列哪种问题

- A. 呼吸减慢
- B. 心律失常、血压下降
- C. 尿量减少
- D. 胃肠道不适
- E. 皮疹

【答案】 B

31、先天性心脏病出现下半身青紫，应考虑为

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 二尖瓣狭窄

【答案】 C

32、患儿男，1岁。发热2天伴抽搐入院。入院 T39℃，前囟紧张，治疗2天效果不明显，今日出现烦躁、易激惹，呼吸急促，60次/分，血气分析异常，pH下降，诊断为呼吸衰竭，最有效的治疗措施是

- A. 物理降温

- B. 给呼吸兴奋剂及血管活性药物
- C. 注射镇静剂，防止惊厥
- D. 密切监测生命体征
- E. 禁食

【答案】 B

33、患者女，51岁。尿频2个月余，今日出现尿频加重，伴尿急，尿痛。有米汤样尿液和血尿史。曾应用抗生素治疗无好转，尿液检查尿呈酸性，伴有脓细胞；连查三次晨尿结核菌均为阳性。X线示左肾钙化；逆行肾盂造影示左肾肾盏、肾盂不规则扩大、变形，有空洞形成。右侧肾脏无异常。口服抗结核药物3周后，经充分术前准备行左肾切除术。术后护理错误的是（ ）。

- A. 继续口服抗结核药物1个月
- B. 卧床7~14天后，减少活动
- C. 连续3天准确记录24小时尿量
- D. 观察第一次排尿的时间、尿量及颜色
- E. 保持引流通畅，观察引流液的性质及量

【答案】 A

34、下列哪种疾病可呕吐宿食

- A. 急性胃炎
- B. 急性胰腺炎
- C. 幽门梗阻
- D. 胃溃疡
- E. 肠梗阻

【答案】 C

35、肾性水肿早期常发生于

- A. 眼睑
- B. 下肢
- C. 尾骶部
- D. 背部
- E. 髋部

【答案】 A

36、绒毛膜癌合并脑转移抽搐的患者，床头必备物品为

- A. 导尿包
- B. 吸氧用药
- C. 静脉输液用物
- D. 开口器
- E. 气管切开包

【答案】 D

37、在原发性高血压的发病机制中占主导地位的是

- A. 胰岛素抵抗
- B. 内分泌异常
- C. 血管内皮功能异常
- D. 高级神经中枢功能失调
- E. 肾素-血管紧张素系统异常

【答案】 D

38、进行内生肌酐清除率检查前 3 日的饮食是

- A. 高热量饮食
- B. 高蛋白饮食
- C. 无肌酐饮食
- D. 多纤维素饮食
- E. 正常饮食

【答案】 C

39、患者，男性，40 岁。车祸后 3 小时入院。查体：下腹部疼痛，少量肉眼血尿。置导尿管顺利，注水试验提示出水量差异很大。应考虑为

- A. 肾损伤
- B. 输尿管损伤
- C. 膀胱损伤
- D. 前尿道损伤
- E. 后尿道损伤

【答案】 C

40、猩红热帕氏线多见于

- A. 腹股沟、肘窝
- B. 面部
- C. 颈部
- D. 口周
- E. 胸部

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/367021153026006040>