

姓名：                      科室：                      得分：

一、单选题 1、骨关节炎的早期治疗，不正确的是

- A. 物理因子治疗
- B. 药物治疗
- C. 关节镜手术
- D. 关节置换术
- E. 关节松动术

2、对徐动性脑瘫患儿需强调的练习活动是

- A. 做大范围有控制的活动
- B. 手指协调性活动
- C. 中线活动
- D. 肢体力量性练习的活动
- E. 肢体耐力性练习的活动

3、精子达到功能上成熟的器官是

- A. 睾丸
- B. 附睾
- C. 输精管
- D. 精囊

4、男性，42岁。9个月前外伤致肱骨干骨折，采取手法复位，夹板外固定治疗。现检查发现肱骨干骨折部位有反常活动。X线检查示骨折线存在，断端有0.4cm的间隙，断端骨髓腔已封闭硬化。目前，治疗方法宜采取

- A. 改为石膏外固定
- B. 手术切除硬化骨，钢板固定，植骨，加外固定
- C. 继续夹板固定
- D. 改为牵引固定
- E. 手术切除硬化骨，钢板固定加外固定

5、45岁，女性。反复腹痛、发热、黄疸1年，近3天上述症状加重，高热黄疸不退。入院体温40℃，脉搏120次/分，血压70/50 mmHg 该患者首选的治疗为

- A. 大剂量抗生素治疗感染后择期手术
- B. 全胃肠外营养后手术
- C. 立即手术
- D. 积极抗休克同时及早手术
- E. 应用血管收缩剂，血压升至正常后及早手术

6、3500g 足月儿，顺产，发生硬膜下出血，最可能的原因是

- A. 产钳助产
- B. 出生时 Apgar 评分 4 分
- C. 出生后血压波动大
- D. 母有绒毛膜羊膜炎
- E. 机械通气

7、细胞毒素类抗肿瘤药物是

- A. 甲氨蝶呤
- B. 阿霉素
- C. 环磷酰胺
- D. 喜树碱
- E. 秋水仙碱

8、脑卒中患者从卧位坐起时常见的问题不包括

- A. 患侧屈髋屈膝困难
- B. 患侧肩带前伸困难
- C. 患侧颈和躯干侧屈力弱
- D. 患侧伸髋伸膝困难
- E. 坐起时常用健腿钩拉患腿

9、下列不属于实证表现的是

- A. 腹痛拒按

- B. 畏寒
- C. 恶寒
- D. 壮热
- E. 舌苔厚腻

10、急性梗阻性化脓性胆管炎，最关键的治疗是

- A. 输液、输血维持有效血容量
- B. 纠正代谢性酸中毒
- C. 静脉输入大量抗生素
- D. 胆道减压引流解除梗阻
- E. 急诊行胆囊切除术

11、厘米波治疗时产热最多的组织是

- A. 皮肤
- B. 皮下脂肪
- C. 浅层肌肉
- D. 深层肌肉
- E. 骨

12、一项高血压发病危险因素成组病例对照研究表明，在 360 例病例组中 252 例为吸烟者，而 320 例对照组中 102 例为吸烟者，请问吸烟与高血压的 OR 值为

- A. 252/360
- B. 102/108
- C. 102/320
- D.  $(252 \times 218) / (102 \times 108)$
- E.  $(252 \times 320) / (102 \times 360)$

13、阿片类药物通过阿片受体产生以下哪些药理作用

- A. 镇痛、镇静作用
- B. 抑制咳嗽中枢及抑制胃肠蠕动作用
- C. 缩瞳
- D. 致欣快作用
- E. 以上均包括

14、在抽样研究中，当样本例数逐渐增多时

- A. 标准误逐渐加大
- B. 标准差逐渐加大
- C. 标准差逐渐减小
- D. 标准误逐渐减小
- E. 标准差趋近于 0

15、尿负荷试验不能评价下列哪种维生素的营养状况

- A. 硫胺素
- B. 维生素 D
- C. 尼克酸
- D. 核黄素
- E. 抗坏血酸

16、引起运动神经和肌肉组织足够兴奋的脉冲频率为

- A. 1000Hz以下
- B. ~~1~~100kHz
- C. ~~100~~100kHz
- D. ~~1000~~10000Hz
- E. 无特点范围

17、缺铁性贫血在成年男性中最多见的原因是

- A. 消化道慢性失血
- B. 铁需要量增加
- C. 失血过多
- D. 铁摄入不足
- E. 骨髓造血功能减退

18、心脏病孕妇容易发生心力衰竭的时期是

- A. 妊娠 32~34 周

- B. 妊娠 24~26 周
- C. 妊娠 28~30 周
- D. 妊娠 20~22 周
- E. 妊娠 36~37 周

19、女性，34 岁。患疑病障碍 2 年，伴有焦虑抑郁情绪，未正规治疗，现来诊。最佳的治疗方案是

- A. 抗焦虑药
- B. 心理治疗+抗抑郁药
- C. 抗抑郁药
- D. 心理治疗+抗精神病药
- E. 抗精神病药

20、男，40 岁。反复发热 3 个月余。骨髓细胞学检查示有核细胞与成熟红细胞比例为 1 : 100。最可能的病因是

- A. 再生障碍性贫血
- B. 溶血性贫血
- C. 急性白血病
- D. 慢性白血病
- E. 真性红细胞增多症

21、脑瘫儿童摄食训练前需抑制原始反射，应首先

- A. 让患儿髋关节屈曲 50°
- B. 让患儿髋关节屈曲 60°
- C. 让患儿髋关节屈曲 70°
- D. 让患儿髋关节屈曲 80°
- E. 让患儿髋关节屈曲 90°

22、天王补心丹的功用是

- A. 益气补血，养心安神
- B. 滋阴补血，养心安神
- C. 温阳益气，养心安神

- D. 滋阴益气，养心安神
- E. 补血温阳，养心安神

23、男性，58岁，诊断为慢性肺源性心脏病，3天来受凉后咳嗽，气急加重，出现颈静脉怒张，肝肿大，下肢水肿，心率120次/分，律齐，两肺闻及哮鸣音及水泡音。应首先选择哪组治疗

- A. 强心+利尿+抗生素
- B. 利尿+抗生素+吸氧
- C. 抗生素+吸氧+平喘药
- D. 强心+抗生素+平喘药
- E. 利尿+平喘药+氧疗

24、小儿充血性心力衰竭发病率最高的年龄段是

- A. 1个月内
- B. 1岁内
- C. 1~2岁
- D. 2~3岁
- E. 3~6岁

25、关于假性囊肿，下列说法错误的是

- A. 多位于胰头部
- B. 囊壁无上皮
- C. 常在病后3~4周形成
- D. 囊肿穿破可致胰源性腹腔积液
- E. 大小不等

26、形成煤烟型烟雾事件的主要污染物是

- A. 烟尘和NO<sub>x</sub>
- B. 汽车废气和SO<sub>2</sub>
- C. 烟尘和PANs
- D. 烟尘和O<sub>3</sub>
- E. 烟尘和SO<sub>2</sub>

27、男性生殖系结核首先发生在

- A. 睾丸
- B. 前列腺
- C. 附睾
- D. 精囊
- E. 输精管

28、检查甲状腺是否有震颤最敏感的部位

- A. 甲状腺上极
- B. 甲状腺下极
- C. 甲状腺中部
- D. 甲状腺左叶
- E. 甲状腺右叶

29、正中神经的感觉绝对支配区为

- A. 拇指指腹
- B. 手掌部
- C. 虎口区
- D. 示指指腹
- E. 小指指腹

30、“肾为气之根”主要指

- A. 肾为五脏阳气之根本
- B. 肾主纳气，以维持呼吸深沉
- C. 肾主膀胱的气化开合
- D. 肾主水液的蒸腾气化
- E. 指元气由肾精化生

31、下列哪项描述是错误的

- A. 一般来说，关节疼痛的程度与病情的严重性相平行

- B. 关节畸形常提示损伤已到中晚期
- C. 类风湿关节炎患者常有晨僵
- D. 关节肿是判断关节炎的重要依据
- E. 关节功能障碍都是不可逆的，疾病控制后也不能恢复

32、关于血管迷走性晕厥的治疗，哪个说法是不正确的

- A. 增加盐的摄入，限制水的摄入
- B. 首选物理治疗
- C. 可行直立训练、倾斜训练
- D. 可以考虑加用  $\beta$  受体阻滞药治疗
- E. 可以考虑加用  $\alpha$  受体激动药

33、下列支持溶血性黄疸的是

- A. 非结合胆红素增加
- B. 结合胆红素增加
- C. 尿胆红素阳性
- D. 尿胆原减少
- E. PT延长

34、临床上壶腹癌最重要的症状是

- A. 黄疸
- B. 上腹痛及腰背痛
- C. 寒战、发热
- D. 消化道症状
- E. 贫血、消瘦

35、关于变应性鼻炎其表述不正确的是

- A. 以鼻痒、阵发性喷嚏、大量水样鼻涕和鼻塞为主要特征
- B. 其在人群中的发病率为 20%
- C. 约有 30% 的患者合并有变应性哮喘
- D. 属 I 型变态反应，但与细胞因子、细胞间黏附分子-1 及部分神经肽的相互作用无关
- E. 变应性鼻炎的发病与遗传及环境密切相关



36、非参数统计是对资料的哪项指标进行比较

- A. 参数
- B. 频数
- C. 统计量
- D. 分布
- E. 构成比

37、男性，72岁。吸烟指数1200，近半年有咳嗽，痰中带血丝，近2个月出现声嘶。查右锁骨上窝触及一肿大淋巴结，质硬，无压痛。则可能为

- A. 胃癌
- B. 咽喉炎
- C. 肺癌
- D. 淋巴瘤
- E. 肺结核

38、鼓室积液的鼓室导抗图为

- A. ~~A~~型
- B. A型
- C. A~~C~~型
- D. ~~B~~型
- E. ~~C~~型

39、某病人走进病房时听见时钟滴滴答答的声音（真实声音），同时耳边突然听见“杀了他，杀了他”，患者感到极度恐惧，慌忙逃离病房。奇怪的是，时钟声音消失后，耳边反复出现的声音也随之消失。这种症状可能为

- A. 反射性幻觉
- B. 思维回响
- C. 机能性幻听
- D. 听错觉
- E. 读心症

40、一般人群暴露于结核菌后，最常见的结果是

- A. 无感染
- B. 感染而不发病
- C. 感染随即发病
- D. 感染长期潜伏后再发病
- E. 大部分人感染后发病

41、下列施行阑尾切除术寻找阑尾的基本方法，不正确的是

- A. 用纱布垫将小肠向内上方推开，显露清楚右髂窝
- B. 找到盲肠沿结肠带向下寻找阑尾根部，找出全部阑尾
- C. 寻找阑尾困难时，应想到活动盲肠，立即扩大切口
- D. 沿回肠末端追踪盲肠，找到阑尾
- E. 过长的乙状结肠位于右下腹，不要误以为是盲肠

42、男性，46岁，胃痛十余年，近半年症状加重持续上腹痛，尚能进食，上腹部偏右可扪及5 cm×6 cm肿块，移动浊音阳性，肛诊检查，直肠前壁触及质坚硬节，临床诊断胃癌，下列哪种治疗是合理的

- A. 胃癌根治术
- B. 胃大部切除术
- C. 姑息性胃癌切除术
- D. 胃、空肠吻合术
- E. 不宜手术

43、男性，53岁。上腹部隐痛不适1年，近2个月来加剧；入院查体腹平坦，上腹有轻压痛，未触及肿物，大便潜血试验(+)，上消化道造影检查显示胃窦部小弯侧黏膜纹理紊乱，胃壁僵硬，未见明显充盈缺损。该患者首先应考虑

- A. 慢性胃炎
- B. 胃溃疡
- C. 胃癌
- D. 胃黏膜脱垂
- E. 萎缩性胃炎

44、该检查选用以下何种显像剂合适

- A.  $^{131}\text{I}$ -OIH
- B.  $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -DTPA
- C.  $^{123}\text{I}$ -OIH
- D.  $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -EC
- E.  $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -MAG3

45、男性患者，45岁，因单侧面颊部发作性针刺样疼痛2年余就诊。疼痛持续数秒钟至2分钟不等。检查该患者时应特别注意

- A. 面颊部有无触发点
- B. 面肌反射性抽搐
- C. 有无面色憔悴、情绪低落
- D. 面部疼痛觉及角膜反射是否正常
- E. 面部、口腔卫生是否正常

46、仅引起右心室后负荷增加的疾病是

- A. 主动脉瓣关闭不全
- B. 三尖瓣关闭不全
- C. 房间隔缺损
- D. 阻塞性肺气肿
- E. 动静脉瘘

47、桂枝汤原方服法要求“服已须臾，啜热稀粥一升余”，其意义在于

- A. 防止过汗伤阳
- B. 助汗以去外邪
- C. 防止过汗伤阴
- D. 护中以防伤胃
- E. 保护阳气

48、与膳食纤维作用无关的是（）

- A. 促进无机盐的吸收

- B. 预防结肠癌
- C. 促进肠道蠕动
- D. 降低血胆固醇水平
- E. 延缓碳水化合物吸收

49、氯霉素在临床应用受限的主要原因是

- A. 严重的胃肠道反应
- B. 影响骨骼和牙齿生长
- C. 抑制骨髓造血功能
- D. 易发生二重感染
- E. 易引起过敏反应

50、患者男性，60岁，因慢性阻塞性肺疾病并发呼吸衰竭、肺性脑病予气管插管机械通气，病情一度改善。但瞬间病情突然恶化，躁动、发绀加重。呼吸监测表明气道阻力轻度增高。肺顺应性明显降低，其最可能的原因是

- A. 呼吸道分泌物引流不畅
- B. 并发气胸
- C. 肺水肿
- D. 肺栓塞
- E. 急性左心衰竭

51、关于主观视功能检测不包括

- A. 对比敏感度
- B. 视觉诱发电位
- C. 暗适应
- D. 色觉
- E. 视野

52、脾在五行属土，与\_\_相表里

- A. 小肠
- B. 胃
- C. 胆

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/367145142064006040>