

口腔正畸学模拟试题（含参考答案）

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、下切牙切缘每向舌侧移动 10mm，约需要牙弓间隙：

- A、2.5mm
- B、0.5mm
- C、1mm
- D、1.5mm
- E、2mm

正确答案：C

2、四环素牙属于

- A、着色牙
- B、牙结构异常
- C、牙形态异常
- D、牙数目异常
- E、牙萌出异常

正确答案：A

3、乳牙或恒牙早失一般应

- A、不用处理
- B、采用霍利保持器
- C、采用缺隙保持器
- D、采用活动桥修复
- E、采用 Crozat 矫治器

正确答案：C

4、在牙体组织的反应中哪项反应与矫治力无关

- A、牙根尖进行性吸收
- B、牙根特发性吸收
- C、牙骨质的吸收与牙槽骨相比，其吸收范围小程度轻
- D、矫治力过大则可发生牙髓炎
- E、牙髓组织可发生轻度充血，对温度的变化敏感

正确答案：B

5、牙列缺失后颌骨的改变主要表现为

- A、牙槽骨的吸收
- B、颌骨的移位
- C、颌骨的增生

- D、颌骨的吸收
- E、牙槽骨的增生

正确答案：A

6、牙齿 I 度拥挤是指牙冠宽度总和与牙弓现有弧形长度之间相差

- A、4~8mm
- B、15mm 以上
- C、2~4mm
- D、20mm
- E、8mm 以上

正确答案：A

7、与建立动力平衡关系不大的肌肉是

- A、翼内肌
- B、二腹肌
- C、颊肌
- D、舌肌
- E、嚼肌

正确答案：B

8、暂时性错（牙合）的临床表现是

- A、个别前牙反牙合
- B、后牙反（牙合）
- C、III度牙列拥挤
- D、上颌侧切牙初萌出时，牙冠向远中倾斜
- E、III度深覆牙合，III度深覆盖

正确答案：D

9、引起颜面不对称畸形的原因有

- A、单侧多数后牙反牙合
- B、前牙反牙合
- C、双侧多数后牙反牙合
- D、单侧个别后牙反牙合
- E、乳牙反牙合

正确答案：A

10、下列不属于活动保持器的是

- A、positioner
- B、twin-block

- C、改良 Hawley 保持器
- D、标准 Hawley 保持器
- E、chin-cup

正确答案：B

11、位患者血压分别如下，哪位患者不已拔牙

- A、140/90mmHg
- B、180/110mmHg
- C、125/80mmHg
- D、170/95mmHg
- E、120/85mmHg

正确答案：B

12、楔状缺损的病因有

- A、不恰当的刷牙方法
- B、所有选项均正确
- C、酸的作用
- D、牙颈部结构的特点
- E、应力疲劳

正确答案：B

13、邻面去釉矫治一般去除邻面釉质厚度为：

- A、1.5mm
- B、0.25mm
- C、1mm
- D、0.1mm
- E、0.5mm

正确答案：B

14、恒牙列期临床上最常用的矫治器是哪一种

- A、活动矫治器
- B、唇侧矫治器
- C、舌侧矫治器
- D、固定矫治器
- E、功能矫治器

正确答案：D

15、活动矫治器的优点为

- A、固定良好

- B、异物感小
- C、体积小、较舒适
- D、作用力单一
- E、不影响美观

正确答案：E

16、评价颅面发育最稳定的参照部位是

- A、咬合平面
- B、鼻底
- C、颅顶
- D、鼻上颌复合体
- E、前颅底

正确答案：E

17、下列哪项是固定矫治器的缺点：

- A、能矫治较复杂的错牙合畸形
- B、固定良好
- C、固定矫治技术相对复杂,临床上椅旁操作时间较长
- D、能控制矫治牙的移动方向
- E、体积小

正确答案：C

18、在根尖及根中 1/3 根折的转归中，下列叙述哪项是正确的

- A、断端由慢性炎症组织分开，根端多为活髓，冠侧段牙髓常坏死
- B、所有选项均正确
- C、两断端由钙化组织联合，与骨损伤的愈合很相似
- D、结缔组织将各段分开，断面上有牙骨质生长，但不出现联合
- E、未联合的各段由结缔组织和骨桥分开

正确答案：B

19、下列哪种矫治器不需要咬合重建

- A、功能调节器
- B、生物调节器
- C、肌激动器
- D、双（牙合）板矫治器
- E、上颌双侧（牙合）垫矫治器

正确答案：E

20、牙受到温和而持续的正畸力时，在压力侧牙周组织将

- A、分化出破骨细胞，胶原纤维和基质降解吸收，牙槽骨吸收
- B、牙槽骨面出现一薄层呈淡红色的类骨质
- C、牙周膜纤维拉伸变长，牙周膜间隙增宽
- D、成纤维细胞增殖，成骨细胞分化，胶原纤维和基质增生
- E、血管充血，IM 流加速

正确答案：A

21、下例为记存模型的主要用途的是除外

- A、记录保存原有错（牙合）关系
- B、治疗过程中作为对照观察和治疗前后对比评估疗效
- C、帮助确定矫治计划
- D、作为研究分析错（牙合）畸形的重要手段
- E、司法鉴定时的重要法律依据

正确答案：A

22、正畸患者发生附着丧失的几率

- A、50%
- B、20%
- C、10%
- D、30%
- E、40%

正确答案：C

23、在正畸过程中，最易形成的一种运动是哪种：

- A、垂直移动
- B、转矩移动
- C、整体移动
- D、倾斜移动
- E、旋转移动

正确答案：D

24、下列哪些公式对替牙间隙的解释是正确的

- A、 $A - V - 5$
- B、 $D(II + IV + V) - (3 + 4 + 5)$
- C、 $B(IV + V) - (4 + 5)$
- D、 $C(IV + V) - (3 + 4 + 5)$
- E、 $E(I + II + IV + V) - (2 + 3 + 4 + 5)$

正确答案：B

25、腭盖宽度增长的原因是

- A、牙槽骨因恒磨牙的生长在颊面增生新骨而使腭盖加宽
- B、腭盖的表面增生新骨及鼻腔底面咽收陈骨
- C、鼻部生长
- D、眼窝底部生长
- E、所有选项都不是

正确答案：A

26、关于序列拔牙矫治的原则和步骤说法不正确的是

- A、序列拔牙只适用于恒牙期，(11~13岁)牙列中度拥挤者
- B、拔除第一乳磨牙，让第一前磨牙尽早萌出
- C、拔除尖牙
- D、拔除第一前磨牙，让尖牙萌出到第一前磨牙的位置上
- E、适用于替牙期牙列严重拥挤

正确答案：A

27、牙列中先天性缺牙率最高的牙齿是

- A、第三磨牙
- B、第二磨牙
- C、第一前磨牙
- D、第二前磨牙
- E、第一磨牙

正确答案：A

28、解剖式牙的牙尖斜度为

- A、 5°
- B、 20°
- C、 15°
- D、 33°
- E、 10°

正确答案：D

29、口外上颌前方牵引矫治器的目的是

- A、只能使上前牙唇倾
- B、限制成人上颌骨发育
- C、促进成人上颌骨发育
- D、限制生长发育期上颌骨发育
- E、利用口外力促进生长发育期的上颌骨发育

正确答案：E

30、正畸患者发生附着丧失的几率为

- A、30%
- B、40%
- C、50%
- D、20%
- E、10%

正确答案：E

31、弯制口外弓的内弓用

- A、1.0~1.2mm 钢丝
- B、1.2~1.4mm 钢丝
- C、0.9~1.0mm 钢丝
- D、1.4mm 以下均可
- E、1.4~1.6mm 钢丝

正确答案：A

32、以理想正常牙合为标准,错牙合畸形的患病率是

- A、60%
- B、86.81%
- C、91.2%
- D、20.33%
- E、40.92%

正确答案：C

33、有关颅部的生长发育,以下哪种描述是不正确的

- A、头部开始形成的时间大约是胚胎第3周
- B、颅基底软骨生长发育,以满足脑量扩大的需要
- C、胚胎第8周时,颅底软骨开始骨化
- D、颅骨的生长发育始于结缔组织性质的膜性颅
- E、颅部由含脑的颅脑和含面的颅面所组成

正确答案：C

34、关于序列拔牙错误的是

- A、又称为萌出诱导及(牙合)诱导
- B、所有选项都是错误的
- C、序列拔牙的目的是最终减数拔除第一前磨牙
- D、需要长期监控,一般每半年应摄全颌曲面断层片

E、序列拔牙可能会减少前牙深覆(牙合)

正确答案：E

35、以下哪项不属于早期矫治的有利因素

- A、错(牙合)畸形复发的可能性小
- B、降低某些复杂牙颌畸形的治疗难度
- C、有益于儿童身心健康成长
- D、矫治方法和矫治器简单
- E、利用生长发育的潜力

正确答案：A

36、口呼吸习惯可造成上牙弓

- A、牙弓增宽，腭盖高拱
- B、后牙锁(牙合)，舌体上(牙合)
- C、所有选项都不对
- D、牙弓狭窄，腭盖高拱
- E、后牙反(牙合)，舌体上(牙合)

正确答案：D

37、乳牙反(牙合)开始矫治的最佳年龄是

- A、5岁
- B、3岁
- C、4岁
- D、6岁
- E、2岁

正确答案：C

38、乳牙期前牙反(牙合)矫治目的为

- A、促进下颌发育
- B、抑制上颌发育
- C、解除前牙反(牙合)，促进上颌发育，抑制下颌过度发育
- D、改变牙齿位置
- E、建立适当的覆(牙合)覆盖关系

正确答案：C

39、Angle 错牙合分类的优点是

- A、此分类法对正畸临床及科学研究有一定的指导意义
- B、考虑了牙合、颌、面、高度及宽度的不调
- C、简明易懂

- D、错牙合畸形机制全
- E、考虑了牙量、骨量不调问题

正确答案：C

40、Wits 距表示

- A、上下中切牙切端的距离
- B、上中切牙切端到上下齿槽座点连线的距离
- C、上下齿槽座点在功能殆平面上的投影点之间的距离
- D、上中切牙切端到 NA 连线延长线的距离
- E、上中切牙切端到腭平面（前后鼻棘连线）的距离

正确答案：C

41、肌激动器又称

- A、FR-III 矫治器
- B、Andresn 矫治器
- C、功能调节器
- D、Frankel 矫治器
- E、生物调节器

正确答案：A

42、关于大连接体的要求正确的是

- A、厚 4mm
- B、宽 3mm
- C、根据情况设置大小、外形及厚度
- D、厚 3mm
- E、宽 4mm

正确答案：C

43、下列哪项是此患者远中移动尖牙的有效方法

- A、III类牵引
- B、尖牙的远中部弯制垂直关闭曲
- C、颌间垂直牵引
- D、每个托槽单纯结扎
- E、扩大螺旋簧推尖牙远中移动

正确答案：E

44、以下哪项不属于早期矫治的有利因素

- A、矫治方法和矫治器简单
- B、降低某些复杂牙颌畸形的治疗难度

- C、利用生长发育的潜力
- D、有益于儿童身心健康成长
- E、错(牙合)畸形复发的可能性小

正确答案：E

45、方丝弓技术在我国开始运用于临床是：

- A、20 世纪 70 年代
- B、20 世纪 90 年代
- C、20 世纪 80 年代
- D、20 世纪 50 年代
- E、20 世纪 60 年代

正确答案：C

46、下颌平面角是

- A、下颌平面与（牙合）平面的交角
- B、下颌平面与 Bolton 平面的交角
- C、下颌平面与腭平面的交角
- D、下颌平面与 SN 平面的交角
- E、下颌平面与 FH 平面的交角

正确答案：E

47、关于 activator，叙述不正确的是

- A、是一种生物调节器
- B、下颌前移的数量以磨牙关系达中性为准
- C、一般磨牙区垂直打开约 4mm
- D、下颌前移量与垂直打开量之和一般在 8~10mm
- E、矫正力来源于咀嚼肌

正确答案：A

48、Begg 细丝弓矫治器中要求配备高质量的矫治弓丝，此弓丝是

- A、不锈钢圆丝
- B、不锈钢方丝
- C、澳丝
- D、镍钛方丝
- E、镍钛圆丝

正确答案：C

49、记存模型座的厚度约为尖牙到前庭沟底总高度的

- A、1 / 4

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/367160124153006124>