

# 中医骨伤学理论知识考核

## 一、单项选择题

1 .首次记载用竹片夹板固定骨折的是 ( ) [单选题]

A.葛洪《肘后救卒方》 ✓

8 .龚庆宣《刘涓子鬼遗方》

C.巢元方《诸病源候论》

D.《吕氏春秋》

E.蔺道人《仙授理伤续断秘方》

9 .开放性骨折采取清创术的时间限制是 ( ) [单选题]

A.6-8 小时以内 ✓

B.12 小时以内

C.没有的

D. 1 小时以内

E. 24 小时以内

3.股骨股上骨折若局部出现较大的血肿，且胫后动脉、足背动脉搏动减弱或消失时，应考虑 ( ) [单选题]

A.深静脉栓塞

B.筋膜间隔综合征

C.腘动脉损伤 ✓

D. 胸静脉损伤

E. 以上都不是

4 .摸肤温时，一般用什么部位测试？（） [单选题]

A. 手指指端

B. 手掌

C. 手背 ✓

D. 掌根

E. 大鱼际

5 .拾物试验主要用于检查（） [单选题]

A. 骶关节疾病

8 .小儿脊柱疾病 ✓

C. 膝关节疾病

D. 上肢疾病

E. 小儿先骶

6. 根据损伤的发展过程，损伤初期一般指伤后（） [单选题]

A. 24 小时内

8. 1 周内

C. 1-2 周内 ✓

D. 3 周内

E. 3-6 周

7 .胫骨平台骨折，若检查时发现侧向试验阳性则提示（） [单选题]

A. 半月板损伤

B.前交叉韧带损伤

C.侧副韧带损伤 ✓

D.内侧副韧带损伤

E.外侧副韧带损伤

8 .轻度分离移位的髌骨骨折,整复后可用什么来固定 ( ) [单选题]

A.腰柱

B.夹板

C.石膏

D.抱膝环 ✓

E.以上都可以

9 .下肢骨折,若缩短几厘米以上,就会出现明显跛行 ( ) [单选题]

A. 1cm

B. 2cm ✓

C. 3cm

D. 4cm

E. 5cm

10 .下肢练功的主要目的是 ( ) [单选题]

A.恢复负重和行走功能 ✓

B.促进血液运行

C.保护关节灵活性

D.防止关节功能障碍

E.防止肌肉萎缩

11 . 遇冷则疼痛发作，或闷痛，舌淡暗、苔白腻，脉滑涩为（1 [单选题] \*

A、寒凝血瘀证 ✓

B、气滞血瘀证

C、气虚血瘀证

D、痰阻血瘀证

12 . 热毒血瘀者，宜食清热解毒、活血化瘀之品，如百合、芹菜、菊叶、（\马齿苋等。 [单选题] \*

A、羊肉

B、荔枝

C、桂圆

D、苦瓜 ✓

13 . 痰阻血瘀者食疗方（\ [单选题] \*

A、山药粥

B、慧苳仁桃仁粥 ✓

C、绿豆汤

D、陈皮桃仁粥

14 . 疼痛剧烈，多与情绪因素有关，舌暗或紫暗、苔白，脉弦滑为（\ [单选题] \*

A、寒凝血瘀证

B、气滞血瘀证 ✓

C、气虚血瘀证

D、痰阻血瘀证

15 . （）宜食温阳散寒、活血通络之品，如龙眼肉、羊肉、韭菜、荔枝、山楂、桃仁、凝白、干姜、大蒜

等；少食苦瓜等生冷、寒凉之品。食疗方：瘫白粥等。 [单选题] \*

A、寒凝血瘀者 ✓

B、气滞血瘀证者

C、气虚血瘀者

D、痰阻血瘀者

16 . ( ) 宜食益气活血之品，如鸡肉、牛肉、蛇肉、山药、木耳、大枣、慧苡仁等。食疗方：海至煲猪蹄等。 [单选题] \*

A、寒凝血瘀者

B、气滞血瘀证者

C、气虚血瘀者 ✓

D、痰阻血瘀者

17 . 点按 ( ) 压下抬起，用于没有骨骼的部位，用于人中、膝眼穴。 [单选题] \*

A、30 度

B、45 度

U60 度

D、90 度 ✓

18 . 按揉，倾斜皮肤 ( ) 鼠逆时针都可，不离皮肤。 [单选题] \*

A、20度 ✓

B、45 度

C、60 度

D、90 度

19 .适用于头颈部、肩背部、腰部、四肢后侧的刮拭的体位（\ [单选题] \*

A、仰卧位

B、俯卧位 ✓

C、侧卧位

D、仰靠坐位

20 .适用于前头、面部、颈前及上胸部的刮拭的体位（| [单选题] \*

A、仰卧位

B、俯卧位

C、侧卧位

D、仰靠坐位 ✓

21 . 髌关节后脱位复位后不能过早负重的主要缘由（） [单选题] \*

A:防止再脱位

B: 防止神经损耗

C:防止反射骨化性肌炎

D:防止股骨头缺血坏死 ✓

22 . 拾物试验主要用于检查（） [单选题] \*

A: 髌关节病变

B: 小儿脊柱疾病,

C: 膝关节疾病

D: 上肢疾病

23 . 诊断脱位的依据是（） [单选题] \*

A:骨擦音

B:朝

C:反常活动

D:弹性固定 ✓

24 . ( ) 不是骨折常伴有的并发症 [单选题] \*

A:休克

B:骨化性肌炎

C:肌肉萎缩 ✓

D:脂肪栓塞

25 . 骨折手法整复时, 骨折断端对合的基本则是 ( ) [单选题] \*

A:早巧稳准

B:用力适当

C:禁忌动作粗暴

D:以子求母 ✓

26 . 至股骨颈骨折的缘由是 ( ) [单选题] \*

A:直接暴力

B:间接暴力 ✓

C:肌肉收缩

D:重力挤压

27 . 上肢练功的目的是 ( ) [单选题] \*

A:增加肌肉的力气

B:促进骨折愈合

C:排除关节黏连

D:复原手的功能 ✓

28 . 不常见的脱位是 ( ) [单选题] \*

A:肘关节

B:肩关节

C:髋关节

D:膝关节 ✓

29.18岁以下青少年的骨折类型多为（） [单选题] \*

A:横形骨折

B:嵌形骨折

C:骨垢分离 ✓

D:压缩骨折

30.（）易并发骨缺血性坏死 [单选题] \*

A:髌骨骨折

B:股骨干骨折

C:髌骨下端骨折

D:股骨颈骨折 ✓

31.下肢骨折断缩（）以上，就会显现明显跛行。 [单选题] \*

A:1cm

B:2cm

C:3cm ✓

D:4cm

32.关节脱位的固定时间一般为（） [单选题] \*

A:2周

B:2-3周 ✓

D:4周

33 . 肩关节四周炎关节活动受限最明显的方式就（） [单选题]

A:外展 ✓

B:内收

C:后伸

D:前屈

34 . 臂丛神经牵拉试验主要用于检查（） [单选题] \*

A:颈椎结核

B: 环枢关节半脱位

C:颈椎病 ✓

D:肩关节脱位

35 . 练功疗法应贯彻的原则就是（） [单选题] \*

A:内外兼治

B:动静结合 ✓

C:医患合作

D:筋骨并重

36 . （）不属于不完全骨折 [单选题] \*

A:横断骨折

B:嵌插骨折

C:青枝骨折,

D:压缩骨折

37 .股骨干骨折、盆骨骨折，多发性骨折都易显现（）的并发症。 [单选题]

A:血管损耗

B: 神经损耗

C:感染

D:穷性休克 V

38 .简单显现腓总神经损耗的骨折就是（） [单选题] \*

A:胫骨平台骨折

B: 骸骨骨折

C:腓骨头骨折 V

D:腓骨干骨折

39 .坠积性肺炎的好发人群是（） [单选题] \*

A:老年人 ✓

B:青年人

C:儿童

D:成人

40 .造成马鞍区感觉消失或减退的间盘突出类型为（） [单选题] \*

A:前侧型

B:中心型 ✓

C:后夕侧型

D:夕侧型

41 .最多见的肩关节前脱位就是（） [单选题] \*

A:孟下脱位

B:喙突下脱位 ✓

C:锁骨下脱位

D:肩峰下脱位

42 .研磨试验阳性提示（） [单选题] \*

A:膝侧副韧带损耗

B:半月板损耗 ✓

C:膝交叉韧带损耗

D:骸骨劳损

43 .大头垫适用于（） [单选题] \*

A:挠骨小头半脱位

B:肱骨外跟颈骨折 ✓

C:挠骨下端骨折

D:股骨下端骨折

44 搭肩试验（杜加氏征）常用于诊断（） [单选题] \*

A:肩关节四周炎

B:冈上肌腱炎 ✓

C:肩关节脱位

D:肱骨外踝颈骨折

45 .损耗外因主要就是指（） [单选题] \*

A:直接暴力 ✓

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/375004202011011111>