

N3 护士理论知识复习题含答案

1、为降低脑出血病人颅内压,治疗时可选用()

- A、高分子右旋糖酐
- B、10%葡萄糖
- C、低分子右旋糖酐
- D、甘露醇
- E、地西洋

答案: D

2、过敏性紫癜肾炎属于哪型免疫反应()

- A、III型
- B、II型
- C、IV型
- D、V型
- E、I型

答案: A

3、肾远曲小管的功能是()

- A、重吸收水
- B、重吸收 Na⁺
- C、向管腔分泌 K⁺、H⁺和氨
- D、维持血液的酸碱平衡
- E、以上都是

答案: E

4、下列与急性白血病的病因无关的是()

- A、物理因素
- B、化学因素
- C、病毒因素
- D、遗传因素
- E、精神因素

答案: E

5、诊断气胸最重要的检查方法是()

- A、X线胸片检查
- B、肺功能检查
- C、胸部 CT
- D、胸腔内测压
- E、支气管镜

答案：A

6、儿童糖尿病最多见的类型是()

- A、1 型糖尿病
- B、2 型糖尿病
- C、肾性糖尿病
- D、继发性糖尿病
- E、婴儿暂时性糖尿病

答案：A

7、患者,男,45岁,因慢性肾衰竭行维持性血液透析治疗已有3个月,尿毒症症状明显减轻,但血红蛋白70g/L。本例贫血的主要原因是()

- A、叶酸及 VitB12 缺乏
- B、促红细胞生成素减少
- C、透析失血及缺铁
- D、尿毒症毒素抑制骨髓
- E、红细胞寿命缩短

答案：B

8、初步诊断为()

- A、强直性脊椎炎并髋关节强直
- B、髋关节化脓性关节炎
- C、右髋关节结核
- D、右股骨头缺血性坏死
- E、右髋关节创伤性滑膜炎

答案：D

9、呆小病的临床表现应除外()

- A、头大颈短
- B、特殊面容
- C、上部量短,下部量长
- D、智力低下
- E、怕冷

答案：C

10、目前最主要的护理诊断是()

- A、营养失调:低于机体需求量
- B、体液过多
- C、恐惧
- D、活动无耐力

E、有感染的危险

答案：D

11、支气管哮喘发作时不会出现()

A、FEV1/ FVC%下降

B、MMFR 降低

C、RV 、FRC 增加

D、RV/TLC%增加

E、PEF 增加

答案：E

12、支气管扩张大咯血患者最危险且最常见的并发症是()

A、严重贫血

B、休克

C、窒息

D、继发感染

E、发热

答案：C

13、肝硬化晚期病人血清中常出现()

A、白蛋白增加,球蛋白增加

B、白蛋白减少,球蛋白减少

C、白蛋白减少,球蛋白增加

D、白蛋白增加,球蛋白减少

E、白蛋白/球蛋白比值增大

答案：C

14、气胸的典型 X 线表现哪项不正确()

A、患侧胸腔透亮度增加

B、肺压缩征

C、可见气胸带

D、少量气胸不易发现时嘱患者深吸气,从而易于显示气胸带

E、血气胸时可见液气平面

答案：D

15、男性. 60 岁,反复咳嗽、咳痰 20 余年,活动后气短 10 余年,吸烟 30 年,每天 20 支。考虑诊断为慢性阻塞性肺疾病,最有价值的检查是()

A、胸片

B、胸部 CT

C、肺功能

- D、血气分析
- E、肺核素扫描

答案：C

16、女性, 28 岁, 向心性肥胖, 多血质外观, 皮肤紫纹, CT 示双侧肾上腺增生, 垂体 CT 正常, 行一侧肾上腺全切, 另一倒 3/4 切除, 术后 2 年病人皮肤色素逐渐加深, 考虑为 N-POMC 综合征。此时最需要的检查为()

- A、肾上腺彩超
- B、肾功测定
- C、肝功测定
- D、垂体 MRI
- E、ACTH 兴奋试验

答案：D

17、关于急性肾炎的治疗, 下列哪种说法不正确 ()

- A、急性期应卧床休息
- B、不宜应用糖皮质激素及细胞毒药物
- C、氮质血症时应限制蛋白质摄入
- D、发生急性肾衰竭需长期透析治疗
- E、急性期予低盐饮食

答案：D

18、肺癌中恶性程度最高的是()

- A、小细胞未分化癌
- B、大细胞未分化癌
- C、腺癌
- D、鳞状上皮细胞癌
- E、PanCOast 癌癌

答案：A

19、若诊断临床糖尿病, 应首先选择下述哪项检查()

- A、尿糖
- B、空腹血糖
- C、糖化血红蛋白
- D、口服糖耐量试验
- E、空腹胰岛素测定

答案：B

20、蜘蛛痣的形成与下列何种因素有关()

- A、血小板减少

- B、血中雌激素增加
- C、毛细血管脆性增加
- D、凝血机制障碍
- E、严重感染

答案：B

21、瘫痪病人的护理措施中不正确的是()

- A、做好心理护理
- B、保持瘫痪肢体功能位
- C、防止褥疮发生
- D、早期使用留置导尿
- E、预防便秘

答案：D

22、紧急胃镜检查应在上消化道出血后：()

- A、<24h
- B、24-48h
- C、48-72h
- D、>72h
- E、出血停止

答案：B

23、对本病治疗错误的是()

- A、绝对卧床休息
- B、理疗、热敷
- C、红外线照射、按摩
- D、医疗体育

E、非甾体类抗炎药物 125-129 共用题干女孩, 2 岁, 因抽搐就诊, 不会独站, 肌张力较高, 不认识父母, 皮肤白皙, 有湿疹, 头发浅黄, 尿有鼠臭味。

答案：A

24、患者, 男性, 36 岁, 饮酒后持续中上腹刀割样疼痛 12 小时, 伴恶心、呕吐来急诊。体检: 上腹部轻度压痛, 无反跳痛, 血淀粉酶 540U/dl。应首先考虑哪种疾病()

- A、急性阑尾炎
- B、急性肠炎
- C、消化性溃疡穿孔
- D、急性胰腺炎
- E、急性胆囊炎

答案：D

25、哪项对慢性淋巴细胞性甲状腺炎有诊断意义：()

- A、TGAb 与 TPOAb 明显 ↑
- B、实验室检查呈所谓“分离现象”
- C、一过性甲状腺毒症
- D、甲状腺扫描摄碘功能 ↓
- E、甲状腺 ¹³¹I 率明显 ↓

答案：A

26、尿路感染确定诊断, 主要依靠 ()

- A、症状和体征
- B、尿蛋白定量
- C、尿细菌学检查
- D、B 超检查
- E、肾活检

答案：C

27、急性腹泻是指病程短于()

- A、1 周
- B、2 周
- C、1 个月
- D、2 个月
- E、3 个月

答案：B

28、女性, 20 岁, 反复发作性喘息 10 年, 多于夏季发作。3 天前闻油漆味后出现呼吸困难, 夜间不能平卧, 吸入 β₂ 受体激动剂呼吸困难不能缓解来诊。诊为支气管哮喘急性发作, 为了客观地评价此患者的病情, 最简便和客观的检查方法是()

- A、拍胸片
- B、测定峰流速 PEF
- C、测定最大通气量 MTV
- D、动脉血气分析
- E、心电图

答案：B

29、此时最主要的护理措施是 ()

- A、增加营养
- B、控制水的摄入

- C、注意休息
- D、心理护理
- E、遵医嘱给予抗菌药物治疗

答案：D

30、HbsAg 阳性、HbeAg 阳性说明此病人()

- A、无传染性
- B、具有免疫力
- C、病情比较稳定
- D、具有传染性

答案：D

31、下面哪项护理评估最能确定患者的意识状态 (D)

- A、生命体征
- B、角膜反射
- C、肌腱反射
- D、疼痛刺激反应
- E、瞳孔对光反射

答案：D

32、肺源性心脏病呼吸衰竭时应给予()

- A、高流量持续吸氧
- B、高流量间歇吸氧
- C、低流量间歇吸氧
- D、低流量持续吸氧
- E、低流量混有二氧化碳的氧吸入

答案：D

33、女性, 65 岁。确诊为慢性阻塞性肺疾病((COPD) 20 年, 加重 1 周入院。入院时神清, 血气分析 PaO_2 5.33kPa (40mmHg), $PaCO_2$ 10.0kPa (75mmHg)。吸入 40%浓度氧后, 患者出现呼之不应, 查动脉血气分析示

PaO_2 11.3kPa (85mmHg), $PaCO_2$ 13.3kPa ((100mmHg)。患者出现障碍的原因是()

- A、感染加重
- B、气道阻力增加
- C、呼吸中枢受到抑制
- D、脑血管意外
- E、心衰脑贫血

答案：C

34、睡眠时常发生什么病()

- A、 内囊出血
- B、 脑桥出血
- C、 脑血栓
- D、 小脑出
- E、 蛛网膜下腔出血

答案： C

35、 该男孩的年龄最可能是()

- A、 1 岁
- B、 1 岁半
- C、 2 岁半
- D、 3 岁
- E、 3 岁半 88-90 共用题干

答案： B

36、 儿童糖尿病的临床表现除外()

- A、 多饮、 多尿、 消瘦
- B、 尿糖阳性
- C、 空腹血糖增高
- D、 糖耐量试验异常
- E、 血压升高

答案： E

37、 癫痫发作时正确的处理是()

- A、 立即服抗癫痫药物
- B、 立即吸氧
- C、 及时实施心电监护
- D、 及时进行口腔护理
- E、 立即放置护牙垫, 防止牙齿受损

答案： E

38、 降低乙脑病死率的关键措施是()

- A、 加强护理, 防止发生并发症
- B、 维持水、 电解质及酸碱平衡
- C、 纠正乏氧状态
- D、 控制高热、 抽搐和呼吸衰竭
- E、 维持循环, 控制心衰

答案： D

39、男性, 56 岁。因上消化道出血住院, 血压 5.3/0kPa(40g/0mmHg), 心率 140 次/分, 血红蛋白 35g/L, 经输液治疗后, 血压恢复至 13.3/9.3kPa(100/70mmHg), 心率 100 次/分, 但病人三天来少尿, 查血钾 6.4mmol/L, BUN. 28.5mmol/L(80mg/dl)。以下处理原则哪项正确 ()

- A、加大输血量
- B、紧急腹膜透析
- C、继续输血
- D、口服氨苯蝶啶+双氢克尿噻
- E、西地兰 0.4mg 静脉缓慢推注

答案: B

40、牛奶在胃内的排空时间是 ()

- A、1~2 小时
- B、2~3 小时
- C、3~4 小时
- D、4~5 小时
- E、5~6 小时

答案: C

41、对于早期 COPD , 下列各项肺功能指标中最敏感的是 ()

- A、第一秒用力呼气容积与用力肺活量比 FEV1/FVC
- B、第一秒用力呼气容积实测值与预计值比 FEV1 实测值/预计值
- C、呼气相峰流速 PEF
- D、残气量与肺总量比 RV/TLC
- E、肺活量 VC

答案: A

42、小儿开始会爬的年龄是 ()

- A、4~5 个月
- B、6~7 个月
- C、7~8 个月
- D、8~9 个月
- E、10~12 个月

答案: D

43、下列哪项不是下运动神经元瘫痪的特点 ()

- A、肌张力增高
- B、腱反射减低或消失
- C、无病理反射

- D、肌萎缩明显
- E、瘫痪以肌群为主

答案：A

44、急性期脑出血病人的血压()

- A、一般比平时低
- B、一般比平时高
- C、突然降低
- D、所有患者都比平时高
- E、与平时一样

答案：B

45、气胸的体征不包括下列哪项()

- A、气管多移向健侧
- B、患侧胸部隆起
- C、患侧呼吸运动和语颤减弱
- D、叩诊呈浊音
- E、患侧听诊呼吸音减弱或消失

答案：D

46、下列哪一项不是低钾血症的原因()

- A、长期使用呋塞米
- B、代谢性酸中毒
- C、禁食
- D、肾上腺皮质功能亢进
- E、代谢性碱中毒

答案：B

47、关于颅骨的发育,正确的是()

- A、出生时前囟约 2.0~2.5cm
- B、前囟一般于出生后 6 个月闭合
- C、前囟最晚于出生后 12 个月闭合
- D、后囟至迟于出生后 6~8 周闭合
- E、颅骨缝一般于生后 2 个月闭合

答案：D

48、脑血管疾病最重要的危险因素是()

- A、吸烟
- B、高血压
- C、肥胖

D、高血脂症

答案：B

49、引起秋季腹泻最常见的病原是()

A、流感病毒

B、埃可病毒

C、Norwalk 病毒

D、柯萨奇病毒

E、轮状病毒

答案：E

50、1 型糖尿病与 2 型糖尿病,最主要的区别在于()

A、症状轻重不同

B、发生酮症酸中毒的倾向不同

C、对胰岛素的敏感性不同

D、病因不同

E、血糖稳定性不同

答案：D

51、肾上腺危象的诱因有:()

A、感冒受凉

B、手术

C、突然中断糖皮质激素的治疗

D、肺炎

E、以上均是

答案：E

52、此时可选用的药物,除外()

A、呋塞米

B、甘露醇

C、甘油果糖

D、尼可刹米

E、间羟胺

答案：E

53、关于 Graves 病浸润性突眼的叙述,下列哪项是错误的()

A、患者常有视力疲劳、异物感、怕光、流泪等表现

B、突眼是由于病变累及球后组织引起的

C、突眼度一般小于 18mm

D、多有眼球胀痛、复视等

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/376101240053010113>