

## 重症医学科测试题及答案

### 一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、据认为，（）是引起尿毒症症状的主要毒性物质。

- A、小中分子物质
- B、中分子物质
- C、大分子物质
- D、小分子物质
- E、大中分子物质

正确答案：B

2、枕叶损害时主要出现：

- A、失读
- B、失写
- C、嗅觉障碍
- D、听觉障碍
- E、视觉障碍

正确答案：E

3、下列那一项不是护理不当所致的意外拔管

- A、气管切开病人固定带打活结
- B、未予以妥善固定
- C、烦躁病人不予约束制动
- D、镇静药使用不当
- E、病人伤口疼痛

正确答案：E

4、有关主动脉瓣关闭不全的病理生理改变，说法正确的是（）？

- A、心功能失代偿期，左心室排血量增加
- B、左心室在收缩期血流充盈过度
- C、右心室肌纤维伸长
- D、右心室逐渐扩张增厚
- E、在心功能代偿期，左心排血量增加

正确答案：E

5、常见多重耐药菌包括（）

- A、以上都包括
- B、多重耐药/泛耐药铜绿假单胞菌（MDR/PDR-PA）
- C、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）

- D、耐万古霉素肠球菌（VRE）
- E、耐碳青霉烯类抗菌药物鲍曼不动杆菌（CR-AB）

正确答案：A

6、柏油样便是指消化道出血量最少在：

- A、40ml
- B、20ml
- C、60ml
- D、100ml
- E、80ml

正确答案：C

7、手术错误造成的输尿管梗阻可以（）

- A、引起血尿
- B、常见于腹部钝器伤
- C、导致肾积水
- D、罕见于盆腔手术
- E、导致肾萎缩

正确答案：C

8、适用于皮肤、粘膜消毒的化学消毒剂是（）

- A、过氯化氢
- B、戊二醛
- C、氯己定
- D、过氯乙酸
- E、乙醇

正确答案：C

9、长期卧床的心力衰竭患者，其水肿最易出现的部位是（）？

- A、胫前
- B、腰骶部
- C、颜面
- D、腹部
- E、踝部

正确答案：B

10、颈椎术后脑脊液漏患者卧位位为

- A、头低足高位
- B、头高足低位

- C、俯卧位
- D、其他
- E、半坐卧位

正确答案：D

11、下列可合并嗅神经和视神经损伤的颅骨骨折是（ ）

- A、颅中窝骨折
- B、线形骨折
- C、颅盖骨折
- D、颅前窝骨折
- E、颅后窝骨折

正确答案：D

12、患者男性，62岁。夜间尿频，后逐渐出现排尿时间延长，排尿不净，今下午因排不出尿，小腹胀痛来院就诊。护士首先应处理的是（ ）

- A、急诊做前列腺摘除术
- B、膀胱造瘘
- C、膀胱穿刺抽尿
- D、压腹部排尿
- E、导尿并留置导尿管

正确答案：E

13、关于颅内肿瘤切除术后创腔引流，下列说法正确的是（ ）

- A、引流 3~4 日后，当血性脑脊液转清，即可拔除引流管
- B、引流 5~6 日后，当没有脑脊液流出，即可拔除引流管
- C、术后创腔引流袋放置于头旁枕上或枕边，高度应高于头部创腔水平面
- D、术后 48 小时后，可将引流袋略抬高，以期较快引流出创腔内的液体
- E、创腔引流的目的是防止形成脑脊液漏

正确答案：A

14、女性，45岁，行 ESWL，分析结石成分为尿酸结石，为防止结石复发出院医嘱中不应包括以下哪项（ ）

- A、少饮牛奶
- B、碱化尿液
- C、多吃动物蛋白少吃蔬菜
- D、少食食盐
- E、少吃蔬菜多吃动物蛋白

正确答案：B

15、危重症患者肠内营养采用（ ）更能减少胃内容物反流及误吸风险，从而降低 VAP 的发生。

- A、以上均正确
- B、按顿喂养
- C、持续喂养
- D、间断喂养
- E、以上均不正确

正确答案：C

16、一肺结核患者服用抗痨药后尿呈红色，怀疑为血尿，此种异常现象可能与下列哪种药物有关（ ）

- A、异烟肼
- B、左氧氟沙星
- C、吡嗪酰胺
- D、乙胺丁醇
- E、利福平

正确答案：E

17、患者男性，68 岁。肺炎，高热，呼吸困难，咳大量脓臭痰，每日约 60ml。胸片示右胸下部大片暗影，胸腔穿刺抽出脓液后脓液未见减少，其治疗方法是（ ）

- A、抗生素治疗
- B、胸腋后线第 6 肋间闭式引流
- C、锁骨中线第 2 肋间闭式引流
- D、开胸手术
- E、胸腔穿刺抽脓

正确答案：B

18、脊柱肿瘤按性质来分恶性肿瘤包括

- A、骨巨细胞瘤
- B、神经纤维瘤
- C、骨肉瘤
- D、骨软骨瘤
- E、内生软骨瘤

正确答案：C

19、下列哪项不是肌松剂在机械通气时的主要适应症

- A、重症哮喘

- B、使用镇静剂之前
- C、应用高水平 PEEP
- D、急性呼吸窘迫综合征（ARDS）
- E、气管插管

正确答案：B

20、病人气管插管，呼吸机辅助呼吸，护士 A 及 B 在给予病人翻身时，不慎牵拉管道，造成管道脱出，这些应立即（ ）

- A、氧管接呼吸囊、挤压呼吸囊
- B、气道湿化
- C、气管切开
- D、不予理会
- E、吸痰

正确答案：A

21、伴有膝关节畸形、屈伸活动明显受限的骨关节炎最佳治疗方案是（ ）

- A、理疗
- B、关节置换
- C、关节镜微创技术
- D、热敷
- E、局部封闭止痛

正确答案：B

22、手法检查肋骨骨折的可靠措施是

- A、皮下瘀斑或皮下出血
- B、局部皮下气肿
- C、局部痛觉过敏
- D、有直接和间接压痛
- E、局部肿胀

正确答案：D

23、患者蛛网膜下腔麻醉术后持续头痛，抬头或坐起时加重，一般止痛药无效，该患者头痛的原因可能是（ ）

- A、血压低
- B、脑血管痉挛
- C、脑脊液外漏
- D、颅内压增高
- E、血压高

正确答案：C

24、由肾脏产生的最终合成血管紧张素Ⅱ的激素是

- A、促红细胞生成素
- B、缓激肽
- C、前列腺素
- D、激肽素
- E、肾素

正确答案：E

25、小脑出血的主要特点：

- A、呼吸变深而有鼾声
- B、脉搏慢而充实
- C、突然意识丧失
- D、以上都不是
- E、瞳孔缩小呈针尖样

正确答案：D

26、骨性关节炎的早期微创手术是指（）？

- A、局部穿刺技术
- B、关节镜微创技术
- C、截骨技术
- D、保守治疗
- E、关节置换手术

正确答案：B

27、膝关节骨关节炎首先累及

- A、关节软骨
- B、滑膜
- C、滑膜或骨
- D、软骨下骨
- E、韧带

正确答案：A

28、高血压患者出现咳嗽，咳白色泡沫痰，端坐呼吸。考虑是（）？

- A、支气管扩张症
- B、左侧心衰衰竭
- C、阻塞性肺气肿
- D、支气管哮喘

E、支气管炎

正确答案：B

29、VAP 常见危险因素不包括（）

A、呼吸机管路积水过多

B、雾化器储水罐污染

C、高龄

D、床头抬高

E、误吸

正确答案：D

30、发生外科感染的必要条件不包括（）

A、人体抵抗能力有一定缺陷

B、组织内的有氧环境

C、病菌在组织内大量繁殖

D、外界病菌大量侵入组织

E、人体正常菌群变成病菌

正确答案：B

31、血气分析时，标本的采集处理中，以下做法错误的是（）

A、立即送检

B、标本须标注患者吸氧浓度

C、采集动脉血

D、抽血后将针头刺入胶塞摇匀血液

E、不需要与空气隔离

正确答案：E

32、风心病患者，突发呼吸困难，咳粉红色泡沫痰，血压 120/80mmhg，心率 140 次/分，心律绝对不齐。首选药物（）？

A、胺碘酮

B、普罗帕酮（心律平）

C、可拉明

D、毛花昔丙（西地兰）

E、利多卡因

正确答案：D

33、I 型糖尿病的发病机制是（）

A、供血不足

B、自身免疫

- C、摄糖过多
- D、代谢不良
- E、细菌感染

正确答案：B

34、哪项不属于气管切开术后护理要点()

- A、防止套管脱出
- B、防止感染
- C、防止套管阻塞
- D、维持下呼吸道通畅
- E、禁声

正确答案：E

35、吸气性呼吸困难时，下列哪项叙述不正确

- A、呼吸时伴有哮鸣音
- B、吸气费力
- C、重者出现吸气时“三凹征”
- D、高调吸气性喉鸣
- E、常伴有干咳

正确答案：A

36、张力性气胸的最主要病理生理变化是

- A、纵膈摆动
- B、血氧分压下降
- C、反常呼吸运动
- D、进行性伤侧肺压缩
- E、呼吸死腔增加

正确答案：D

37、脑出血最好发的部位在：

- A、小脑
- B、内囊
- C、中脑
- D、大脑皮质
- E、桥脑

正确答案：B

38、下列吸痰法操作正确的是（）

- A、每根吸痰管可用一日



- B、每次吸痰时间不多于 30s
- C、吸痰时宜反复上下提插以保证吸净
- D、使用前检查吸引器功能
- E、每次吸痰时间不少于 15s

正确答案：D

39、脓胸的确诊依赖于( )

- A、胸膜腔穿刺
- B、胸部 X 线检查
- C、胸部超声波检查
- D、纤维支气管镜检查
- E、胸部 CT 检查

正确答案：A

40、呼吸机气道高压报警限应设置在：

- A、气道峰值压以上 15 cmH<sub>2</sub>O
- B、气道峰值压之上 10 cmH<sub>2</sub>O
- C、比平均气道压高 10 cmH<sub>2</sub>O
- D、气道峰值压之下 10 cmH<sub>2</sub>O
- E、气道峰值压之间

正确答案：B

41、张力性气胸的急救处理首先应该 ( )

- A、立即排气解除胸膜腔的高压状态
- B、气管切开
- C、气管内插管辅助呼吸
- D、剖胸探查
- E、输血，输液治疗休克

正确答案：A

42、肱骨髁上骨折是指肱骨髁上方 ( )

- A、2cm 之内的骨折
- B、1cm 之内的骨折
- C、3cm 之内的骨折
- D、0.5cm 之内的骨折
- E、4cm 之内的骨折

正确答案：A

43、急性呼吸衰竭的营养治疗原则是

- A、低蛋白、高碳水化合物
- B、低脂、高蛋白
- C、高脂、低碳水化合物
- D、低脂、低碳水化合物
- E、低脂、高碳水化合物

正确答案：C

44、出现分钟呼气量低限报警，可能的原因正确的是（ ）

- A、潮气量设置过高
- B、PEEP 设置为 0
- C、患者自主呼吸增强
- D、呼吸机湿化瓶液体过多
- E、气囊压力不足

正确答案：E

45、感觉性失语，病变部位在优势半球的：

- A、额下回后部
- B、颞上回后部
- C、顶上小叶
- D、枕叶
- E、角回

正确答案：B

46、女性，57 岁，憋气 1 个月，以右侧胸腔积液性质待查入院。2 年前曾因右侧乳腺癌行手术治疗，术后曾行放疗。胸腔积液为血性，比重 1.030，pH7.42，LDH（乳酸脱氢酶）800U/L，ADA（腺苷脱氨酶）10U/L。该患者最可能的诊断是（ ）

- A、脓胸
- B、恶性胸腔积液
- C、结核性胸膜炎
- D、肺梗塞
- E、血胸

正确答案：B

47、患者女，30 岁。因外伤后感染，发生了气性坏疽，最重要的治疗是（ ）

- A、应用抗生素
- B、高压氧治疗

C、纠正水和电解质失调

D、彻底清创

E、解热、镇痛

正确答案：D

48、出现黑便其出血量至少应是

A、30ml

B、400ml

C、60ml

D、5ml

E、100ml

正确答案：C

49、患者男性，24岁。头部外伤后持续头痛、呕吐数次，嗜睡，急诊入院，CT检查显示颅内占位，初步诊断：颅内占位伴颅内压增高。病人如果采用脱水治疗，下列描述不正确的是（）

A、同时使用利尿剂效果更好

B、停用脱水剂时，应逐渐减量

C、20%甘露醇 250ml，30分钟内快速静脉滴注

D、脱水治疗期间，应准确记录出入量

E、1~2小时后甘露醇可重复使用

正确答案：E

50、以下不属于感染性医疗废物的是（）

A、医用针头

B、棉签

C、病理蜡块

D、血清标本

E、敷料

正确答案：C

51、某1型糖尿病患者，16岁，消瘦，“三多一少”症状明显，其饮食总热量应（）

A、按标准体重计算再酌增

B、按标准体重计算再酌减

C、按实际体重计算再酌减

D、按实际体重计算再酌增

E、按标准体重减少10%

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/377024116116006042>