

三基理论知识模拟题库含答案

1、发热门诊空调通风系统做到（）设置，不正确的是（）

- A、独立
- B、连通
- C、联合
- D、共用

答案：BCD

2、原发性肝癌伴癌综合征的表现有（）

- A、伴高糖血症
- B、伴红细胞增多症
- C、伴低钙血症
- D、伴高胆固醇症
- E、伴血小板增多症

答案：BDE

3、高渗性脱水易出现（）

- A、口渴
- B、休克
- C、尿少
- D、脱水热
- E、皮肤弹性降低

答案：ACD

4、有关无菌持物钳的使用，正确的是

- A、无菌持物钳应浸泡在盛有消毒液的大口容器或干燥无菌容器内
- B、干燥无菌持物钳和容器应每4小时更换1次
- C、取放无菌持物钳时应钳端闭合，不可触及容器边缘
- D、无菌操作中取物品都须用无菌持物钳
- E、到远处取物时，应将容器一起搬移，就地取出使用

答案：ABCE

5、导致血浆清蛋白下降的原因有（）

- A、肝硬化
- B、严重营养不良
- C、肾病综合征
- D、慢性感染
- E、恶性肿瘤

答案：ABCDE

6、关于氨基酸活化的正确叙述是（）

- A、在细胞质中进行
- B、需氨基酰 tRNA 合成酶催化
- C、氨基酸以非共价键结合到特异的 tRNA 分子上
- D、消耗 ATP
- E、消耗 GTP

答案：ABD

7、医疗机构预检分诊、普通门急诊新冠肺炎感染防控工作指引中环境、物体表面和诊疗用品等的清洁消毒各门诊、急诊卫生间每天 2 次用浓度为（）含氯消毒剂溶液擦拭消毒，不正确的是（）

- A、500mg/L
- B、1000mg/L
- C、1500mg/L
- D、2000mg/L

答案：ABC

8、糖尿病饮食治疗的原则包括

- A、按理想体重计算总热量
- B、体重超过理想体重 20%者应减少总热量
- C、饮食分配应根据病人习惯，最好少吃多餐
- D、饮食固定后则不要更改
- E、糖类占饮食总热量的 50%-60%

答案：ABC

9、引起牙齿楔状缺损的原因有（）

- A、细菌感染
- B、横刷牙法刷牙
- C、过多食用糖类
- D、牙颈部结构薄弱
- E、牙颈部应力集中

答案：BDE

10、新冠病毒经呼吸道飞沫直径一般在（）密闭场所、长时间暴露、高浓度的环境中存在气溶胶（）传播的可能，以下错误的是。、、

- A、2-5um， <5um
- B、5-10um， >5um
- C、5-10um， <5um
- D、2-5um， >4um

答案：ABD

11、脑血栓形成在急性期的治疗方法可选用（）

- A、抗血小板黏附聚集
- B、尼莫地平拮抗细胞内钙超载
- C、头部或全身亚低温治疗
- D、降纤酶降纤治疗
- E、用依达拉奉清除氧自由基

答案：ABCDE

12、低血糖的临床表现包括（）。

- A、饥饿感
- B、严重心律失常
- C、便频
- D、心悸
- E、肢体颤抖

答案：ADE

13、颅内肿瘤应与下列哪些疾病鉴别（）

- A、脑脓肿
- B、脑结核瘤
- C、慢性硬膜下血肿
- D、假性脑瘤
- E、先天性脑积水

答案：ABCDE

14、关于胸腺瘤的描述，正确的有（）

- A、多位于前上纵隔
- B、男女发病率相近
- C、恶性胸腺瘤多伴有重症肌无力
- D、恶性胸腺瘤病人术后应予放疗
- E、重症肌无力病人多伴有胸腺瘤或胸腺异常增生

答案：ABCDE

15、尿路感染的确诊下列哪几项正确（）

- A、尿感的确诊只能确立在尿细菌定量培养的基础上
- B、只要清洁中段尿和导尿培养出有细菌生长，即可确诊
- C、只有膀胱穿刺尿作细菌定性培养，才能确诊
- D、如果2次中段尿培养均为 $10^5/\text{mL}$ ，且为同一菌种，即使无感染症状，

也能确诊

E、尿细胞培养含菌量 $>10^4$ /mL，即可确诊

答案：AD

16、下列哪些是胆碱能神经纤维（）

A、交感节前纤维

B、支配汗腺的交感节后纤维

C、副交感节后纤维

D、交感舒血管纤维

E、躯体运动神经纤维

答案：ABCDE

17、医务人员洗手的指征包括

A、接触病人前后

B、进行无菌技术操作前后

C、戴口罩和穿、脱隔离衣前后

D、接触血液、体液和被污染的物品前后

E、脱手套后

答案：ABCDE

18、下述食物中毒的流行特征中哪些是正确的

A、潜伏期短，一般在半小时至24小时内

B、所有病人均有相同的症状或症状基本相似

C、病人有同一进食史，无进食史者不发病

D、停止食用该食物并改善卫生状况后发病很快停止

E、严格追查可具有人与人之间接触传染的可能性

答案：ABCD

19、发热诊室应当保持每日通风（）次，每次不少于（）分钟，以下说法错误的是

A、1，15

B、2-3，15

C、1，30

D、2-3，30

E、 >3 ，15

答案：ABCE

20、使用电动洗胃机洗胃时应

A、注意吸引管通畅

B、严禁灌入过多的洗胃液

C、接妥地线

- D、洗胃时正压表不超过 40kPa
- E、污水瓶内排出液量应予灌注量相等

答案：ABCD

21、防控新冠提出的‘四早’包括（）

- A、早发现
- B、早报告
- C、早诊断
- D、早隔离
- E、早治疗

答案：ABDE

22、针对新型冠状病毒，以下哪种条件不能杀灭病毒？（）

- A、在 56℃，30 分钟条件下
- B、在 26℃，20 分钟条件下
- C、在 16℃，10 分钟条件下
- D、在 0℃，5 分钟条件下
- E、在 100℃，30 分钟条件下

答案：BCDE

23、关于新型冠状病毒感染的流行病学特点，以下正确的是？（）

- A、新型冠状病毒在潜伏期无传染性。
- B、在相对封闭的环境中长时间暴露于高浓度气溶胶情况下存在经气溶胶传播的可能。
- C、新冠肺炎发病后 5 天内的传染性较强。
- D、人群普遍易感。

答案：BCD

24、感染性休克控制感染的主要措施包括

- A、处理原发感染灶
- B、应用抗菌药物
- C、改善病人一般情况
- D、增强病人抵抗力
- E、应用大量激素

答案：ABCD

25、已知新型冠状病毒传染途径包括那些（）

- A、接触传播
- B、飞沫传播
- C、土壤传播

D、气溶性传播

E、粪便传播

答案：ABDE

26、白血病联合化疗时应注意哪些事项（）

A、积极防治感染

B、密切随访周围血常规

C、当粒细胞 $<0.5 \times 10^9/L$ 时应停止化疗

D、注意碱化尿液

E、明显贫血时可输血

答案：ABCDE

27、下列哪些是预防接种的异常反应

A、过敏性休克

B、接种部位 24 小时内炎症反应

C、变态反应性脑脊髓炎

D、无菌性脓疡

E、血清病

答案：ACDE

28、有关腺样囊性癌描述正确的有（）

A、又名圆柱瘤

B、浸润性不强

C、血行转移率高

D、区域淋巴结转移率高

E、肿瘤细胞常沿神经生长

答案：ACE

29、下列哪些药物具有舒张支气管作用（）

A、 β 受体阻滞药

B、胆碱能受体激动药

C、茶碱

D、 $\beta 1$ 受体激动药

E、 $\beta 2$ 受体激动药

答案：CE

30、等渗性缺水常见的病因有（）

A、肠痿

B、大量呕吐

C、大创面慢性渗液

D、高热、大量出汗

E、腹腔内感染

答案：ABE

31、有关健康教育的说法以下哪些是正确的

A、是有计划、有组织、有系统的教育活动

B、是单纯的卫生知识的传播

C、促进人们自愿地采用有利于健康的行为

D、消除或降低危险因素，降低发病率、伤残和死亡率

E、提高生活质量，创造有利的社会环境

答案：ACDE

32、增强神经肌肉接头传递的因素有（）

A、Ca²⁺

B、新斯的明

C、K⁺

D、胆碱酯酶

E、箭毒

答案：AB

33、大量输血时可致（）

A、心脏负荷加重

B、凝血异常

C、枸橼酸中毒

D、高脂血症

E、低蛋白血症

答案：ABC

34、致听力损害的药物有（）

A、头孢氨苄

B、卡那霉素

C、依他尼酸

D、链霉素

E、呋塞米

答案：BCDE

35、胸膜腔闭式引流不畅的原因是

A、引流导管残渣阻塞

B、引流管侧孔紧贴胸壁

C、胸壁置管伤口太小

D、引流管内压力太大

E、引流管扭曲

答案：ABCE

36、特异性感染包括（）

A、结核

B、霉菌

C、破伤风

D、气性坏疽

E、炭疽

答案：ACDE

37、荨麻疹的特点有（）

A、由真皮浅层急性水肿引起

B、边缘规则

C、常伴剧痒

D、时起时消

E、消后不留瘢痕

答案：ACDE

38、糖皮质激素在 AIL 和 ARDS 的治疗中具有下列哪些作用（）

A、防止或减轻高呼吸道压对肺的损伤

B、减少肺泡毛细血管内膜损伤

C、减少肺微血管内血栓形成

D、拮抗肺内炎症

E、促使肺间质液吸收并抑制后期肺纤维化

答案：BCDE

39、胆道系统超声检查，正确的是（）

A、检查前须禁食 8~12 小时

B、USG 是首选的诊断方法

C、正常时，普通超声可观察到肝内三级以上的胆管

D、胆总管位于门静脉的后方

E、胆总管下段位于腔静脉前方

答案：ABE

40、含氯消毒剂配制后使用时间不应超过（），错误的选项是（）

A、4h

B、24h

C、2h

D、12h

答案：ACD

41、关于医疗废物运送与暂时储存要求不正确的是（）

- A、每日由清洁员或护理人员定时收集各临床科室的医疗废物
- B、收集后的医疗废弃物经医院电梯运送，并进行登记
- C、登记内容包括医疗废物来源、种类、重量、数量、经办人签名等
- D、登记资料至少保存1年
- E、医疗废物暂时储存时间不超过3日

答案：ABDE

42、目前确定的新型冠状病毒的传播途径，以下说法正确的是（）。

- A、接触传播
- B、呼吸道~飞沫传播
- C、气溶胶传播
- D、媒介昆虫传播
- E、其他传播途径尚待明确

答案：ABC

43、颅内压增高是神经外科常见的临床病理综合征，是以下疾病的共有征象（）

- A、颅脑损伤
- B、脑肿瘤
- C、脑出血
- D、脑积水
- E、颅内炎症

答案：ABCDE

44、新冠病例血清标本的采集要求包括（）

- A、尽量采集急性期、恢复期双份血清。
- B、第一份血清应当尽早（最好在发病后7天内）采集
- C、第二份血清应当在发病后第3~4周采集。
- D、采集量10ml

答案：ABC

45、慢性疼痛的治疗药物包括

- A、麻醉性镇痛药
- B、解热消炎镇痛药
- C、催眠镇痛药
- D、抗癫痫药

E、抗抑郁药

答案：ABCDE

46、关于手套的使用描述正确的是（）

A、接触患者粘膜时应戴无菌手套

B、接触患者破损的皮肤时应戴无菌手套

C、戴手套可替代洗手或卫生手消毒

D、进行有可能接触患者血液、体液的护理工作时应戴清洁手套

答案：ABD

47、关于新型冠状病毒，下列说法正确的有（）

A、冠状病毒因外形类似王冠而得名。

B、它是广泛存在的一类容易变异的病毒。

C、常见冠状病毒仅感染脊椎动物。

D、它能引起人和动物呼吸道、消化道和神经系统疾病。

E、常见冠状病毒仅感染无脊椎动物

答案：ABCD

48、角膜的组织结构特点是（）

A、具有透明性

B、含丰富的感觉神经

C、无血管

D、角膜前面有泪膜

E、由致密且相互交错的胶原纤维组成

答案：ABC

49、儿童新型冠状病毒肺炎的临床表现中，描述正确的是（）

A、出现气促（ <2 月龄、 $RR \geq 60$ 次/分； $2 \sim 12$ 月龄、 $RR > 50$ 次/分； $1 \sim 5$ 岁， $RR \geq 40$ 次/分； >5 岁， $RR > 30$ 次/分），除外发热和哭闹的影响

B、静息状态下，指端氧饱和度 $\leq 93\%$

C、辅助呼吸（呻吟、鼻翼扇动、三凹症）

D、出现嗜睡、惊厥，拒食或喂养困难，有脱水征

E、以上均不正确

答案：ABCD

50、非特异性感染的演变，可能出现的结果是（）

A、炎症扩散

B、炎症好转

C、局部化脓

D、转变为特异性感染

E、转变为慢性炎症

答案：ABCE

51、ABO 血型“改变”可见于（）

A、肠道腺癌病人

B、白血病病人

C、骨髓瘤病人

D、肺炎病人

E、自身免疫性溶血性贫血病人

答案：ABC

52、“1、2、3”灌肠溶液的组成是

A、50%硫酸镁 30mL

B、甘油 60mL

C、新霉素溶液 30mL

D、生理盐水 90mL

E、温开水 90mL

答案：ABE

53、有关恶性肿瘤的临床表现，下列哪些是正确的（）

A、疼痛为初发症状

B、常易出血和形成溃疡

C、局部不一定扪及肿块

D、可出现淋巴道和血道转移

E、消瘦、乏力发热常为晚期表现

答案：BCDE

54、在间接抗球蛋白试验中，可用下列哪些方法加快致敏速度或增强敏感性

A、酶法

B、低离子介质法

C、牛白蛋白法

D、改变 pH

E、聚乙二醇法

答案：ABCE

55、过敏性紫癜临床表现包括（）

A、皮肤紫癜

B、恶心、腹痛

C、游走性关节肿痛

- D、血尿
- E、蛋白尿

答案：ABCDE

56、淋巴器官包括（）

- A、淋巴结
- B、脾
- C、扁桃体
- D、胸腺
- E、肝

答案：ABCD

57、除性传播疾病外，沙眼衣原体抗体阳性也可见于

- A、中耳炎
- B、成人包涵体结膜炎
- C、溃疡性角膜炎
- D、非淋菌性尿道炎
- E、无不良反应

答案：BD

58、周围性发绀的特点是

- A、指端有发绀，而口唇无发绀
- B、可见于休克患者
- C、见于下肢动静脉瘘
- D、见于严重的动脉粥样硬化所致的周围血管病变
- E、无不良反应

答案：ABD

59、急性上消化道出血是指发生在下列哪些器官部位的急性出血（）

- A、食管
- B、胃十二指肠
- C、回肠
- D、胰腺
- E、胆道

答案：ABDE

60、道德的特点包括（）

- A、稳定性
- B、规范性
- C、天赋性

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/378024026055006034>