

医学试题与答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1. 术后发生 VTE 的因素（ ）

- A、手术时间
- B、创伤大小
- C、卧床时间
- D、以上都对

正确答案：D

2. 新生儿胃食管反流最常见的症状为（ ）

- A、呼吸增快
- B、体重不增
- C、腹泻
- D、呛咳
- E、反复溢乳

正确答案：E

3. 母乳的钙磷比例通常是（ ）

- A、2:1
- B、1:3
- C、1:2
- D、3:1
- E、1:1

正确答案：A

4. 巨幼细胞性贫血是由于（ ）

- A、缺乏铁
- B、缺乏维生素 C
- C、缺乏维生素 K
- D、缺乏叶酸和维生素 B12
- E、缺乏维生素 A

正确答案：D

5. 基于目前的流行病学调查, 潜伏期多为

- A、3~7 天
- B、4~6 天
- C、14~21 天
- D、1~2 天

E、2~10 天

正确答案：A

6. 宫颈癌发病的平均年龄约为()

A、51 岁

B、54 岁

C、53 岁

D、52 岁

E、50 岁

正确答案：D

7. 乳腺癌淋巴转移最常见部位为()

A、胸骨旁淋巴结

B、患侧腹股沟淋巴结

C、锁骨下淋巴结

D、患侧腋窝淋巴结

E、腹壁淋巴结

正确答案：D

8. 常用的液体推进剂中属于高毒性的是()

A、混肼-50

B、发烟硝酸

C、四氧化二氮

D、偏三甲基肼

E、甲基肼

正确答案：E

9. 上消化道出血最常见的原因是()

A、急性胃黏膜损害

B、消化性溃疡

C、慢性胃炎

D、食管胃底静脉曲张

E、胃癌

正确答案：B

10. 战伤后血胸, 已做肋间插管引流, 第一次引流出血性胸液 1200ml, 以后约 100ml, 3 小时后减至 50ml, 血压 90/70mmHg, 心率 110 次/分, 面色苍白, 呼吸 28 次/分, 气管移位不明显, 最恰当的处理是()

A、吸氧

- B、开胸探察止血
- C、升压药
- D、输血,继续观察

正确答案: D

11. 战时卫生防疫侦察是为收集和查明军队活动地区的卫生状况和() 状况所进行的侦察

- A、化学武器的沾染
- B、病理学
- C、政府机构
- D、流行病学

正确答案: D

12. 发现病人私自外出未归, 护士首先()。()

- A、通知值班医生, 与家属联系, 了解病人的可能去向
- B、详细记录事件于护理记录单上, 妥善保管好用物
- C、通知值班医生, 在院内共同寻找病人
- D、报告总值班室, 在院内寻找病人

正确答案: A

13. 下列叙述错误的是()

- A、转科评估记录不用归档
- B、术后评估记录, 在术后首次评估记录中
- C、首次 VTE 评估结果记录于入院记录中
- D、转科评估结果及预防措施记录于转入护理记录中

正确答案: A

14. DVT 临床分期属于急性期的是()

- A、指发病后 7 天内
- B、指发病后 5 天内
- C、指发病一月内
- D、发病一个月以后

正确答案: A

15. 蛔虫的感染途径是()

- A、接触疫水
- B、丝状蚴浸入皮肤
- C、呼吸道吸入感染期虫卵
- D、经口吞入丝状蚴

E、经口吞入感染期虫卵

正确答案：E

16. 骨关节结核绝大部分继发于()

A、肺结核

B、血液系统结核

C、淋巴系统结核

D、泌尿系统结核

E、消化系统结核

正确答案：A

17. 肺心病发生的先决条件是()

A、右心室肥大

B、肺动脉高压形成

C、血液粘稠度增加

D、缺氧

E、右心功能不全

正确答案：B

18. 患者男性, 50 岁。近 1 个月来干咳, 伴有低热、盗汗, 自觉乏力。拟诊肺结核, 为进一步明确诊断, 最重要的检查是()

A、痰菌检查

B、胸部 CT 检查

C、痰细胞学检查

D、支气管碘油造影

E、纤维支气管镜检查

正确答案：A

19. 怎样评估中心静脉导管的通畅度()

A、导管内有回血

B、推注有阻力

C、导管固定良好

D、打开水止, 查看重力滴速

正确答案：D

20. 战斗减员组成中, 主要是战伤减员, 其次是()

A、疾病

B、意外死亡

C、被俘

D、阵亡

正确答案：D

21. 心跳停止时间是指从循环停止到()

A、重建有效人工循环

B、意识恢复

C、心脏自动节律恢复

D、呼吸心跳恢复正常

E、自主呼吸恢复

正确答案：A

22. 下列哪种临床表现可诊断为关节脱位()

A、功能障碍

B、疼痛

C、关节盂空虚

D、肿胀

正确答案：C

23. 急性脓胸患者每次抽脓量不超过()

A、800mL

B、1100mL

C、1200mL

D、1000mL

E、900mL

正确答案：D

24. 放射性落下灰引起皮肤损伤的吸收剂量要在()

A、1Gy 以上

B、2Gy 以上

C、4Gy 以上

D、6Gy 以上

E、8Gy 以上

正确答案：D

25. 急救复苏时心外按压次数与人工呼吸次数比为()

A、5:2

B、15:2

C、15:1

D、30:1

E、30:2

正确答案：E

26. 关于胸部创伤, 下列哪项是正确的()

- A、肋骨骨折好发于 4-7 肋
- B、间接暴力所致肋骨骨折易产生气胸或血气胸等并发症
- C、多根肋骨骨折可造成浮动胸壁
- D、张力性气胸常伴有反常呼吸运动

正确答案：D

27. 高原严重战伤后最常见的合并症是()

- A、应激性溃疡
- B、脂肪栓塞
- C、失血性休克
- D、ARDS
- E、脑水肿

正确答案：C

28. 必须优先抢救的急症有()

- A、窒息
- B、心脏骤停
- C、大出血
- D、开放性气胸
- E、以上全是

正确答案：E

29. 清创术后二期缝合指()

- A、清创后 4 天对伤口做的缝合
- B、清创后 5 天对伤口做的缝合
- C、清创后 6 天对伤口做的缝合
- D、清创后 7 天对伤口做的缝合
- E、清创后 8 天以上对伤口做的缝合

正确答案：E

30. 下列哪项不符合开放性气胸的描述()

- A、气短
- B、胸壁有吮吸性伤口
- C、肯定有咯血
- D、胸壁有皮下气肿

E、胸壁有伤口

正确答案：C

31. 下列哪项不属于. 输液外渗的发生机制?()

A、血管受药物的化学刺激

B、液体静脉压增加

C、药物损伤血管内皮引起液体扩散

D、液体持续滴注, 胶体渗透压升高

正确答案：D

32. 患者女性, 35 岁。10 年前分娩时曾有 1 次癫痫发作史, 之后每年发作 1~2 次。昨日洗澡时突然意识丧失, 四肢抽搐, 牙关紧闭, 心率增快, 血压升高。对该患者病情诊断最有意义的是()

A、脑电图

B、脑脊液检查

C、脑血管造影

D、病史和临床表现

E、脑部 CT 检查

正确答案：D

33. 以下哪项可反映卫勤部门的医疗卫生工作量()

A、被俘数

B、失踪数

C、卫生减员数

D、阵亡数

正确答案：C

34. 发生溶血反应时, 护士首先应()

A、换另一袋血进行输注

B、热敷腰部, 静脉注射碳酸氢钠

C、控制感染, 纠正水电质紊乱

D、通知医生和家属, 安慰患者

E、停止输血, 保留余血

正确答案：E

35. 早产儿的特点有()

A、乳腺有结节

B、指甲达到指尖

C、头发分条清楚

D、足底纹理少

E、皮肤毳毛少

正确答案：D

36. 我军现行的战时医疗救治体制主要按照()的原则进行

A、后送救治

B、就地救治

C、集中救治

D、分区分级救治, 治送结合

正确答案：D

37. 目前国内性传播性疾病中占首位的是()

A、滴虫性阴道炎

B、尖锐湿疣

C、淋病

D、老年性阴道炎

E、念球菌阴道炎

正确答案：C

38. 在野战条件下, 情况紧急时, 可输 O 型血, 但总量不超过()

A、100ml

B、1000 ml

C、1500 ml

D、400 ml

正确答案：D

39. 预防压疮非常重要, 压疮预防包括()。

A、识别高危人群

B、保持皮肤完整性, 减少组织受压

C、告知患者及家属压疮预防的相关知识

D、以上都是

正确答案：D

40. 十二指肠溃疡好发部位是()

A、升部

B、球部

C、水平部

D、降部和升部

E、降部

正确答案：B

41. 脾切除时门静脉血源减少量为()

- A、30%~50%
- B、20%~30%
- C、50%~70%
- D、10%~20%
- E、20%~40%

正确答案：E

42. 近年的现代战争如伊阿战争中统计表明, 90%的伤员死亡发生在()

- A、后送途中
- B、到达救治机构后
- C、到达救治机构前
- D、伤后 0-15 分钟
- E、受伤当时

正确答案：C

43. 下列哪项不属于 VTE 发生危险因素()

- A、酗酒
- B、骨折
- C、肥胖
- D、高龄

正确答案：A

44. 国内普遍采用的围生期定义是()

- A、妊娠中期、妊娠晚期、分娩过程
- B、妊娠晚期、分娩过程、新生儿期
- C、妊娠晚期、分娩过程、新生儿早期
- D、妊娠中期、妊娠晚期、新生儿期
- E、妊娠早期、妊娠中期、妊娠晚期

正确答案：C

45. 正常新生儿出生第一天应处于的最适宜中性温度是()

- A、30℃
- B、34℃
- C、36℃
- D、28℃
- E、32℃

正确答案：B

46. 股骨上 1/3 骨折, 近端骨折片因肌肉收缩, 在 X 线片上的移位方向为()

- A、嵌插
- B、向后成角
- C、屈曲外展
- D、向外成角

正确答案：D

47. 次声损伤的物理防护主要是()

- A、消声
- B、屏蔽
- C、遮挡
- D、共振
- E、反射

正确答案：A

48. 灭菌物品存放的有效期与哪一项有关()。

- A、清洗方式
- B、包装方法
- C、包装材料
- D、灭菌方式

正确答案：C

49. 引起肝硬化的病因不包括()

- A、营养障碍
- B、酒精中毒
- C、胆汁淤积
- D、甲型肝炎
- E、血吸虫病

正确答案：D

50. 有关骨折急救处理时妥善固定的目的, 下列哪项是错误的()

- A、避免骨折端再搬运过程中加重软组织损伤
- B、便于运输
- C、使移位的骨折得到适当的矫正
- D、止痛可防止休克

正确答案：B

51. 预防压力性损伤最重要的措施包括()。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/378123105122006143>