

2024 年四川省成都市护士基础理论知识考试题库及答案解析

医院科室：_____ 姓名：_____ 考场：_____ 考号：_____

一、选择题

1. 某年轻男性患者.劳动时突感右侧胸部撕裂样疼痛，半小时后急诊入院。查体：大汗淋漓，呼吸急促，气管左移，右侧呼吸音消失。该患者最可能的诊断为（ ）

- A、胸腔积液
- B、干性胸膜炎
- C、右侧张力性气胸
- D、肺气肿
- E、大叶性肺炎

答案：

C

解析：根据患者的症状和体征，可以考虑以下几个诊断：胸腔积液、干性胸膜炎、张力性气胸、肺气肿、大叶性肺炎。其中，胸腔积液和干性胸膜炎一般不会出现气管左移和呼吸音消失的情况，排除 A、B 两项。肺气肿和大叶性肺炎也不太可能出现气管左移和呼吸音消失的情况，因此排除 D、E 两项。综合分析，该患者最可能的诊断为右侧张力性气胸，应及时进行胸腔穿刺或胸腔闭式引流等治疗措施。因此，答案选 C。

2. 女性，27 岁，外伤造成肱骨干骨折合并桡神经损伤，其受伤早期最可能发生()

A、银叉畸形

B、垂腕畸形

C、爪形手

D、枪刺样畸形

E、腕关节僵硬

答案：

B

解析： 本题考查的是外伤造成肱骨干骨折合并桡神经损伤后受伤早期最可能发生的畸形。肱骨干骨折合并桡神经损伤后，常见的手部畸形有银叉畸形、垂腕畸形、爪形手、枪刺样畸形和腕关节僵硬等。其中，垂腕畸形是最常见的手部畸形，因为桡神经损伤会导致手腕屈曲肌群无法正常收缩，导致手腕下垂。因此，本题的正确答案为 B。

3. 病室的湿度过低病人会出现 ()

A、口渴咽痛.

B、烦躁不安.

C、肌肉紧张

D、头晕头痛.

E、胸闷咳嗽

答案:

A

解析: 本题考查病房湿度过低对病人的影响。湿度过低会导致病人口渴咽痛，因为空气干燥会使得病人的口腔和喉咙黏膜失去水分，引起口渴咽痛的症状。其他选项与湿度过低的影响不符合，因此答案为 A。

4. 《医疗废物分类目录》将医疗废物分几类, ()

A、3 类

B、4 类

C、5 类

D、6 类

E、7 类

答案:

C

解析: 根据题目所给的信息，《医疗废物分类目录》将医疗废物分为几类，答案应该是一个数字。根据常识和相关知识，医疗废物的分类是为了更好地进行处理和管理，一般会根据废物的性质、来源、危害程度等因素进行分类。根据国家相关规定，医疗

废物一般分为 5 类，分别是：感染性医疗废物、化学性医疗废物、放射性医疗废物、普通医疗废物和其他医疗废物。因此，本题的答案应该是 C 选项，即 5 类。

5. 李先生，48 岁，因最近肝区不适住院，拟诊肝炎，医嘱查肝功能，护士的采血时间最好在（ ）

A、晨起空腹时

B、临睡时

C、发热时

D、活动后

E、夜间熟睡时

答案：

A

解析：肝功能检查需要空腹状态下进行，因为饮食会影响肝功能指标的测定。因此，最好在晨起空腹时进行采血。选项 B、C、D、E 都不符合要求。

6. 新生儿出生体重 3.2kg. 生后 48 小时血清总胆红素 297.5mmol/L，未结合胆红素 289mmol/L 在检查黄疸原因时，首选治疗方法是（ ）

A、光照疗法

B、白蛋白输注

C、口服苯巴比妥

D、交换输血

E、输血浆

答案:

D

解析: 本题考查新生儿黄疸的治疗方法。根据题干中的血清总胆红素和未结合胆红素的数值, 可以判断该新生儿患有高胆红素血症, 需要进行治疗。选项中, 光照疗法适用于轻度黄疸, 不适用于本题中的高胆红素血症; 口服苯巴比妥和输血浆也不是首选治疗方法。白蛋白输注可以帮助将未结合胆红素转化为结合胆红素, 但对血清总胆红素的降低作用有限。因此, 本题的正确答案是 D, 即交换输血, 可以通过替换患儿的血液来降低血清总胆红素的水平。

7. 吞咽障碍评定时, 某患者喝 30ml 水, 两次以上喝完, 没有发生呛咳, 该患者饮水试验结果属于几级()

A、I

B、II

C、III

D、IV

E、V

答案:

B

解析：本题考查吞咽障碍评定中的饮水试验。饮水试验是评定吞咽障碍的常用方法之一，通过观察患者饮水的过程和结果来判断吞咽功能的情况。根据饮水试验的结果，可以将吞咽障碍分为五个级别，分别为 I、II、III、IV、V 级。本题中，患者喝 30ml 水两次以上，没有发生呛咳，说明患者的吞咽功能较好，可以排除 I、III、IV、V 级。根据饮水试验的标准，当患者能够连续喝两次以上 30ml 水，且没有发生呛咳时，属于 II 级。因此，本题答案为 B。

8. 脑水肿患者静脉滴注 20% 甘露醇 500ml，要求在 50min 内滴完，输液速度应为（ ）

A、100 滴/分

B、120 滴/分

C、150 滴/分

D、170 滴/分

E、180 滴/分

答案：

C

解析：根据题意，需要在 50 分钟内滴完 500ml 的甘露醇，因此可以先求出每分钟需要滴多少毫升的甘露醇： $500\text{ml} \div 50\text{min} = 10\text{ml}/\text{min}$ 然后再根据甘露醇的滴定速

度计算出每分钟需要滴多少滴： $20 \text{ 滴/ml} \times 10\text{ml/min} = 200 \text{ 滴/min}$ 因此，答案为

C，输液速度应为 150 滴/分。

9. 动脉采血后局部按压的时间为（ ）分钟

A、3-5

B、5-10

C、10-15

D、2-3

E、20

答案：

B

解析：动脉采血后需要进行局部按压，以防止出血和血肿的发生。按压的时间应该足够长，一般建议在 5-10 分钟左右。因此，本题的正确答案为 B。其他选项均不符合常规的操作要求。

10. 导致肾病综合征病人出现大量蛋白尿的最主要原因是

A、肾小球滤过膜受损

B、肾小管重吸收功能受损

C、集合管功能下降

D、毛细血管滤过压增加

E、蛋白质摄入过多

答案:

A

解析: 肾病综合征是一种以大量蛋白尿、低蛋白血症和水肿为主要表现的疾病。其中，导致大量蛋白尿的最主要原因是肾小球滤过膜受损。肾小球滤过膜是由内皮细胞、基底膜和足细胞三部分组成，其中足细胞是最外层的一层，它们的突起形成了滤过膜的孔隙，控制着蛋白质的筛选。当足细胞受损时，滤过膜的孔隙会变得更大，导致蛋白质从尿液中泄漏出来，形成大量蛋白尿。因此，选项 A 是正确答案。选项 B、C、D 和 E 都不是导致肾病综合征病人出现大量蛋白尿的主要原因。

11. 以下哪项不是采集血标本的注意事项 ()

A、根据化验目的计算血量

B、需全血的标本应选择抗凝试管

C、血清标本应防止溶血

D、生化标本应清晨空腹抽取

E、同时采集不同类型血标本时,采集顺序为:全血标本→血清标本→血培养标本

答案:

E

解析： 本题考查采集血标本的注意事项。选项A、B、C、D 都是采集血标本时需要注意的事项，而选项E 则是错误的。在同时采集不同类型血标本时，应该先采集无抗凝剂的全血标本，再采集抗凝剂的血清标本，最后采集血培养标本。因此，选项E 是不正确的，是本题的答案。

12. 林某，男，70 岁。今天突发糖尿病酮症酸中毒昏迷，经补碱及静脉滴注小剂量胰岛素和大量补液后神志转清，后又进入昏迷。此时应首选的处理措施为()

A、静脉补钾

B、静脉补钙

C、吸氧

D、停止补液

E、停止补碱并静脉滴注甘露醇

答案：

E

解析： 本题考查对糖尿病酮症酸中毒的处理。糖尿病酮症酸中毒是糖尿病患者常见的一种急性并发症，主要表现为高血糖、代谢性酸中毒和脱水等症状。治疗原则是补液、补碱、降糖、纠正电解质紊乱等。本题中，患者已经经过补液和胰岛素治疗，神志已经转清，但又进入昏迷，提示可能存在脑水肿。因此，应该停止补碱并静脉滴注甘露醇，以减轻脑水肿，改善患者的症状。其他选项不符合糖尿病酮症酸中毒的治疗原则，因此不是首选处理措施。因此，答案为E。

13. 患儿，女，1岁，白血病，拟选择在左上肢进行PICC置管进行化疗。属于高度危险性的物品是（ ）

A、PICC 穿刺导管.

B、PICC 穿刺垫巾.

C、止血带

D、体温表

E、治疗盘

答案:

A

解析：本题考查对PICC置管的相关知识。PICC置管是一种常见的静脉置管方式，用于输液、化疗等治疗。在PICC置管过程中，穿刺导管是高度危险性的物品，因为它直接穿刺患者的皮肤和静脉，如果操作不当，可能会导致感染、出血等并发症。因此，正确答案为A。其他选项中，PICC穿刺垫巾、止血带、治疗盘等都是PICC置管过程中需要使用的物品，但它们的危险性相对较低。体温表与PICC置管无关，不属于高度危险性的物品。

14. 某特发性血小板减少性紫癜患者,目前血小板计数下降至 $15 \times 10^9/L$,护士对其进行护理时,最应警惕的表现是()

A、发热

B、咳嗽

C、肛门疼痛

D、剧烈头痛、呕吐

E、皮肤出血点增多

答案:

D

解析: 本题考查对特发性血小板减少性紫癜患者的护理常识。特发性血小板减少性紫癜是一种自身免疫性疾病，患者的血小板计数下降，易出现出血现象。因此，护士在护理患者时，最应警惕的表现是剧烈头痛、呕吐，这可能是颅内出血的表现，需要及时处理。其他选项虽然也可能出现，但不如 D 选项紧急。因此，本题答案为 D。

15. 男性, 13 岁, 半月全身浮肿, 乏力。尿蛋白(++++)，定量 4.0g/24h, 镜检偶见沉渣细胞和透明管型。血压 120/80mmHg, 血浆白蛋白 29g/L。BUN5mmol/L, 血清肌酐 98 umol/L, 胆固醇, 甘油三酯升高, 该临床诊断是 ()

A、急性肾炎综合征

B、急进性肾炎综合征

C、慢性肾炎综合征

D、肾病综合征

E、肾病综合征并发急性肾炎综合征

答案:

D

解析：根据病史和检查结果，该患者出现了半月全身浮肿、乏力、尿蛋白大量增加、血浆白蛋白降低、血压正常、血清肌酐轻度升高等症状和体征，符合肾病综合征的诊断标准。因此，答案为D。其他选项的病史和检查结果不符合该疾病的诊断标准。

16. 对排便异常的描述，下列错误的是()

A、上消化道出血病人为柏油样便

B、痔疮病人排便后有鲜血滴出

C、胆道完全阻塞时，粪便呈暗黑色

D、肠套叠病人可有果酱样便

E、痢疾病人常为脓血便

答案：

C

解析：A. 上消化道出血病人为柏油样便，是正确的描述。上消化道出血时，血液经过胃肠道消化后，血红蛋白被分解成黑色素，使得粪便呈现出柏油样的黑色。 B. 痔疮病人排便后有鲜血滴出，是正确的描述。痔疮是肛门周围静脉曲张，常常出现排便时有鲜红色血液滴出的症状。 C. 胆道完全阻塞时，粪便呈暗黑色，是错误的描述。胆汁是胆道分泌的一种液体，它的存在使得粪便呈现出棕色。如果胆道完全阻塞，胆汁无法进入肠道，粪便就会呈现出灰白色。 D. 肠套叠病人可有果酱样便，是正确的描述。肠套叠是指肠道的一段向内滑动，套在另一段肠道上，造成肠道阻塞。这时候，

肠道内的液体和粪便被压缩，形成果酱样的便便。 E.痢疾病人常为脓血便，是正确的描述。痢疾是由细菌引起的肠道感染，病人常常出现腹泻、腹痛、脓血便等症状。综上所述，选项 C 描述错误，是本题的答案。

17. 女性，30 岁，因甲亢行双侧甲状腺大部切除术，术后 12 小时病人出现高热，脉速（每分钟达 120 次以上），烦躁不安，其原因可能是（ ）

A、双侧喉返神经损伤

B、伤口内血肿，压迫气管

C、甲状旁腺损伤

D、肺炎

E、甲状腺危象

答案：

E

解析：本题考查对甲状腺切除术后并发症的认识。术后高热、脉速、烦躁不安提示可能是甲状腺危象，是甲状腺功能亢进的一种严重表现，需及时处理。选项 A、B、C、D 均不符合病情表现。因此，本题答案为 E。

18. 急性中毒病人，当诊断不明时，应选择的洗胃液是（ ）

A、1:15000 高锰酸钾

B、温开水或生理盐水

C、牛奶

D、3%过氧化氢

E、2%-4%碳酸氢钠

答案:

B

解析: 本题考查的是急性中毒病人的处理方法。当诊断不明时, 应选择温开水或生理盐水进行洗胃。原因是温开水或生理盐水对大多数毒物都有稀释和清洗的作用, 同时不会对胃黏膜造成刺激和损伤。其他选项中, 1:15000 高锰酸钾、牛奶、3%过氧化氢、2%-4%碳酸氢钠都不是常规的洗胃液, 且可能会对病人造成更大的伤害。因此, 本题的正确答案是 B。

19. 女性, 35 岁, 被人用铁棍击伤头部, 立即出现昏迷, 送医院途中清醒, 但头痛、呕吐明显。入院体检时呈昏迷状态, 左侧瞳孔直径 0.5cm, 对光反应消失, 右侧瞳孔直径 0.2cm, 右侧肢体无自主运动。最可能的诊断是()

A、脑挫裂伤

B、原发性脑干损伤

C、急性硬脑膜下血肿

D、急性硬脑膜外血肿

E、急性脑内血肿

答案:

D

解析: 本题考查对不同类型颅脑损伤的鉴别诊断能力。根据题干中的信息,患者被铁棍击伤头部后出现昏迷,送医院途中清醒,但头痛、呕吐明显,入院体检时呈昏迷状态,左侧瞳孔直径 0.5cm,对光反应消失,右侧瞳孔直径 0.2cm,右侧肢体无自主运动。根据这些表现,可以排除 A、B 两个选项,因为脑挫裂伤和原发性脑干损伤的瞳孔大小和对光反应通常是对称的。而急性硬脑膜下血肿和急性脑内血肿的症状表现较为类似,但是本题中患者的瞳孔大小不对称,提示可能存在颅内压增高,因此最可能的诊断是急性硬脑膜外血肿,即选项 D。

20. 医疗事故的构成要件不正确的是 ()

- A、主体是医疗机构及其医务人员
- B、行为的违法性
- C、过失造成患者人身伤害,即违法行为的后果
- D、过失行为和后果行为之间存在因果关系
- E、主体是医疗机构及患者

答案:

E

解析: 本题考查医疗事故的构成要件。医疗事故的构成要件包括主体、行为的违法性、过失造成患者人身伤害,即违法行为的后果,过失行为和后果行为之间存在因果

关系。选项 A、B、C、D 均为构成要件，而选项 E 中的主体为医疗机构及患者，不符合医疗事故的构成要件，故选 E。

21. 保证病人安全，防止差错事故发生的一项重要制度是（ ）

A、查对制度

B、护理质量管理体系

C、护理会诊制度

D、护理新业务准入制度

E、护理新技术准入制度

答案：

A

解析： 本题考查的是保证病人安全的制度，防止差错事故发生。选项中，只有查对制度能够直接与此相关。查对制度是指在医疗过程中，对医疗行为进行核对，以确保医疗行为的正确性和安全性。因此，本题的正确答案为 A。其他选项虽然也与护理质量管理、会诊、新业务和新技术有关，但与保证病人安全的制度关系不大，故不是本题的正确答案。

22. 吞咽障碍评定时,某患者喝 30ml 水,两次以上喝完,没有发生呛咳,该患者饮水试验结果属于几级()

A、I

B、II

C、III

D、IV

E、V

答案：

B

解析： 本题考查吞咽障碍评定中的饮水试验。饮水试验是评估吞咽功能的一种方法，通过观察患者喝水时的反应来判断吞咽障碍的程度。根据国际吞咽障碍联盟的标准，饮水试验分为5个级别，分别为I、II、III、IV、V级。本题中，患者喝30ml水两次以上没有发生呛咳，说明患者的吞咽功能较好，属于II级。II级的定义是：患者能够在不需要额外的帮助或提示的情况下完成饮水试验，但可能需要更长的时间或更小的饮水量。因此，本题答案为B。

23. 王某，女，30岁，诊断为血小板减少性紫癜。护士观察口腔时发生唇及口腔黏膜散在瘀点，轻触可出血。护士为其做口腔护理时应特别注意（）

A、夹紧棉球

B、集忌漱口

C、动作轻柔

D、先取下义齿

E、棉球不可过湿

答案:

C

解析: 本题考查口腔护理中对于血小板减少性紫癜患者的注意事项。血小板减少性紫癜是一种血液疾病，患者血小板数量减少，易出现皮肤和黏膜出血点。因此，在口腔护理时，应特别注意动作轻柔，避免刺激口腔黏膜，导致出血。夹紧棉球、集忌漱口、先取下义齿等选项都不是针对血小板减少性紫癜患者的特别注意事项。棉球不可过湿是口腔护理中的基本原则，不仅适用于血小板减少性紫癜患者，因此不是本题的正确答案。因此，本题答案为 C。

24. 董某,男, 53 岁。因右下肢无力 2 天平车送入院。检查发现右下肢能在床上做平移运动,但不能抬离床面。该病人右下肢肌力为()

A、0 级

B、1 级

C、2 级

D、3 级

E、4 级

答案:

C

解析：根据题干可知，董某因右下肢无力 2 天平车送入院，检查发现右下肢能在床上做平移运动，但不能抬离床面。根据肌力分级标准，0 级表示完全无力，1 级表示能在平面上收缩肌肉但不能移动关节，2 级表示能在重力消失的情况下移动关节，3 级表示能克服重力但不能克服外加阻力移动关节，4 级表示能克服重力和外加阻力移动关节。因此，根据董某的症状，他的右下肢肌力应该为 2 级。因此，选项 C 为正确答案。

25. 臀大肌注射时，应避免损伤（ ）

A、臀部动脉

B、臀部静脉

C、坐骨神经

D、臀部淋巴

E、骨膜

答案：

C

解析：臀大肌注射是一种常见的肌肉注射方法，常用于给予肌肉注射药物。在进行臀大肌注射时，应当避免损伤坐骨神经，因为坐骨神经是臀部最大的神经，负责下肢的感觉和运动功能，一旦损伤可能会导致下肢疼痛、麻木、无力等症状。而臀部动脉、静脉和淋巴以及骨膜相对来说并不容易受到损伤，因此选项 A、B、D、E 都不是正确答案。因此，本题的正确答案是 C。

26. 急性心肌梗死早期(24小时内)的主要死亡原因是

A、心律失常

B、心室壁瘤

C、发热

D、心源性休克

E、心力衰竭

答案:

A

27. 手术日数自手术()开始计数,连续填写()。

A、当日、7天

B、次日、7天

C、当日、14天

D、次日、14天

E、次日、10

答案:

B

解析：本题考查手术日数的计算方法。手术日数是指手术当天及其后连续的日子，因此需要从某一天开始计数。根据常规操作，手术日数自手术次日开始计数，因为手术当天通常需要观察患者的情况，而手术后第二天开始，患者的恢复情况才能真正反映出手术效果。因此，选项中只有 B 和 D 符合这一规定。而填写的连续天数应该是 7 天，因为手术日数通常是连续 7 天，这样可以更好地观察患者的恢复情况。因此，本题的正确答案是 B。

28. 王某，女，28 岁。确诊 2 型糖尿病 2 年，平日血糖控制良好。现怀孕 14 周，因餐后 2 小时血糖 15.2mmol/L 前来就诊。其最佳治疗方案为（ ）

- A、密切监测血糖
- B、严格控制饮食
- C、口服磺脲类药物
- D、皮下注射胰岛素
- E、运动疗法

答案：

D

解析：本题考查糖尿病妊娠合并症的治疗方案选择。根据题干中的信息，王某已经确诊为 2 型糖尿病 2 年，平日血糖控制良好，现怀孕 14 周，餐后 2 小时血糖升高，因此需要选择最佳治疗方案。A. 密切监测血糖：糖尿病妊娠患者需要密切监测血糖，但仅仅依靠监测血糖并不能控制血糖水平，因此不是最佳治疗方案。B. 严格控制饮食：饮食控制是糖尿病治疗的重要措施，但对于怀孕的糖尿病患者来说，饮食控制需

要更加谨慎，不能过度限制营养，因此不是最佳治疗方案。 C. 口服磺脲类药物：磺脲类口服药物可以降低血糖，但对于怀孕的糖尿病患者来说，这类药物可能会对胎儿产生不良影响，因此不是最佳治疗方案。 D. 皮下注射胰岛素：糖尿病妊娠患者的最佳治疗方案是皮下注射胰岛素，因为胰岛素可以有效降低血糖，同时对胎儿的影响较小，是目前治疗糖尿病妊娠的首选药物。 E. 运动疗法：运动可以促进血糖代谢，但对于怀孕的糖尿病患者来说，需要注意运动强度和时间，避免对胎儿产生不良影响，因此不是最佳治疗方案。 综上所述，本题的最佳答案为 D。

29. 监护导联选择 P 波清晰的导联,通常是()

A、I 导联

B、II 导联

C、III 导联

D、AVF 导联

E、V 导联

答案:

B

解析：监护导联是指在心电监护仪上选择的导联，用于监测心脏的电活动。P 波是心脏的一种电活动，代表心房的收缩。选择 P 波清晰的导联可以更准确地监测心脏的功能状态。根据常规导联的排列顺序，II 导联是在心电图上显示 P 波最清晰的导联，因此选择 B 选项 II 导联作为正确答案。

30. 病人处于持续睡眠状态，但能被言语或轻度刺激唤醒，刺激去除后又很快睡，此时病人处于()

A、嗜睡

B、浅昏迷

C、意识模糊

D、昏睡

E、深昏迷

答案:

A

解析: 本题考查对不同意识状态的理解和区分。根据题干描述，病人处于持续睡眠状态，但能被言语或轻度刺激唤醒，刺激去除后又很快睡，可以判断病人处于嗜睡状态。嗜睡是指病人在白天或正常活动时间内，持续处于睡眠状态，但能被外界刺激唤醒，唤醒后表现为清醒状态，刺激去除后又很快入睡。浅昏迷是指病人处于昏迷状态，但能被强烈刺激唤醒，唤醒后表现为意识模糊或混乱。意识模糊是指病人意识清晰度下降，表现为思维迟缓、反应迟钝、注意力不集中等。昏睡是指病人处于昏迷状态，但能被强烈刺激唤醒，唤醒后表现为意识模糊或混乱，但不能保持清醒状态。深昏迷是指病人处于昏迷状态，不能被外界刺激唤醒，表现为意识丧失。因此，本题答案为 A。

31. 病区交班报告眉栏的书写顺序正确的是 ()

- A、新入院—转入—出院—手术—危重
- B、手术—危重—新入院—转入—出院
- C、转入—新入院—出院—手术—危重
- D、出院—新入院—转入—手术—危重
- E、出院—转入—手术—危重—新入院

答案:

D

解析: 病区交班报告眉栏是指在病区交班时, 书写在病人病历首页上的一栏, 用于简要记录病人的基本情况和重要信息, 方便交班医生了解病人情况。正确的书写顺序应该是按照病人的状态和时间顺序来排列, 一般是出院、转入、手术、危重、新入院。因此, 正确答案为 D。

32. 董某,男, 53 岁。因右下肢无力 2 天平车送入院。检查发现右下肢能在床上做平移运动,但不能抬离床面。该病人右下肢肌力为()

- A、0 级
- B、1 级
- C、2 级
- D、3 级
- E、4 级

答案:

C

解析: 根据题干可知,董某因右下肢无力 2 天平车送入院,检查发现右下肢能在床上做平移运动,但不能抬离床面。根据肌力分级标准,0 级表示完全无力,1 级表示能在重力作用下肌肉收缩,但不能产生关节活动,2 级表示能在重力作用下肌肉收缩,产生关节活动,但不能克服重力,3 级表示能克服重力,但不能克服外加阻力,4 级表示能克服重力和外加阻力。因此,根据董某的症状,右下肢能在床上做平移运动,但不能抬离床面,可判断其右下肢肌力为 2 级。因此,选项 C 为正确答案。

33. 输液泵使用时应高于患者心脏水平()

A、10cm

B、20cm

C、30cm

D、40cm

E、60cm

答案:

C

解析: 输液泵使用时应高于患者心脏水平,以保证输液顺畅,避免反流。根据相关规定,输液泵高度应高于患者心脏水平 30cm 左右,因此本题答案为 C。

34. 各种抢救器材及药品应做到五定，不包括（ ）。

- A、定放置高度
- B、定点放置
- C、定数量品种
- D、定期消毒灭菌
- E、定期检查维修

答案：

A

35. 患者女性，20 岁。因癫痫收治入院，今日早晨洗漱回病房途中突然全身倒地，意识丧失、四肢抽搐，此时首要的处理措施是（ ）

- A、立即与家属将患者抬到床上，以防受伤
- B、回治疗室拿电筒观察瞳孔变化
- C、向医生汇报，尽快用药
- D、脑电图检查
- E、保持呼吸道通畅，防止窒息

答案：

E

36. 插胃管时病人出现呛咳、发绀，护士应该（ ）

A、嘱病人深呼吸

B、立即拔出胃管重插

C、嘱病人做吞咽动作

D、让病人体息一会再插

E、请病人坚持一下

答案：

B

37. 对实质性脏器破裂并发休克时处理原则是（ ）

A、全力抢救休克

B、立即手术

C、先抢救休克，待休克好转后再行手术

D、先抢救休克，如休克无好转是再手术

E、抢救休克的同时进行手术

答案：

E

解析： 本题考查对实质性脏器破裂并发休克时的处理原则。实质性脏器破裂是一种严重的外科急症，常常伴随着大量出血和休克。对于这种情况，应该采取紧急的治疗措施，以挽救患者的生命。选项 A：全力抢救休克。这是治疗实质性脏器破裂并发休克的基本原则之一，但并不是唯一的处理方法。选项 B：立即手术。对于实质性脏器破裂并发休克的患者，手术是必要的治疗方法之一，但并不是立即进行手术的最佳选择。选项 C：先抢救休克，待休克好转后再行手术。这种处理方法可能会延误治疗时间，增加患者的死亡率。选项 D：先抢救休克，如休克无好转是再手术。这种处理方法可能会延误手术的时机，增加手术的难度和风险。选项 E：抢救休克的同时进行手术。这是治疗实质性脏器破裂并发休克的最佳选择，可以同时控制出血和休克，提高治疗效果。综上所述，选项 E 是本题的正确答案。

38. 膀胱高度充盈的病人，首次导尿量不得超过（ ）

A、500mL

B、100mL

C、1000mL

D、3000mL

E、1500mL

答案：

C

39. 无菌物品存放架或柜应距地面、墙、天花板（ ）

A、 $\geq 20\text{cm}$ 、 $\geq 10\text{cm}$ 、 $\geq 50\text{cm}$

B、 $\geq 10\text{cm}$ 、 $\geq 5\text{cm}$ 、 $\geq 50\text{cm}$

C、 $\geq 20\text{cm}$ 、 $\geq 5\text{cm}$ 、 $\geq 30\text{cm}$

D、 $\geq 20\text{cm}$ 、 $\geq 5\text{cm}$ 、 $\geq 50\text{cm}$

E、 $\geq 25\text{cm}$ 、 $\geq 5\text{cm}$ 、 $\geq 30\text{cm}$

答案:

D

解析: 根据无菌物品的特殊性质，需要在存放时避免受到外界的污染，因此需要距离地面、墙、天花板一定的距离。根据规范要求，无菌物品存放架或柜应距离地面不少于 20cm ，距离墙不少于 5cm ，距离天花板不少于 50cm 。因此，选项 D 符合要求，是正确答案。

40. 原发性高血压病人每日摄钠量不应超过 ()

A、 2g

B、 4g

C、 6g

D、 8g

E、 10g

答案:

C

解析：高血压是一种常见的慢性疾病，摄入过多的钠会导致血压升高，因此高血压患者应该限制钠的摄入。根据世界卫生组织的建议，成年人每日的钠摄入量不应超过6克。因此，原发性高血压病人每日摄钠量不应超过6克，选项C为正确答案。

41. 李先生, 34岁, 右腹股沟肿块1个月余, 肿块于咳嗽、用力时出现, 平卧休息后可消失, 体格检查: 肿块突入阴囊, 回纳后压住深环肿块不突出, 则其目前最可能的病情是 ()

A、易复性腹股沟直疝

B、易复性腹股沟斜疝

C、难复性腹股沟直疝

D、难复性腹股沟斜疝

E、绞窄性腹股沟直疝

答案：

B

解析：根据题干中的病史和体格检查，可以初步判断为腹股沟疝。而根据肿块的性质和出现的情况，可以进一步判断为易复性疝。根据肿块的位置和回纳情况，可以判断为斜疝。因此，最可能的病情是易复性腹股沟斜疝，选项B正确。其他选项中，易复性和难复性的区别在于是否能够自行回纳，而绞窄性则是指疝囊被压迫导致血液供应不足，出现严重症状，与题干描述不符。

42. 检查粪便中的寄生虫卵应 ()

- A、取中间部位的粪便
- B、取边缘部位的粪便
- C、取不同部位的粪便
- D、随机取少许粪便
- E、留取全部粪便

答案:

C

解析: 为了检查粪便中的寄生虫卵，应该取不同部位的粪便进行检查，因为不同部位的粪便可能含有不同种类的寄生虫卵，这样可以提高检测的准确性。取中间部位的粪便或边缘部位的粪便可能会导致检测结果不准确。随机取少许粪便或留取全部粪便也不能保证检测的准确性。因此，选项 C 是正确答案。

43. 吴老先生因脑出血已在家卧床 2 个月，大小便失禁。不能自行翻身，近日尾骶部皮肤呈紫红色。压之不褪色，则为哪一期压疮 ()

- A、淤血红润期
- B、淤血浸润期
- C、不可分期
- D、炎性浸润期

E、深层溃疡期

答案:

D

解析: 本题考查的是压疮的分期和判断。根据题干中的描述, 吴老先生已经卧床 2 个月, 大小便失禁, 不能自行翻身, 近日尾骶部皮肤呈紫红色, 压之不褪色, 可以判断为炎性浸润期。压疮是由于长时间的压迫和摩擦导致皮肤和组织缺血坏死的一种病症。根据压疮的分期, 可以分为淤血红润期、淤血浸润期、炎性浸润期、坏死期和愈合期。其中, 炎性浸润期是指皮肤和组织已经受到严重的损伤, 出现红肿、渗出、疼痛等炎症反应, 此时皮肤颜色呈现紫红色, 压之不褪色。因此, 本题的正确答案为 D。

44. 肺血栓栓塞症发生后, 病人常即刻出现 ()

A、胸痛

B、咳嗽

C、咯血

D、烦躁不安

E、呼吸困难

答案:

E

解析： 本题考查肺血栓栓塞症的临床表现。肺血栓栓塞症是指血栓或栓子阻塞肺动脉或其分支，导致肺循环障碍的一种疾病。根据病理生理学知识，肺血栓栓塞症发生后，由于肺动脉阻塞，肺循环阻力增加，导致右心负荷加重，心排血量减少，病人会出现呼吸困难、心悸、胸痛等症状。因此，本题答案为 E，即呼吸困难。其他选项虽然也可能出现，但不是肺血栓栓塞症的典型表现。

45. 患者王某,因急性胃肠炎入院,护理观察发现患者每日排便次数达 5 次,呈水样便,听诊肠鸣音亢进,对此情况的护理目标正确的陈述是()

- A、.禁食 24 小时
- B、给予口服止泻剂每日 3 次
- C、2 日后排便次数减少为 1~2 次/日
- D、卧床休息
- E、了解急性肠炎发生的机理

答案：

C

解析： 本题考查对急性胃肠炎患者的护理目标的理解。根据题干中提到的患者症状，如排便次数增多、呈水样便、肠鸣音亢进等，可以判断患者可能存在腹泻症状。因此，正确的护理目标应该是控制腹泻，使排便次数减少，恢复正常肠道功能。选项 A 禁食 24 小时不利于患者的营养摄入和康复，应该避免使用；选项 B 给予口服止泻剂可以缓解腹泻症状，但不是长期的治疗方案，应该根据患者具体情况使用；选项 D 卧床休息可以缓解患者的疲劳感，但不能直接治疗腹泻症状；选项 E 了解急性肠炎发生

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/387040053034006120>