

外科护理学-青岛大学-中国大学MOOC慕课答案

单元测验

1、单选题：手术日清晨的准备中，下列哪项是错误的？

选项：

- A、如有发热给予退热药
- B、如有活动性假牙应取下
- C、按医嘱给术前用药
- D、进手术室前常规排尿
- E、按手术需要将有关资料和用物带入手术室

参考：【**如有发热给予退热药**】

2、单选题：下述手术中哪种是限期手术？

选项：

- A、十二指肠溃疡出血行胃次全切除术
- B、急性梗阻性化脓性胆囊炎
- C、胃癌胃切除术
- D、绞窄性肠梗阻
- E、脾破裂行脾切除术

参考：【**胃癌胃切除术**】

3、单选题：一般病人手术前禁饮的时间是

选项：

- A、2~3h
- B、4~6h
- C、8~10h
- D、12~16h
- E、18~24h

参考：【**4~6h**】

4、单选题：围手术期是指

选项：

- A、病人从入院到进入手术室接受手术前的这段时期
- B、病人从入院到接受手术治疗结束后的这段时期
- C、病人从入院到术后痊愈回家的这段时期
- D、病人从到达手术室实施麻醉到接受预定的手术程序
- E、病人接受手术后到完全康复痊愈的这段时期

参考：【**病人从入院到术后痊愈回家的这段时期**】

5、多选题：有关手术前的护理叙述正确的是

选项：

- A、手术前晚可给镇静剂
- B、术日晨测体温
- C、术前戒烟
- D、急性必须灌肠

E、急性呼吸道感染的病人控制后再手术

参考：【手术前晚可给镇静剂#术日晨测体温#术前戒烟#急性呼吸道感染的病人控制后再手术】

6、多选题：术前呼吸道准备中正确的是

选项：

A、戒烟2周

B、指导病人进行深呼吸和咳嗽咳痰

C、有呼吸道感染者及时抗感染治疗

D、咳嗽者给予镇咳药物

E、痰液多而粘稠者应进行体位引流和雾化吸入

参考：【戒烟2周#指导病人进行深呼吸和咳嗽咳痰#有呼吸道感染者及时抗感染治疗#痰液多而粘稠者应进行体位引流和雾化吸入】

7、判断题：要求病人术前禁食、禁水的主要原因是使胃肠道空虚，以便腹部手术充分暴露术野

选项：

A、正确

B、错误

参考：【错误】

8、判断题：手术区皮肤准备的目的是为了更方便手术操作

选项：

A、正确

B、错误

参考：【错误】

单元测验

1、单选题：以下哪项属于全身麻醉？

选项：

A、表面麻醉

B、局部浸润麻醉吸入麻醉蛛网膜下腔阻滞

C、吸入麻醉

D、蛛网膜下腔阻滞

参考：【吸入麻醉】

2、单选题：以下哪项与预防局麻药中毒无关？

选项：

A、术前用药给苯巴比妥钠

B、避免将局麻药注入血管

C、每次用量不超过最大限量

D、加少量肾上腺素

E、术前做皮肤过敏试验

参考：【术前做皮肤过敏试验】

3、单选题：全脊椎麻醉的主要原因是

选项：

A、局麻药误入蛛网膜下腔

- B、呼吸平稳，能深呼吸及咳嗽
- C、血压及脉搏稳定
- D、心电图无严重心律失常
- E、呼吸道无异物

参考：【局麻药误入蛛网膜下腔】

4、单选题：全身麻醉患者完全清醒的标志是

选项：

- A、睫毛反射恢复
- B、能睁眼看人
- C、眼球转动
- D、呻吟翻身
- E、能准确回答问题

参考：【能准确回答问题】

5、单选题：男性，30岁，在普鲁卡因局部浸润麻醉下行双侧腋臭皮肤切除，两侧同时手术。手术中，病人突然大叫，谵妄，惊厥，紫绀，心率120次/分，处理应

选项：

- A、静脉输液
- B、静脉注射间羟胺
- C、静脉注射硫喷妥钠
- D、吸氧静脉注射肾上腺素
- E、静脉注射肾上腺素

参考：【静脉注射硫喷妥钠】

6、单选题：男性，62岁。行“全麻下甲状腺癌切除术”后转回普通病房监护。意识清醒，测T37.5度，P102次/分钟，R28次/分钟，BP149/92mmHg。开始呼吸有鼾声，且呼吸急促，继之出现鼻翼扇动和三凹症。此时，应首先考虑并发：A. 窒息B. 上呼吸道梗阻C. 下呼吸道梗阻D. 低氧血症E. 支气管痉挛

选项：

- A、窒息
- B、上呼吸道梗阻
- C、下呼吸道梗阻
- D、低氧血症
- E、支气管痉挛

参考：【上呼吸道梗阻】

7、多选题：以下有关局麻药过敏反应的处理措施正确的是

选项：

- A、一旦发生，立即停药
- B、保持呼吸道通畅
- C、遵医嘱注射肾上腺素
- D、维持循环的稳定
- E、遵医嘱可以选用血管加压药

参考：【一旦发生，立即停药#保持呼吸道通畅#遵医嘱注射肾上腺素#维持循环的稳定#遵医嘱可以选用血管加压药】

8、多选题：局麻药中毒反应的原因有A.一次注射药物超过最大剂量 B. 药物误入血管内C. 注射部位血管丰富D. 患者对药物过敏E. 药物间相互影响使毒性增高

选项：

- A、一次注射药物超过最大剂量
- B、药物误入血管内
- C、注射部位血管丰富
- D、患者对药物过敏
- E、药物间相互影响使毒性增高

参考：【一次注射药物超过最大剂量 #药物误入血管内#注射部位血管丰富#药物间相互影响使毒性增高】

9、判断题：蛛网膜下腔阻滞属于全身麻醉

选项：

- A、正确
- B、错误

参考：【错误】

10、判断题：腰麻术后去枕平卧6小时是为防止头痛

选项：

- A、正确
- B、错误

参考：【正确】

单元测验

1、单选题：II级标准洁净手术室适用范围（ ） A.心脏外科 B.骨科 C.妇科 D.污染手术 E.肛肠外科

选项：

- A、心脏外科
- B、骨科
- C、妇科
- D、污染手术
- E、肛肠外科

参考：【骨科】

2、单选题：水平仰卧位适用于

选项：

- A、腹部、胸前手术
- B、乳房及腋部手术
- C、颈前部手术
- D、脊柱及其他背部手术
- E、胸腔手术

参考：【腹部、胸前手术】

3、单选题：T形引流管主要用于A.胸腔、腹腔以及深部创腔引流 B.、乳腺甲状腺、胆囊切除等渗出液较多的伤口引流 C.腹腔、肠痿等引流 D.胆总管切开术后的胆汁引流 E.膀胱造口引流

选项：

- A、胸腔、腹腔引流

- B、甲状腺、乳腺引流
- C、肠痿引流
- D、胆总管切开术后的胆汁引流
- E、膀胱造口引流

参考：【胆总管切开术后的胆汁引流】

4、单选题：穿无菌手术衣及戴好无菌手套后，无菌范围为
选项：

- A、腰以上、双手、双臂的区域。
- B、肩以下、腰以上、双手、双臂的区域。
- C、肩以下、腰以上、双手、双臂、腋中线以前的区域。
- D、肩以下、腰以上、双手、双臂、腋前线以前的区域。
- E、肩以下、腰以上、双手、双臂肘前的区域。

参考：【肩以下、腰以上、双手、双臂、腋中线以前的区域。】

5、多选题：巡回护士的职责是
选项：

- A、术前物品准备
- B、核对病人、安置体位
- C、清点核对物品
- D、术中配合、术后整理
- E、术后整理

参考：【术前物品准备#核对病人、安置体位#清点核对物品#术中配合、术后整理#术后整理】

6、多选题：洗手护士的职责包括
选项：

- A、安置体位
- B、术前访视
- C、配合手术、传递器械
- D、清点核对用物
- E、接送病人

参考：【术前访视#配合手术、传递器械#清点核对用物】

7、多选题：关于手术室无菌原则正确的是
选项：

- A、手套污染时应立即更换
- B、无菌包及无菌容器的边缘视为有菌
- C、手术人员戴无菌手套后可接触手术床边缘
- D、缝合前需再用安尔碘消毒皮肤一次。
- E、胃肠道手术全部沾染步骤完成后，手术人员应更换无菌手套

参考：【手套污染时应立即更换#无菌包及无菌容器的边缘视为有菌#胃肠道手术全部沾染步骤完成后，手术人员应更换无菌手套】

8、判断题：每台手术后先消毒再清洁，特殊感染手术后用500mg/L的有效氯擦拭地面及物品。
选项：

- A、正确

B、错误

参考：【正确】

9、判断题：高压蒸汽灭菌的布单保存时间：夏季10-14天，冬季7天，过期应重新灭菌。

选项：

A、正确

B、错误

参考：【错误】

10、判断题：阴道、肛门手术采用膀胱截石位

选项：

A、正确

B、错误

参考：【正确】

单元测验

1、单选题：腹部手术后拔除胃肠减压管的指征是（ ） A.腹胀消失 B.肠蠕动恢复 C.腹痛消失 D.肛门排气 E.食欲恢复

选项：

A、腹痛消失

B、腹胀消失

C、没有出血

D、肛门排气

E、食欲恢复

参考：【肛门排气】

2、单选题：胃大部切除术后6日，体温39.5℃，右上腹疼痛，伴呃逆，无其他主诉。应首先考虑

选项：

A、外科手术热

B、切口感染

C、肺部感染

D、膈下脓肿

E、盆腔脓肿

参考：【膈下脓肿】

3、单选题：男性，69岁。行胃癌根治术，术后7d用力排便时突然出现腹痛，伤口敷料被血性渗液浸透，此时应考虑A. 切口感染 B. 切口裂开 C. 腹腔内出血 D. 肠破裂 E. 切口血肿

选项：

A、切口感染

B、切口裂开

C、腹腔内出血

D、肠破裂

E、切口血肿

参考：【切口裂开】

4、单选题：男性，57岁。十二指肠溃疡20年，上腹部隐痛1年，近1个月又出现呕吐，吐隔夜宿食，呕吐逐渐加重；精神状态差，消瘦明显，皮肤弹性差，贫血貌；胃镜检查确诊为十二指肠溃疡并幽门梗阻。决定近期行胃大部切除术。51. 从提高手术耐受力考虑，首要的护理诊断是

选项：

- A、活动无耐力
- B、知识缺乏
- C、营养失调：低于机体需要
- D、焦虑、恐惧
- E、有感染的危险

参考：【**营养失调：低于机体需要**】

5、多选题：术后早期离床活动的目的包括

选项：

- A、减少肺部并发症
- B、避免深静脉血栓形成
- C、促进胃肠功能恢复
- D、促进排尿功能恢复
- E、减轻切口疼痛

参考：【**减少肺部并发症#避免深静脉血栓形成#促进胃肠功能恢复#促进排尿功能恢复**】

6、多选题：择期手术病人临时决定推迟手术的原因

选项：

- A、体温超过37.5℃
- B、有呼吸道感染症状
- C、手术区皮肤感染
- D、月经来潮
- E、高血压病人的血压150/100 mmHg

参考：【**体温超过37.5℃#有呼吸道感染症状#手术区皮肤感染#月经来潮**】

7、多选题：术后下肢深静脉血栓形成的预防措施

选项：

- A、早期下床活动
- B、卧床期间做双下肢伸曲活动
- C、预防性口服阿司匹林
- D、穿弹力袜
- E、预防性使用肝素

参考：【**早期下床活动#卧床期间做双下肢伸曲活动#预防性口服阿司匹林#穿弹力袜**】

8、多选题：引起术后发热的原因

选项：

- A、手术创伤反应
- B、肺不张和肺炎
- C、术后出血
- D、尿路感染
- E、血栓性静脉炎

参考：【**手术创伤反应#肺不张和肺炎#尿路感染#血栓性静脉炎**】

9、判断题：男性，65岁。腰麻下行前列腺切除术后12h，烦躁不安，生命体征平稳。查体见：下腹胀隆，叩诊呈浊音，首先考虑的是肠梗阻

选项：

- A、正确
- B、错误

参考：【**错误**】

10、判断题：患者女性，24岁。阑尾切除术后3天，体温38.7°C，自诉切口疼痛，查体见切口红肿，有压痛。首先考虑是切口感染。

选项：

- A、正确
- B、错误

参考：【**正确**】

单元测试

1、单选题：属于肠外营养输注途径的是

选项：

- A、鼻胃管
- B、胃造瘘
- C、空肠造瘘
- D、中心静脉插管
- E、鼻肠管

参考：【**中心静脉插管**】

2、单选题：提示有营养不良的指标是

选项：

- A、1年内体重下降超过3%，或3个月体重下降2%
- B、半年内体重下降超过5%，或3个月体重下降2%
- C、半年内体重下降超过5%，或3个月体重下降3%
- D、半年内体重下降超过10%，或3个月体重下降3%
- E、半年内体重下降超过10%，或3个月体重下降5%

参考：【**半年内体重下降超过10%，或3个月体重下降5%**】

3、单选题：利用体质指数判断营养不良的标准是

选项：

- A、16.5为消瘦，≥20为超重
- B、18.5为消瘦，≥20为超重
- C、18.5为消瘦，≥24为超重
- D、20.5为消瘦，≥24为超重
- E、20.5为消瘦，≥25为超重

参考：【**18.5为消瘦，≥24为超重**】

4、单选题：必须用中心静脉供给营养的，一般都选择连续使用超过

选项：

- A、一周
- B、两周

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/387102054014006035>