

【实用】2021 年护理三基知识考试必考题库及答案 (共 300 题)

科室	工号	姓名	分数
----	----	----	----

一、 单选题(每题 1 分,共 200 分)

1、 肾病综合征的“三高一低”特征不包括

- A. 高血压
- B. 高度水肿
- C. 高脂血症
- D. 大量蛋白尿
- E. 低蛋白血症

答案: A

2、 PEEP 是指:

- A. 压力支持通气
- B. 持续气道正压
- C. 双水平气道正压
- D. 呼气末正压

答案: D

3、 股动脉

- A. 在股三角内由髂外动脉发出
- B. 行于股神经外侧
- C. 行于股静脉内侧
- D. 行于股静脉外侧
- E. 行于股深动脉内侧

答案: D

4、 重症肌无力病人最先受累的肌肉为:

- A. 呼吸肌
- B. 膈肌
- C. 眼外肌
- D. 四肢肌肉

答案: C

5、 角膜反射消失见于

- A. 昏睡
- B. 嗜睡
- C. 谵妄
- D. 妄想
- E. 深昏迷

答案: E

6、 下列消毒剂中属中效消毒剂的是

- A. 戊二醛
- B. 过氧乙酸
- C. 氯己定
- D. 臭氧
- E. 碘伏

答案：E

7、流行性出血热的低血压休克期多发生于病程的

- A. 1-2 天
- B. 2-4 天
- C. 4-6 天
- D. 6-8 天
- E. 8-12 天

答案：C

8、女性 40 岁. 风心病心悸气促已数年，近来心悸气促加重并伴双下肢浮肿，是风心病合并

- A. 风湿活动
- B. 肺部感染
- C. 上呼吸道感染
- D. 周围循环衰竭
- E. 充血性心力衰竭

答案：E

9、在初次使用胰岛素治疗时，一般选用

- A. 正规胰岛素从小剂量开始
- B. 鱼精蛋白锌胰岛素从小剂量开始
- C. 正规胰岛素从大剂量开始
- D. 正规胰岛素与鱼精蛋白胰岛素联合应用
- E. 鱼精蛋白锌胰岛素从大剂量开始

答案：A

10、下列哪项不是颈外静脉输液法的适应证

- A. 长期输液，周围静脉不易穿刺者
- B. 长期静脉内滴注高浓度的药物者
- C. 进行静脉高营养治疗患者
- D. 周围循环衰竭者用来测中心静脉压
- E. 急腹症患者术前建立静脉通路

答案：E

11、肺气肿患者的胸廓呈

- A. 鸡胸
- B. 扁平胸
- C. 桶状胸

- D. 漏斗胸
- E. 一侧局限性膨隆

答案：C

12、中医学的治疗法则不包括

- A. 治病求本、扶正祛邪
- B. 整体观念、辨证治疗
- C. 调整阴阳
- D. 调整脏腑功能
- E. 调整气血关系，相因制宜

答案：B

13、肾病综合征严重水肿病人起身应慢，以防止：

- A. 体位性低血压
- B. 高血压
- C. 坠床
- D. 皮肤损伤

答案：A

14、洋地黄中毒引起窦性心动过缓，心室率 50 次 / min，首先

- A. 氯化钾
- B. 苯妥英钠
- C. 阿托品
- D. 人工心脏起搏器
- E. 普萘洛尔

答案：C

15、全血细胞减少、骨髓三系增生低下，你认为符合下列何种疾病护理评估的实验查：

- A. 缺铁性贫血
- B. 再生障碍性贫血
- C. 急性白血病
- D. 慢性白血病
- E. 特发性血小板减少性紫癜

答案：B

16、下列哪项是洋地黄中毒最常见的临床表现

- A. 恶心、呕吐
- B. 室早二联律
- C. Q—T 间期缩短
- D. 出现奔马律
- E. 黄视、绿视

答案：B

17、总产程不应超过多少小时：

A. 2 小时 B. 8 小时 C. 16 小时 D. 24 小时

答案：D

18、甲状腺功能亢进病因

A. 放射线过多

B. 对链球菌变态反应

C. 直接病毒感染

D. 直接细菌感染

E. 自身免疫性

答案：E

19、慢性肾炎的饮食应选择

A. 低优质蛋白、低磷饮食

B. 低优质蛋白、低钙饮食

C. 高优质蛋白、低钠饮食

D. 高优质蛋白、高糖饮食

E. 高优质蛋白、高磷饮食

答案：A

20、引起近年来糖尿病患者最主要的死亡原因是

A. 心血管并发症

B. 肾脏病变

C. 神经病变

D. 眼部病变

E. 糖尿病足

答案：A

21、出现阵发性夜间呼吸困难提示

A. 肺结核

B. 肺心病

C. 左心衰竭

D. 支气管哮喘

E. 大叶肺炎

答案：C

22、低蛋白饮食对慢性肾炎有何好处

A. 达到低糖

B. 达到低磷

C. 达到低脂

D. 达到低热量

E. 达到低钙

答案：B

23、心力衰竭临床表现的基本原理是

A. 肺循环充血，体循环缺血

B. 动脉系供血不足，静脉系瘀血

C. 微循环血流灌注不足

D. 急性肺水肿致组织缺氧

E. 体液潴留致细胞水肿

答案：A

24、先天性心脏病中最常见的类型是

A. 室间隔缺损 B. 房间隔缺损 C. 动脉导管未闭 D. 法洛四联症 E. 肺动脉瓣狭窄

答案：A

25、以下几类对负性情绪的描述，错误的是：

A. 焦虑是一种对即将来临的情况产生的情绪反应 B. 恐惧是一种较高强度的负性情绪反应 C. 愤怒是人们面对危险情境或对预期将要受到的伤害产生的负性情绪 D. 抑郁是一种情绪低落状态

答案：C

26、关于一般成人脑脊液量的叙述，错误的是：

A. 脑脊液总量为 100~160ml B. 每日产生脑脊液 400~500ml C. 脑脊液总量约占颅腔容积的

10% D. 脑脊液总量约占颅腔内血流量的 10%

答案：D

27、尿毒症病人必有的；临床表现为：

A. 皮肤尿素霜沉着

B. 嘴内尿味或金属味

- C. 纤维素性胸膜炎
- D. 纤维素性心包炎
- E. 贫血

答案：E

28、一患者吸氧的流量为 4L/min，其吸氧的浓度是

- A. 40% B. 37% C. 33% D. 27% E. 25%

答案：B

29、无外界刺激而自发地感到某部位有蚁行感称为：

- A. 感觉减退
- B. 感觉倒错
- C. 感觉分离
- D. 感觉异常
- E. 感觉过度

答案：D

30、男性，65 岁，冠心病患者，重度体力活动时，有心悸、气短，可诊断为：

- A. 心功能 I 级
- B. 心功能 II 级
- C. 心功能 III 级
- D. 心功能 IV 级
- E. 以上都不是

答案：A

31、癔病性痉挛的主要表现，下列哪项是错误的

- A. 抽搐 B. 痉挛 C. 无发作先兆 D. 病理反射阳性 E. 不易跌伤

答案：D

32、口腔真菌感染时，漱口液应选择

- A. 1%~2%龙胆紫 B. 1%~3%碳酸氢钠溶液 C. 0.1%利凡诺溶液 D. 0.02%呋喃西林 E. 朵贝液

答案：B

33、慢性肾衰竭病人的内生肌酐清除率 Ccr 为多少时提示已进入尿毒症期：

- A. <10ml/min B. <20ml/min C. <25ml/min D. <50ml/min

答案：A

34、给患者投用洋地黄类药物前，护士应先测量

- A. 体温
- B. 脉搏
- C. 呼吸
- D. 血压
- E. 体重

答案：A

35、高女士，19岁“上呼吸道感染”已2天，今起寒战高热，体温39℃，伴头痛、呕吐。劲有抵抗，Kernig征阳性，胸部见数枚瘀斑。为尽快确诊，首选的检查是

- A. 血液一般检查(血常规)
- B. 血培养
- C. 脑脊液检查
- D. 皮肤瘀斑病原学检查
- E. 血清免疫学检查

答案：C

36、在下列术后出血的原因中，除外哪项：

- A. 凝血机制障碍
- B. 术中止血不完善
- C. 术后结扎线脱落
- D. 未施行加压包扎

答案：D

37、不符合心房颤动的心电图特征是 A. 出现形态，大小不一的 f 波

- B. R—R 间隔不相等
- C. QRS 波形态正常
- D. 窦性 P 波消失
- E. 心室率 350-600 次 / min

答案：E

38、角膜移植术前滴

- A. 阿托品眼药水
- B. 1%毛果芸香碱眼药水
- C. 15%磺胺醋酰钠眼药水
- D. 0.25%氯霉素眼药水
- E. 0.1%利福平眼药水

答案：B

39、患者，男，16岁，室间隔缺损封堵术后第二天，出现面色发黄、尿呈酱油色，该患者最有可能并发了：

A. 病毒性肝炎 B. 急性肾小球肾炎 C. 溶血 D. 感染性心内膜炎

答案：C

40、最常见的肺炎是

A. 肺炎球菌

B. 支原体

C. 病毒

D. 寄生虫

E. 真菌

答案：A

41、出血倾向病人禁食过硬过粗糙食物，这是因为

A. 不易消化

B. 防消化道出血

C. 营养不佳

D. 缺乏铁质

E. 缺乏蛋白质

答案：B

42、护理咯血窒息患者的第一步骤是

A. 解除呼吸道阻塞 B. 加压给氧 C. 使用呼吸兴奋剂 D. 输血 E. 口对口人工呼吸

答案：A

43、下列不符合环境卫生学标准的是

A. 层流手术室物体表面细菌数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$ B. 普通手术室空气细菌数 $\leq 200\text{cfu}/\text{cm}^3$ C. 婴儿室的物体表面细菌数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$ D. 婴儿室空气细菌数 $\leq 500\text{cfu}/\text{cm}^3$ E. 重症监护室医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

答案：D

44、关于灌肠的注意事项下列哪项不正确

A. 为患者解除便秘时，液体应保留 5~10 分钟 B. 为患者降温时，液体的温度宜为 4°C C. 保留灌肠宜保留 1 小时以上 D. 大量不保留灌肠的压力宜为 $40\sim 60\text{cmH}_2\text{O}$ E. 肝昏迷患者不能用肥皂水灌肠

答案：B

45、西咪替丁和雷尼替丁属于

- A. 抗胆碱能药物
- B. 胃泌素受体拮抗剂
- C. 组胺 H⁺受体拮抗剂
- D. 组胺 H₂ 受体拮抗剂
- E. H⁺-K⁺-ATP 酶泵抑制剂

答案：D

46、下列关于丹毒的叙述，错误的是：

- A. 好发于面部和四肢
- B. 可引起皮肤及淋巴结的炎症
- C. 感染加重可导致全身脓毒血症
- D. 常有组织坏死或局部化脓破溃

答案：D

47、护患沟通中对建立良好第一印象至关重要的一项是：

- A. 自我介绍
- B. 注意外在形象
- C. 记住病人姓名
- D. 介绍护理单元

答案：B

48、甲亢术前加服碘剂的主要目的是

- A. 减少甲状腺素释放
- B. 抑制术后纤维组织增生
- C. 减少甲状腺血供，使腺体坚实
- D. 抑制自身免疫，使术后不会因诱发自身免疫而导致甲状腺功能减退
- E. 以上都不是

答案：C

49、肝硬化内分泌失调引起的表现为：

- A. 营养障碍
- B. 出血
- C. 皮肤色素沉着
- D. 贫血
- E. 腹泻、舌炎

答案：C

50、重度贫血伴有以下哪些症状

- A. 颜面苍白、怕冷乏力
- B. 脉搏血压随体位改变

C. 意识障碍、出汗、四肢厥冷

D. 眩晕、心悸、尿少

E. 焦虑、紧张

答案：D

51、肝昏迷病人经治疗神志恢复后可逐渐给予蛋白质饮食，最适宜的选择是

A. 动物蛋白质

B. 蔬菜、水果

C. 碳水化合物

D. 植物蛋白质

E. 每日蛋白质在 40g 以上

答案：D

52、霍乱常见的并发症有下列各种，除外

A. 代谢性酸中毒

B. 急性肾功能衰竭

C. 肠出血、肠穿孔

D. 低钾综合征

E. 急性肺水肿

答案：C

53、慢性粒细胞白血病体检特点

A. 皮肤有瘀斑

B. 肺有湿罗音

C. 肝脾均大

D. 全身淋巴结大

E. 巨脾

答案：E

54、红细胞平均体积英文简称

A. MCV

B. MCHC

C. MCH

D. MVC

E. MAH

答案：A

55、细菌性食物中毒常见的病原体，不包括下列哪项：

A. 沙门菌属 B. 副溶血性弧菌 C. 绿脓杆菌 D. 大肠杆菌

答案：C

56、百日咳主要传播途径为：

A. 飞沫传播

B. 食物传播

C. 饮水传播

D. 尘埃传播

E. 以上均可

答案：A

57、下列有关糖化血红蛋白 A1 (GHbA1c) 的叙述，错误的是：

A. 是血红蛋白与葡萄糖非酶化结合而成的 B. 其量与血浆葡萄糖浓度呈正相关，为可逆反应 C. 有 a、b、c 三种，以 GHbA1c 为主，常写为 HbA1c D. 可反映取血前 4~12 周血浆葡萄糖的总水平，是糖尿病控制情况的监测指标之一

答案：B

58、床上铺橡皮单，其上端距床头相当于

A. 一手掌宽 B. 3 横指 C. 肘至指端 D. 腕至指端 E. 肘关节至腕关节

答案：C

59、可转为慢性肝炎并发展为肝硬化和肝癌的病毒性肝炎类型是

A. 甲型、乙型、丙型

B. 乙型、丙型、丁型

C. 丙型、丁型、戊型

D. 甲型、丙型、戊型

E. 乙型、丁型、戊型

答案：B

60、下列哪一组症状符合再生障碍性贫血

A. 贫血、出血、肝肿大、未梢血幼稚细胞为 0.08

B. 贫血、出血、发热、全血细胞减少

C. 出血、轻度贫血、脾大、血小板 $20 \times 10^9/L$

D. 贫血、出血、黄疸、血红蛋白尿

E. 贫血、乏力、巨脾

答案： B

61、遵医嘱指导消化道溃疡病人进半流质饮食，下列适宜的是：

A. 牛奶 B. 豆浆 C. 米汤 D. 蒸蛋

答案： D

62、无菌操作是

A. 杀灭病原微生物的方法 B. 杀灭物体所有微生物的方法 C. 杀灭活的微生物的方法 D. 防止微生物进入机体或物体的方法 E. 防止或抑制微生物生长繁殖的方法

答案： D

63、急性肾衰竭病人每日饮食中所提供的热量应为：

A. $>126kJ/(kg \cdot d)$ B. $>146kJ/(kg \cdot d)$ C. $>1500kcal/(kg \cdot d)$ D. $>100kJ/(kg \cdot d)$

答案： A

64、对肾性水肿肾功能正常者，错误的护理措施是

A. 低蛋白饮食

B. 限制钠盐摄入

C. 保持皮肤清洁

D. 静脉输液需控制滴速和总量

E. 病室定期清洁、消毒

答案： A

65、各种肾脏疾病的终末期表现多为：

A. 肾功能受损

B. 肾功能失代偿期

C. 氮质血症期

D. 肾功能衰竭期

E. 尿毒症期

答案： A

66、拔牙时不需行心电监护的病人是：

A. 年老体弱的病人 B. 有恐惧心理的病人 C. 无拔牙禁忌证的高血压、心脏病患者 D. 并发心

血管病变的肺、肝、肾、糖尿病患者

答案：B

67、丁先生,30岁,严重挤压伤住院,入院后病情进行性恶化,第2日神志不清。血压80/60mmHg,尿量24h约500ml,护士血标本时,发现血液黏稠易凝固。该病人可能并发

- A. 弥散性血管内凝血(DIC)
- B. 败血症
- C. 感染性休克
- D. 急性肾衰竭
- E. 心功能不全

答案：A

68、甲型肝炎的传播方式是

- A. 飞沫
- B. 粪一口
- C. 母一婴
- D. 血液传播为主
- E. 虫媒

答案：B

69、高压氧下血氧含量增加,主要是由于

- A. 氧合血红蛋白的亲合力增加
- B. 血浆中物理溶解氧增加
- C. 血液中游离氧增加
- D. 结合氧的离解减少
- E. 机体耗氧量减少

答案：B

70、宋先生,40岁。近月来低热、盗汗、全身乏力,伴食欲减退,腹泻和体重减轻。体温37.8℃,两侧颌下,颜下及腹股沟淋巴结均增大,无压痛,能活动。血白细胞 3.5×10^9 /L,血清抗-HIV(+).制定护理计划时应列在首选的护理诊断是

- A. 体温过高
- B. 活动无耐力
- C. 腹泻
- D. 营养失调:低于机体需要量
- E. 有传播感染的危险

答案：E

71、某慢性阻塞性肺疾病病人胸部叩诊过清音，语颤减弱，可确诊

- A. 正常
- B. 胸廓畸形
- C. 脊柱畸形
- D. 老年性肺气肿
- E. 阻塞性肺气肿

答案：E

72、肝硬化患者出现全血细胞减少，最主要的原因是

- A. 功能性肾衰竭
- B. 营养吸收障碍
- C. 上消化道大量出血
- D. 脾功能亢进
- E. 凝血因子合成减少

答案：D

73、护理计划的内容不包括：

- A. 护理目标 B. 治疗方案 C. 护理措施 D. 护理评价

答案：B

74、晚育是指按法定年龄推迟多少年以上生育的：

- A. 1年 B. 2年 C. 3年 D. 4年

答案：C

75、输血过程中最严重的反应是：

- A. 发热反应 B. 过敏反应 C. 溶血反应 D. 肺水肿反应

答案：C

76、依据赛里的压力学说，下列哪项不是人体对压力原的反应分期：

- A. 警觉期 B. 否认期 C. 抵抗期 D. 衰竭期

答案：B

77、腹部揉面感见于

- A. 结核性腹膜炎
- B. 溃疡性结肠炎
- C. 急性胰腺炎

D. 化脓性腹膜炎

E. 胃穿孔

答案：A

78、借空气传导的声音受到外耳道、中耳病变的阻碍，到达内耳的声能减弱，致使不同程度听力减退者称：

A. 感音性聋 B. 传导性聋 C. 混合性聋 D. 噪声性聋

答案：B

79、产前检查时间应从何时开始：

A. 孕3月 B. 孕4月 C. 孕5月 D. 从确诊早孕开始

答案：D

80、产褥期是指：

A. 从胎儿娩出到产妇全身各器官恢复正常状态所需的时间 B. 从胎盘娩出到产妇全身各器官乳房除外恢复或接近正常未孕状态所需的时间 C. 从胎盘娩出到产妇全身各器官恢复正常状态所需的时间 D. 从胎儿娩出到产妇子宫复原所需的时间。

答案：B

81、诊断急性心肌梗死特异性最高的血清酶是：

- A. 天冬氨酸氨基转移酶（AST）
- B. 肌酸磷酸激酶同工酶 MB（CPK-MB）
- C. 乳酸脱氢酶同工酶（LDH1）
- D. 肌酸激酶（CK）
- E. 丙氨酸氨基转移酶（ALT）

答案：B

82、肾脏病治疗过程中注意药物有何不良反应

- A. 有些药物能损害肾
- B. 有些药物经肾排出保肾
- C. 可减低免疫性而感染
- D. 可增加食欲、增强营养
- E. 可减轻心脏负荷

答案：A

83、男性，25岁，突发剧烈头痛，伴频繁呕吐，继之神志不清。检查：体温 36.8℃，颈强，心、肺

无异常，肢体无偏瘫，应考虑为

- A. 脑出血
- B. 脑血栓形成
- C. 脑梗死
- D. 脑栓塞
- E. TIA

答案：D

84、下述哪种情况不能获得特异性免疫：

- A. 隐性感染
- B. 患传染病后
- C. 注射疫苗
- D. 注射胎盘球蛋白
- E. 饮食疗法

答案：E

85、原发肾病综合征常可自发形成血栓原因是

- A. 血小板增多
- B. 血管内皮易受损
- C. 组织因子易释放
- D. 血液多呈高凝状态
- E. 红细胞增多

答案：D

86、某急性心肌梗死患者，起病第2天体温升高(38.4℃)持续2天后自行退热，您考虑发热的原因主要为

- A. 心肌梗死后综合征
- B. 坏死组织吸收
- C. 肺部继发感染
- D. 感染性心内膜炎
- E. 病室内交叉感染

答案：B

87、急性胃扩张病人的呕吐物一般为：

A. 宿食，不含胆汁 B. 咖啡色或草绿色 C. 褐色混浊物 D. 粪水样

答案：B

88、服用铁剂的最佳时间是：

A. 餐前 B. 餐中 C. 两餐之间 D. 临睡前

答案：B

89、引起小儿佝偻病的主要原因是

A. 缺钙 B. 晒太阳少 C. 食物中蛋白质缺乏 D. 甲状旁腺功能减退 E. 食物中钙、磷比例不当

答案：B

90、左心衰竭可出现

A. 下肢水肿

B. 腹水

C. 交替脉

D. 颈静脉怒张

E. 肝大

答案：C

91、给患者换用洋地黄类药物前，护士应先测量

A. 体温

B. 脉搏

C. 呼吸

D. 血压

E. 体重

答案：B

92、角膜移植手术为预防排斥反应术后应使用哪一种眼液：

A. 匹鲁卡品眼液 B. 可的松眼液 C. 噻吗咯尔眼液 D. 阿托品眼液

答案：B

93、中毒性痢疾采用山度莨菪碱转疗的主要作用是：

A. 控制抽搐

B. 兴奋呼吸中枢

C. 解除肠道痉挛

D. 抑制频繁的腹泻

E. 解除微血管痉挛

答案：E

94、洋地黄中毒常见的心电图表现是：

A. Q-T 间期缩短

B. 心电图 AT-T 鱼钩状改变

C. 窦性心动过缓

D. 三度房室传导阻滞

E. 室性早搏二联律

答案：E

95、溃疡并发幽门梗阻时的护理措施是。

A. 流质饮食

B. 每餐前洗胃

C. 减少补液

D. 忌胃肠减压

E. 记出入液量.

答案：E

96、局部浸润麻醉选用普鲁卡因时，其常用浓度为

A. 0.5% B. 1% C. 1.5% D. 2% E. 2.5%

答案：A

97、二尖瓣狭窄患者出现右心衰竭时，下列哪项表现反而减轻

A. 发绀

B. 颈静脉充盈

C. 水肿

D. 咯血丝痰

E. 呼吸困难

答案：E

98、脑干一侧受损害时可出现：

A. 单瘫

B. 偏瘫

C. 交叉瘫

D. 截瘫

E. 四肢瘫

答案：C

99、子宫内膜癌早期白带的改变为：

A. 水样或水样血性 B. 脓性 C. 脓血性 D. 白带有臭味

答案：A

100、低浓度吸氧、氧流量为：

A. 5-6L/min

B. 2-3L/min

C. 1-2L/min

D. 1-2L/s

E. 2-3L/s

答案：C

101、抢救青霉素过敏性休克的首选药物是

A. 盐酸肾上腺素 B. 去甲肾上腺素 C. 异丙肾上腺素 D. 盐酸异丙嗪 E. 多巴胺

答案：A

102、尿蛋白定量测定，尿标本中应加入何种防腐剂

A. 甲苯 B. 浓盐酸 C. 甲醛 D. 碳酸 E. 高锰酸钾

答案：A

103、双侧颞叶损害时引起严重的

A. 听觉障碍

B. 视觉障碍

C. 记忆障碍

D. 肢体瘫痪

E. 失写

答案：C

104、有关帮助危重病人翻身时注意事项的叙述，不正确的是：

A. 翻身前应评估病人的病情是否允许翻身 B. 脊柱脊髓手术后，翻身时注意轴线翻身，防止脊柱屈曲或扭转 C. 颅脑手术后，翻身时应有人扶头部，防止颈部扭曲引起颅内压增高，只能卧于患侧或平卧 D. 若病人身上带有多根管道，应妥善安置好各种管道，防止因牵拉导致移位和脱出

答案：C

105、关于使用中的消毒剂、灭菌剂的监测，下列哪项是错误的

- A. 应进行生物和化学监测 B. 生物监测：消毒剂每季度 1 次，其细菌含量必须 $<100\text{cfu/mL}$ ，不得检出致病性微生物 C. 灭菌剂每月生物监测 1 次，不得检出任何微生物 D. 含氯消毒剂、过氧乙酸等的浓度应每天监测 E. 对戊二醛浓度的监测应每月不少于 1 次

答案：E

106、心脏的正常起搏点位于：

- A. 窦房结 B. 房室结 C. 房室交界 D. 心房肌

答案：A

107、高压氧治疗一氧化碳中毒的主要机制是

- A. 血浆中物理溶解氧量增加 B. 血液中结合氧量增加 C. 血液中血红蛋白增加 D. 氧和血红蛋白的亲合力增加 E. 机体的摄氧能力增强

答案：A

108、现场急救电击伤患者的第一步是

- A. 切断电源 B. 胸外心脏按压 C. 包扎创面 D. 注射 TAT E. 预防感染

答案：A

109、猩红热病人急性期需绝对卧床休息 2—3 周，其目的是：

- A. 减少并发症发生
B. 减轻中毒症状
C. 防止疹退脱皮
D. 缩短病程
E. 防止发生心力衰竭

答案：A

110、卵巢分泌的激素是

- A. 雌激素、孕激素、雄激素 B. 雌激素、孕激素 C. 雌激素、孕激素、促黄体素 D. 雌激素、孕激素、促卵泡激素 E. 雌激素、孕激素、催乳素

答案：A

111、缺铁性贫血是体内用来制造下列哪种成分的贮存铁缺乏

- A. 红细胞
B. 白细胞

- C. 血小板
- D. 血红蛋白
- E. 骨髓

答案：D

112、急性白血病卧床休息有何益处

- A. 增加食欲
- B. 减少出血
- C. 减少感染
- D. 减少体力消耗
- E. 减少贫血

答案：D

113、心肌梗死症状中最先出现哪一项

- A. 发热
- B. 恶心
- C. 疼痛
- D. 呼吸困难
- E. 昏厥

答案：C

114、糖尿病最严重的并发症是

- A. 皮肤感染
- B. 泌尿系感染
- C. 酮症酸中毒
- D. 低血糖
- E. 白内障

答案：C

115、SLE 脏器损害最常见于：

- A. 心
- B. 肺
- C. 肝
- D. 脾

E. 肾

答案：E

116、糖尿病膳食治疗的目的中，下列哪项是错误的

A. 调整膳食中糖的供给量 B. 减轻胰岛细胞的负担 C. 纠正糖代谢紊乱 D. 降低血糖 E. 消除症状

答案：A

117、女性患者，24岁。贫血1年。血红蛋白80g/L，红细胞 3×10^{12} 次方/L，网织红细胞0.007，白细胞、血小板正常。经口服铁剂治疗7天后，血红蛋白不升，网织红细胞为0.0143，最可能的诊断是

A. 溶血性贫血
B. 再生障碍性贫血
C. 巨幼红细胞性贫血
D. 缺铁性贫血
E. 脾功能亢进

答案：D

118、SLE病人长期应用糖皮质激素治疗者可发

A. 股骨头无菌性坏死
B. 体位性低血压
C. 关节畸形、关节固定于屈位
D. 面部表情丧失呈假面具样
E. 雷诺氏现象

答案：A

119、1岁半小儿患婴儿腹泻伴重度脱水，有关静脉补液问题下列哪项不妥

A. 先盐后糖 B. 先晶后胶 C. 先慢后快 D. 见尿补钾 E. 注意药物的配伍禁忌

答案：C

120、某患者于输血过程中出现畏寒、寒战，体温 40°C ，伴头痛、恶心、呕吐，首先考虑是

A. 发热反应 B. 超敏反应 C. 溶血反应 D. 急性肺水肿 E. 枸橼酸钠中毒反应

答案：A

121、急性下壁心肌梗死病人最常见的心律失常是

A. 房室传导阻滞

- B. 心房颤动
- C. 频发室性期前收缩
- D. 频发房性期前收缩
- E. 阵发性室性心动过速

答案：A

122、诊断甲亢的主要依据是：

- A. 症状和体征
- B. 基础代谢率测定
- C. 血清蛋白结合碘测定
- D. 血清甲状腺素测定
- E. 放射性 ^{131}I 甲状腺摄取率测定

答案：A

123、颈动脉系统 TIA 常见症状为

- A. 单肢无力
- B. 耳鸣
- C. 阵发性眩晕
- D. 复视
- E. 意识障碍

答案：A

124、迅速控制菌痢流行，最主要的措施是

- A. 加强门诊工作
- B. 及时隔离治疗病人
- C. 管理传染源
- D. 切断传播途径
- E. 口服痢疾减毒活疫苗

答案：D

125、正常妇女排卵后基础体温可升高：

- A. $0.1\sim 0.2^{\circ}\text{C}$
- B. $0.3\sim 0.5^{\circ}\text{C}$
- C. 0.6°C
- D. 1°C

答案：B

126、甲状腺功能亢进病人最主要的护理诊断是

- A. 知识缺乏
- B. 自我形象紊乱
- C. 营养失调
- D. 焦虑
- E. 睡眠型态紊乱

答案：D

127、下列重型肝炎病人的护理措施哪项不妥

- A. 观察黄疸是否进行性加深
- B. 消化道症状是否改善
- C. 给予高脂、高蛋白饮食
- D. 病人绝对卧床休息
- E. 专人陪护

答案：C

128、换药的基本操作中。错误的是

- A. 揭出胶布和外层敷料用手不用镊子
- B. 里层敷料和创面有粘连时应用无菌盐水湿润后再揭
- C. 双手持镊操作中，一把镊子被污染时，可用另一把镊子继续换药操作
- D. 乙醇棉球只能消毒创面周围皮肤
- E. 盐水棉球轻轻拭去伤口内分泌物和脓液

答案：C

129、流行性出血热的病原体是：

- A. 细菌
- B. 病毒
- C. 立克次体
- D. 螺旋体
- E. 支原体

答案：B

130、配制混合胰岛素时，必须先抽吸正规胰岛素是为了防止：

- A. 发生中和反应
- B. 加速胰岛素降解
- C. 丧失正规胰岛素的速效特征
- D. 降低鱼精蛋白锌胰岛素药效

E. 增加胰岛素的不良反应

答案：C

131、52岁男性患者，被诊断为急性下壁心肌梗死，其绝对卧床3天来未解大便。在下列促进排便的护理措施中，您拟选择

- A. 加强主动活动促进肠蠕动
- B. 作腹部加压按摩促进排粪
- C. 投给硫酸镁 120g 口服导泻
- D. 开塞露肛内注入
- E. 温盐水高位灌肠

答案：D

132、肝动脉栓塞术后护理不包括

- A. 防寒保暖
- B. 禁食 2—3 天
- C. 药物降温
- D. 密切观察
- E. 48h 内注射替啶

答案：C

133、给中暑病人体内降温时，用于灌肠的葡萄糖盐水的温度为：

- A. 4~10℃
- B. 10~15℃
- C. 0~4℃
- D. 15~20℃

答案：A

134、对急性胃炎具有确诊价值的检查是

- A. 胃液分析
- B. 胃镜检查
- C. 血清学检查
- D. 活组织检查
- E. 胃脱落细胞检查

答案：B

135、控制疟疾临床发作的首选药物是

- A. 青蒿素
- B. 奎宁

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/395042201133011242>