

助理医师考试临床助理(习题卷135)

说明：答案和解析在试卷最后

第1部分：单项选择题，共100题，每题只有一个正确答案，多选或少选均不得分。

1. [单选题] 婴儿不典型结核性脑膜炎首发的症状是

- A) 嗜睡
- B) 惊厥
- C) 前凶膨隆
- D) 喷射性呕吐
- E) 急起高热

2. [单选题] 通气/血流比值是指

- A) 每分钟肺通气量与每分钟肺血流量之比
- B) 每分钟肺泡通气量与每分钟肺血流量之比
- C) 最大通气量与每分钟肺血流量之比
- D) 肺活量与每分钟肺血流量之比
- E) 功能性残气量与肺血流量之比

3. [单选题] 男性，74岁。反复咳喘20年。体检：桶状胸，双肺呼吸音减低。肺功能测定：肺活量占正常预计值70%，第1秒用力呼气容积占用力肺活量50%，残气量占肺总量45%，肺总量稍降低。其肺功能损害属哪一类型？（ ）

- A) 限制型通气障碍
- B) 阻塞型通气障碍
- C) 以限制为主的混合型通气损害
- D) 以阻塞为主的混合型通气损害
- E) 混合型通气损害

4. [单选题] 男，32岁。打球后突发头痛、呕吐，伴右上肢Jackson癫痫半分钟，先后2次，神经系统检查，颈有阻力，右上肢肌力III°，右上肢二头、三头肌腱反射抗进，余无异常。脑脊液均匀血性。镜检红细胞满视野，糖和氯化物正常。为明确病因最佳的检差是

- A) CT
- B) MRI
- C) 脑电图
- D) 经颅超声多普勒
- E) 脑动脉血管造影

5. [单选题] 下列病变不属于肉芽肿性炎的是

- A) 肺肉质变
- B) 伤寒小结
- C) 结核结节
- D) 慢性虫卵结节
- E) Aschoff小体

6. [单选题] 女性，35岁，近6年反复痰中带血或大咯血。轻咳，有少量黏液痰，无低热。胸片检查示“左下肺纹理增

粗、紊乱，呈卷发样，余肺清晰”。首先考虑可能是

- A) 慢性支气管炎
- B) 风心病
- C) 支气管扩张
- D) 支气管内膜结核
- E) 肺癌早期

7. [单选题]肾小球滤过的动力有效滤过压等于

- A) 肾小球毛细血管血压+血浆胶体渗透压-囊内压
- B) 肾小球毛细血管血压+血浆胶体渗透压+囊内压
- C) 肾小球毛细血管血压-血浆胶体渗透压+囊内压
- D) 肾小球毛细血管血压-血浆晶体渗透压-囊内压
- E) 肾小球毛细血管血压-（血浆胶体渗透压+囊内压）

8. [单选题]能够诊断患者是动脉粥样硬化的检查不包括

- A) 无创性血管检查
- B) 血脂检查
- C) X线平片
- D) 动脉造影
- E) 体温

9. [单选题]前列腺癌哪个部位转移率较高

- A) 骨转移
- B) 肺转移
- C) 脑转移
- D) 肾转移
- E) 膀胱转移

10. [单选题]下列哪项不是骨肉瘤的典型临床表现？

- A) 多见于年轻人
- B) 好发于骨骺生长活跃部位
- C) 骨膜下三角形新生骨（Codman三角）
- D) 为一密度减低的阴影，病灶内有钙化斑点或絮状斑片
- E) 早期肺转移

11. [单选题]女，15岁。发热伴血尿两天来诊。查体：面色苍白，全身皮肤黏膜未见黄染，皮肤有散在出血点，未见齿龈增生，左腋下淋巴结肿大，胸骨压痛(+)，肝肋下未及，脾轻度肿大。血常规示

：Hb70g/L，WBC $19.2 \times 10^9/L$ ，PLT $60 \times 10^9/L$ 。如果该患者为首诊，则首选的治疗方案是A. 使用雄激素和一些免疫抑制剂，如：AL

- A) ATG
- B) 使用维甲酸
- C) 选用VP方案或VLP方案
- D) 选用CHOP方案
- E) 放射治疗

12. [单选题]女性，78岁。剧烈心前区疼痛6小时不缓解，急诊心电图提示广泛前壁心肌梗死。查体：BP

100 / 60mmHg，呼吸急促，30次/分，口唇发绀，双肺底闻及细小水泡音，心率120次/分，心尖区第一心音减弱，可闻及舒张期奔马律。最可能的诊断是（ ）。

- A) 急性广泛前壁心肌梗死合并肺部感染
- B) 急性广泛前壁心肌梗死合并心律失常
- C) 急性广泛前壁心肌梗死合并心力衰竭

- D) 急性广泛前壁心肌梗死合并心源性休克
- E) 急性广泛前壁心肌梗死合并肺栓塞

13. [单选题]为判断幽门螺杆菌是否被清除，正确的检查时间应在治疗结束后至少（ ）。

- A) 3天
- B) 1周
- C) 2周
- D) 3周
- E) 4周

14. [单选题]以下哪项记忆不是根据内容分类

- A) 形象记忆
- B) 运动记忆
- C) 情绪记忆
- D) 逻辑记忆
- E) 感觉记忆

15. [单选题]从情感范畴来看，爱国心是一种（ ）。

- A) 责任感
- B) 道德感
- C) 情操
- D) 集体感
- E) 荣誉感

16. [单选题]患儿，3岁，按时接种疫苗，诊断原发综合征，对症治疗，不见好转，甚至有加重的表现，转到上级医院就诊。[问题2][题]该患者就本病可能加重的原因是除了

- A) 机体呈高敏状态
- B) 年龄较小
- C) 治疗不规范
- D) 第二次感染造成
- E) 免疫低下

17. [单选题]下述各项中属于医生违背有利原则的是

- A) 医生检查病人时，由于消毒观念不强，造成交叉感染
- B) 医生满足病人的一切保密要求
- C) 妊娠危及母亲的生命时，医生给予引产
- D) 医生对病人的呼叫或提问给予应答
- E) 医生的行为使某个病人受益，但却损害了别的病人的利益

18. [单选题]在治疗骨折时，下述哪种情况对骨折的愈合过程影响不大

- A) 固定不够确实
- B) 未获得功能复位，断端虽对位尚可，但对线不良
- C) 持续牵引过度，骨端稍有分离
- D) 数次手法复位，损伤软组织及骨外膜
- E) 切开复位，剥离了骨外膜

19. [单选题]患者女，发现二尖瓣狭窄20年，夜间阵发性呼吸困难10年，下肢水肿，腹胀，右上腹胀痛5年。1周前，开始咳嗽，咳黄痰。需高枕卧位，颈静脉怒张，双肺底下有少量湿啰音，肝肋下2指，压痛，下肢凹陷性水肿。诊断为心功能不全的哪一类型

- A) 左心功能不全
- B) 右心功能不全

- C) 全心衰竭
- D) 心功能三级
- E) 心功能四级

20. [单选题] 患者女，35岁。过去有肺结核史，近2个月咳嗽、无痰、少量间断咯血，乏力，胸片未见活动性结核病变，但痰结核菌两次(+)，进一步应首先检查

- A) 胸CT
- B) 血沉
- C) 纤维支气管镜
- D) 结核菌素试验
- E) 痰脱落细胞

21. [单选题] 排尿反射的感受器是

- A) 膀胱壁的牵张感受器
- B) 尿道的感受器
- C) 盆神经
- D) 脊髓
- E) 骶髓

22. [单选题] 男，45岁。36小时前施工时右下肢被石板砸伤，X光片摄片，未见骨折，行清创缝合。现突然出现烦躁不安，伴恐惧感，大汗淋漓，自述右下肢伤处疼痛加重，胀裂感。体温38.5° C, 脉搏128次/分，血压146/92 mmHg, 右小腿肿胀明显，大浆液血性渗出物自切口渗出，皮肤表面呈大理石样花纹，渗出物有恶臭味。治疗上不恰当的是

- A) 右下肢广泛，多出切开
- B) 800万U青霉素静脉注射
- C) 输200ml同型新鲜血
- D) 右下肢截肢
- E) 高压氧疗法

23. [单选题] 患儿2岁，生后半年发现尿有霉臭味，且经常呕吐，1岁时发现智力较同龄儿落后、目光呆滞、皮肤白晰、毛发浅黄，下列哪项对该患儿诊断最有帮助

- A) 脑电图
- B) 头颅CT
- C) 染色体核型分析
- D) 尿三氯化铁试验
- E) 血液T3、T4测定

24. [单选题] 女，30岁，因食欲不振、尿少、腹胀2个月住院。19岁检查时曾发现肝大。体检，消瘦，腹膨隆，肝未触及，脾肋下3cm，腹部移动性浊音阳性，腹水检查比重1.012，黏蛋白定性试验(-)，细胞数80×10

6

/L。下述利尿剂治疗时，宜首先选用

- A) 呋塞米
- B) 甘露醇
- C) 氢氯噻嗪
- D) 氨苯喋啶
- E) 螺内酯

25. [单选题] 主动脉瓣关闭发生于

- A) 快速射血期开始
- B) 快速充盈期开始
- C) 等容舒张期开始

- D) 等容收缩期开始
- E) 减慢充盈期开始

26. [单选题] 感染性心内膜炎不具有下列哪项临床表现？

- A) 皮肤黏膜瘀点
- B) 环形红斑
- C) 脾大
- D) 贫血
- E) 杵状指

27. [单选题] 关于妊娠期母体循环系统的改变. 正确的是 ()。

- A) 心排出量自妊娠15周逐渐增加
- B) 心排出量至32~34周达高峰
- C) 妊娠晚期休息时, 心率每分钟增加不足10次
- D) 妊娠期舒张压轻度增高
- E) 心脏容量至妊娠末期约增加30%

28. [单选题] 毛果芸香碱滴眼可引起

- A) 缩瞳, 升高眼内压, 调节痉挛
- B) 缩瞳, 降低眼内压, 调节麻痹
- C) 扩瞳, 降低眼内压, 调节麻痹
- D) 扩瞳, 升高眼内压, 调节痉挛
- E) 缩瞳, 降低眼内压, 调节痉挛

29. [单选题] 女, 32岁, 停经56天, 3天前开始有少量断续阴道出血, 昨日始右下腹轻痛, 今日疼痛加剧, 呕吐2次。妇检: 子宫口闭, 宫颈举痛(+), 子宫前倾前屈, 较正常稍大, 软, 子宫右侧可触及拇指大小较软之块物, 尿hCG(±), 后穹窿穿刺吸出10ml不凝血液, 血象: 白细胞 $10 \times 10^9 / L$, 中性0.8, 血红蛋白75g/L, 体温 $37.5^{\circ}C$, 血压 $10 / 6kPa$ (75 / 45mmHg) 最可能的诊断是

- A) 不完全流产
- B) 右卵巢黄体破裂
- C) 右输卵管妊娠
- D) 急性附件炎
- E) 卵巢囊肿蒂扭转

30. [单选题] 能准确测定肺血管血流动力学状态的唯一方法是

- A) 超声心动图
- B) 多普勒超声检查
- C) 右心导管术
- D) 心电图
- E) 肺ECT

31. [单选题] 相当于电泳分类法 α -脂蛋白的血浆脂蛋白是

- A) CM
- B) VLDL
- C) IDL
- D) LDL
- E) HDL

32. [单选题] 指出下列应用错误的是

- A) 细菌性心内膜炎首选链霉素加青霉素合用
- B) 铜绿假单胞菌感染常选庆大霉素与羧苄西林合用

- C) 结核病选用链霉素时应加用其他抗结核药
- D) 布氏杆菌病可选择链霉素与四环素合用
- E) 铜绿假单胞菌感染首选卡那霉素，鼠疫首选链霉素

33. [单选题] 李某因要报考研究生，欲向单位请假复习遂找到其中学同学、县医院的执业医师王某，请王某为其开具病假条。王某为李某开出了"病毒性心肌炎，全休1个月"的诊断证明书。对于王某的行为，县卫生局可以给予

- A) 吊销其医师执业证书
- B) 警告或责令其暂停执业活动3~6个月，并接受培训和继续教育
- C) 警告或责令其暂停执业活动6个月至1年
- D) 调离医师岗位
- E) 给予行政或纪律处分

34. [单选题] 哪种利尿药不宜与卡那霉素合用

- A) 氢氯噻嗪
- B) 呋塞米
- C) 螺内酯
- D) 阿米洛利
- E) 氨苯蝶啶

35. [单选题] 49岁妇女，绝经1年，阴道少许接触性出血，妇查：宫颈中度糜烂，宫体大小正常，宫颈刮片二次均为阴性，若进一步确诊，应选下述哪项检查

- A) 宫腔镜检查
- B) 染色体检查
- C) 宫腔冲洗液细胞学检查
- D) 分段诊刮
- E) 随访

36. [单选题] 高钾血症的治疗措施不包括

- A) 停所有的钾盐输入
- B) 给予透析
- C) 给予镁剂
- D) 给高渗葡萄糖胰岛素溶液
- E) 阳离子交换树脂

37. [单选题] 对局麻药最敏感的部位是

- A) 周围神经
- B) 神经节
- C) 髓鞘
- D) 以上均不是
- E) 神经细胞

38. [单选题] 女性，32岁。因不明原因发热2周来院门诊。体检：心脏有杂音。拟诊感染性心内膜炎入院为明确诊断抽血培养的最佳时间是A、先用抗生素3

- A) 体温不退时抽取
- B) 停用原用的抗生素2D后，抽取3~5次血培养
- C) 在抗生素应用前，在24小时中，于畏寒发热时抽3次血培养
- D) 原先抗生素可继续应用，抽取3次血培养
- E) 停用抗生素1~2周后抽取血培养3次

39. [单选题] 急性脊髓炎的可能诱因为

- A) 疫苗接种

- B) 肠道感染
- C) 败血症
- D) 肺炎
- E) 强直性脊柱炎

40. [单选题]下列哪种病变中不存在结核杆菌

- A) 钙化灶
- B) 典型的结核结节
- C) 病灶纤维化
- D) 干酪样坏死病灶
- E) 纤维干酪样病灶

41. [单选题]心尖部听到隆隆样舒张期杂音伴第一心音亢进提示

- A) 二尖瓣关闭不全
- B) 二尖瓣狭窄
- C) 室间隔缺损
- D) 二尖瓣狭窄
- E) 主动脉瓣关闭不全

42. [单选题]糖皮质激素抗炎平喘的药理作用不包括

- A) 抑制多种参与哮喘发病的炎症及免疫细胞
- B) 抑制细胞因子与炎症介质的产生
- C) 抑制气道高反应性
- D) 提高支气管及血管平滑肌对儿茶酚的敏感性
- E) 松弛支气管平滑肌

43. [单选题]男性，50岁，间歇性便血10余年，近1个月持续便血，量多，常呈喷射状，感头晕，肛诊齿状线上粘膜呈较大的串珠形隆起。应选择哪种治疗为佳

- A) 注射疗法
- B) 冷冻疗法
- C) 胶圈套扎疗法
- D) 手术切除
- E) 坐浴

44. [单选题]确诊结核性脑膜炎最可靠的依据为

- A) 脑膜刺激征阳性
- B) 胸部X线有原发结核病灶
- C) 脑脊液糖和氯化物含量同时减低
- D) 脑脊液查到结核杆菌
- E) OT试验阳性

45. [单选题]患者，男，16岁。近3年来逐渐变得少语少动，不与人交往，孤僻离群，对亲友冷淡，不讲究个人卫生。有时发呆。此患者最可能的诊断是（ ）。

- A) 青春型精神分裂症
- B) 品行障碍
- C) 单纯型精神分裂症
- D) 偏执性精神病
- E) 人格障碍

46. [单选题]结核病的组织坏死属于

- A) 凝固性坏死

- B) 液化性坏死
- C) 干酪样坏死
- D) 坏疽
- E) 纤维素样坏死

47. [单选题]腹壁下动脉包含在下列哪一结构中

- A) 脐正中襞
- B) 脐正中韧带
- C) 脐外侧襞
- D) 脐内侧襞
- E) 脐内侧韧带

48. [单选题]引起代谢性碱中毒的原因中，不包括

- A) 胃液丧失过多
- B) 严重腹泻
- C) 服用碱性药物过量
- D) 缺钾
- E) 长期使用呋塞米类利尿剂

49. [单选题]判断慢性胃炎有无活动的病理学依据是

- A) 浆细胞浸润
- B) 淋巴细胞浸润
- C) 淋巴滤泡形成
- D) 中性粒细胞浸润
- E) 肠上皮化生

50. [单选题]某高血压患者，测其血压为220/120mmHg。急起呼吸困难。不能平卧，双肺满布湿性啰音，宜选用哪种血管扩张剂治疗

- A) 苄胺唑啉
- B) 卡托普利
- C) 硝普钠
- D) 肼苯哒嗪
- E) 硝苯地平

51. [单选题]患者女，28岁。左手中指掌指关节处掌面被3cm锐器刺伤2小时，查体中指呈伸直位，感觉障碍，手指苍白发凉，Allen试验阳性。该患者诊断考虑为

- A) 皮肤裂伤
- B) 手指固有神经损伤
- C) 开放性指骨骨折
- D) 左中指屈指肌腱，两侧指固有神经和指动脉开放性损伤
- E) 左中指指伸肌腱损伤

52. [单选题]为了及时治疗急性中毒，应根据下列哪项做出中毒诊断

- A) 毒物鉴定分析
- B) 临床表现
- C) 毒物接触史和临床表现
- D) 毒物接触史
- E) 毒物接触史和毒物鉴定分析

53. [单选题]在急性蜂窝织炎中，浸润的炎细胞是（ ）。

- A) 浆细胞

- B) 淋巴细胞
- C) 嗜酸性粒细胞
- D) 中性粒细胞
- E) 巨噬细胞

54. [单选题]能够干扰谷氨酰胺参与合成嘌呤核苷酸的物质是

- A) 5-氟尿嘧啶
- B) 6-巯基嘌呤
- C) 氮杂丝氨酸
- D) 甲氨蝶呤
- E) 阿糖胞苷

55. [单选题]关于利多卡因的抗心律失常作用，哪一项是错误的

- A) 是窄谱抗心律失常药
- B) 能缩短浦氏纤维的动作电位时程和有效不应期
- C) 对传导速度的作用，受细胞外液K⁺浓度的影响
- D) 对心肌的直接作用是抑Na⁺内流，促K⁺外流
- E) 治疗剂量就能降低窦房结的自律性

56. [单选题]典型急性肾炎临床表现不包括

- A) 少尿
- B) 血尿
- C) 水肿
- D) 高血压
- E) 大量蛋白尿

57. [单选题]造成医患交往障碍的医生方面的原因不包括

- A) 技术水平低
- B) 医学术语病人难以理解
- C) 以权威或救世主自居
- D) 对于病人缺乏耐心
- E) 对病人缺乏同情和理解

58. [单选题]下列哪项不符合正常胎盘剥离情况

- A) 宫底向上升达脐上
- B) 阴道口外露脐带自行延长
- C) 向下压迫宫底脐带延长
- D) 耻骨联合上方轻压子宫下段，脐带不回缩
- E) 子宫体变硬呈球形

59. [单选题]促使缩胆囊素释放作用最强的物质是

- A) 蛋白分解产物
- B) 脂肪
- C) 脂酸钠
- D) 糖类
- E) HCl

60. [单选题]临床上壶腹周围癌最重要的症状是

- A) 黄疸
- B) 上腹疼及腰背疼
- C) 寒战、发热

- D) 消化道症状
- E) 贫血、消瘦

61. [单选题] 疑诊PTE时应进行的检查，除了

- A) X线胸片
- B) 心电图
- C) 肺活检
- D) 血浆D-二聚体
- E) 下肢深静脉超声

62. [单选题] 延伸至腹部的胸部标志线是

- A) 腋中线
- B) 胸骨线
- C) 腋后线
- D) 肩胛线
- E) 腋前线

63. [单选题] 在“尿生成影响因素”实验中，给家兔静脉注射20%葡萄糖溶液10毫升，尿量将显著增多，其原因是

- A) 肾小管液溶质浓度增加
- B) 抗利尿激素分泌减少
- C) 醛固酮分泌增加
- D) 肾小球滤过率增加
- E) 小球有效率过压增高

64. [单选题] 下列哪一个不是琥珀酸氧化呼吸链的成分？（ ）

- A) FMN
- B) 铁硫蛋白
- C) CoQ
- D) Cyt c
- E) Cyt c1

65. [单选题] 施行颈、胸部手术后，病人采取的体位是

- A) 头高脚低斜坡卧位
- B) 侧卧位
- C) 平卧位
- D) 低半坐位卧式
- E) 高半坐位卧式

66. [单选题] 不属于弥漫性结缔组织病范畴的疾病是（ ）。

- A) 类风湿关节炎
- B) 骨关节炎
- C) 系统性红斑狼疮
- D) 多发性肌炎
- E) 原发性干燥综合征

67. [单选题] 30岁女性，放置V型宫内节育环3年，来院常规检查。平时月经正常，末次月经10天前，阴道窥器检查未见尾丝。下述检查措施哪项最简便又可靠

- A) X线照片
- B) B超
- C) 探宫腔
- D) 宫腔镜

E)腹腔镜

68. [单选题]对脑血管扩张作用最强的药物是

- A)硝苯地平
- B)尼莫地平
- C)非洛地平
- D)尼索地平
- E)尼群地平

69. [单选题]女，28岁。妊娠40天，因下腹阵痛伴阴道少量出血1天就诊。查体：子宫增大与停经月份相符，宫口未开，既往妊娠50天时自然流产1次。目前对该患者的正确处理是（ ）。

- A)静卧保胎
- B)行宫颈内口环扎术保胎
- C)行刮宫术清除宫内胚胎
- D)肌内注射炔雌醇抑制宫缩
- E)静脉滴注缩宫素止血

70. [单选题]急性颅内压增高的典型表现是

- A)剧烈头痛，频繁呕吐
- B)呈现Cushing征
- C)意识障碍加深
- D)去大脑强直发作
- E)头颅X线平片示脑回压迹加深

71. [单选题]关于胆管癌，下列哪项叙述不正确？

- A)上段胆管癌比下段发病率高
- B)病理组织大多是腺癌
- C)局限型生长较多
- D)主要转移方式是血行转移
- E)先天性胆管扩张症发生癌变机会较高

72. [单选题]男，23岁。血尿、蛋白尿2年。查体：BP160/90mmHg。尿蛋白1.3~1.8g/L，血肌酐100 μmol/L。最可能的诊断是

- A)慢性肾小球肾炎
- B)慢性间质性肾炎
- C)高血压肾损害
- D)肾病综合症
- E)无症状性蛋白尿和血尿

73. [单选题]以下可引起缺氧及二氧化碳潴留的是

- A)呼吸肌麻痹
- B)急性肺栓塞
- C)室间隔缺损
- D)肺间质纤维化
- E)高热

74. [单选题]不稳定型心绞痛的治疗原则中，哪一项不包括在内

- A)住院卧床休息
- B)抗凝、抗血小板制剂
- C)静脉滴注硝酸甘油
- D)口服洋地黄制剂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/396002131204010134>