

## 2021-2022 护师类之护师（初级）精选试题及答案二

### 单选题（共 80 题）

1、产后子宫颈内口关闭的时间是

- A. 1 天内
- B. 1~2 天
- C. 3~5 天
- D. 7~10 天
- E. 10~14 天

**【答案】 D**

2、新生儿为预防吸入性合并症，每次喂食后，应采取的卧位是

- A. 左倾
- B. 右侧
- C. 平卧
- D. 头高脚低位
- E. 半卧位

**【答案】 B**

3、下列可以进行择期手术的疾病为

- A. 绞窄性肠梗阻
- B. 脾破裂
- C. 可复性疝气
- D. 乳癌

E. 胰腺癌

【答案】 C

4、患者女，28岁，今日感外阴痒，阴道分泌物增多就诊，妇科检：白带呈豆渣样，阴道黏膜红肿并附有白膜。考虑感染的病原体是（ ）。

A. 支原体

B. 苍白螺旋体

C. 假丝酵母菌

D. 阴道毛滴虫

E. 淋病奈瑟菌

【答案】 C

5、关于老年性阴道炎的病因不正确的是

A. 妇女绝经后

B. 手术切除卵巢后

C. 盆腔放射治疗后

D. 子宫全切除术后

E. 卵巢功能早衰

【答案】 D

6、某产妇，26岁，先天性心脏病，心功能Ⅱ级，现足月待产。

A. 孕24~28周

B. 第二产程

C. 孕12周内

- D. 产后 1 周
- E. 孕 36 周后

【答案】 B

7、下列关于急性乳腺炎的治疗，错误的是（ ）。

- A. 停止哺乳
- B. 排空乳汁
- C. 局部冷敷
- D. 应用抗菌药物
- E. 理疗

【答案】 C

8、开放性气胸患者现场急救中最恰当的处理是

- A. 棉垫封闭伤口
- B. 粗针头穿刺排气
- C. 用手封闭伤口
- D. 吸氧
- E. 胸膜腔闭式引流

【答案】 A

9、治疗新生儿破伤风给予 TAT 的目的是

- A. 杀灭破伤风杆菌
- B. 解痉止痛
- C. 预防肺部感染

- D. 中和游离的外毒素
- E. 抑制破伤风芽胞杆菌的繁殖

【答案】 D

10、患者，男性，40岁，主诉空腹时有上腹痛，进食后缓解2个月余。秋冬季时季节性发作3年，经胃镜检查确诊为十二指肠溃疡。本病的主要致病因素是

- A. 促胃液素
- B. 胃酸分泌增多
- C. 胃蛋白酶
- D. 胆汁反流
- E. 自身免疫因素

【答案】 B

11、原发性肾病综合征常见的病因是（ ）。

- A. 急性肾炎
- B. 糖尿病性肾病
- C. 肾淀粉样变
- D. 狼疮性肾病
- E. 过敏性紫癜

【答案】 A

12、脐带的组成包含（ ）。

- A. 1条脐静脉和2条股动脉
- B. 1条脐静脉和2条脐动脉

- C. 1 条股静脉和 2 条股动脉
- D. 1 条上腔静脉和 2 条颈动脉
- E. 1 条股静脉和 2 条脐动脉

【答案】 B

13、患者，男性，40 岁，从事油漆工作患急性白血病接受化疗。在缓解期，患者突然出现头痛、恶心、呕吐、瘫痪。该患者最可能出现了

- A. 中枢神经系统白血病
- B. 脑炎
- C. 脑膜炎
- D. 颅内出血
- E. 败血症

【答案】 D

14、患者，男，28 岁。被沸水烫伤，右手掌焦痂呈皮革样，不痛，面部红斑，表面干燥，左上肢、颈部、胸腹部、双足和双小腿均为水疱，有剧痛。并发生低血容量性休克。估计该患者 II 度烧伤面积为

- A. 54%
- B. 49%
- C. 58%
- D. 45%
- E. 39%

【答案】 D

15、可导致反常呼吸运动的损伤是

- A. 单跟单处肋骨骨折
- B. 张力性气胸
- C. 多根多处肋骨骨折
- D. 开放性肋骨骨折
- E. 血气胸

【答案】 C

16、急性胰腺炎患者的血清淀粉酶测定应在发病后

- A. 1~2 小时
- B. 4 小时
- C. 6 小时
- D. 8~12 小时
- E. 24 小时

【答案】 D

17、在营养疗法中，要素饮食的护理要点，下列选项不对的是

- A. 无菌操作
- B. 滴注肠内的营养液温度应保持在 20~22℃
- C. 管饲导管要保持通畅
- D. 保持口腔鼻腔或造口的清洁
- E. 详记 24h 出入量

【答案】 B

18、葡萄胎的病理特点是（ ）。

- A. 滋养细胞增生，间质水肿，间质内血管消失
- B. 子宫肌内水泡状组织，有绒毛结构，滋养细胞增生、分化不良
- C. 子宫肌内滋养细胞极度不规则增生，周围大片出血、坏死，绒毛结构消失
- D. 子宫腔内可见毛发、油脂，有时可见牙齿或骨质
- E. 子宫腔内可见菜花样肿块

【答案】 A

19、帮助病人坐轮椅，下列操作不正确的是

- A. 事先检查轮椅性能
- B. 拉起车闸固定车轮
- C. 尽量使病人身体靠前坐
- D. 扶病人坐下前先翻起脚踏板
- E. 病人坐稳后放下脚踏板

【答案】 C

20、支气管扩张病人痰量多，静置分层，且有恶臭味，宜选用

- A. 青霉素
- B. 阿洛西林
- C. 甲硝唑
- D. 链霉素
- E. 阿奇霉素

【答案】 C

21、胃穿孔的 X 线检查所见为

- A. 双侧横膈抬高
- B. 膈下游离气体
- C. 胃泡扩张
- D. 肠管扩张
- E. 胃内有液平面

【答案】 B

22、引起急性胆囊炎的主要病因是

- A. 胆道蛔虫
- B. 胆囊结石
- C. 胆囊管扭曲
- D. 急性胰腺炎
- E. 胆管狭窄

【答案】 B

23、食管癌的中晚期临床表现不包括（ ）。

- A. 持续性胸背痛
- B. 进食呛咳
- C. 胸骨后烧灼感
- D. 进行性吞咽困难
- E. 声音嘶哑

【答案】 C

24、肠外营养的适应证不包括



- A. 胃肠道消化吸收功能障碍的患者
- B. 胃肠有一定功能，需要营养疗法的患者
- C. 腹泻患者
- D. 呕吐严重患者
- E. 肿瘤放化疗时期

【答案】 B

25、患儿，3岁，10天前受凉，咳嗽，4天来发热，呕吐，烦躁。体检：体温39.5℃，精神萎靡，脑膜刺激征阳性，为确诊需做腰椎穿刺术，护士配合腰椎穿刺术的措施除外

- A. 取侧卧位
- B. 背部齐床沿，头向前屈
- C. 勿过度弯曲以免影响病人呼吸
- D. 头部去枕使脊椎高于头位
- E. 双膝弯曲腹背呈弓形

【答案】 D

26、肺炎最常见的病原体是（ ）。

- A. 细菌
- B. 病毒
- C. 支原体
- D. 衣原体
- E. 军团菌

【答案】 A

27、患儿，男，11个月，腹股沟斜疝，拟非手术治疗，原因是

- A. 小儿体质差不耐受手术
- B. 手术易感染
- C. 麻醉易出现意外
- D. 有自愈可能性
- E. 术后并发症多

【答案】 D

28、急性肾炎患儿，T36.8℃，BP18.7/14.7kPa，水肿渐加重，尿量减少，突然呼吸困难，不能平卧，肺底湿啰音，心音钝奔马律，肝在肋下2cm压痛(+)，白细胞数正常，考虑伴有

- A. 肺炎
- B. 肾衰竭
- C. 高血压脑病
- D. 严重循环充血
- E. 呼吸衰竭

【答案】 D

29、胃癌的主要转移方式为

- A. 直接蔓延
- B. 血行转移
- C. 腹腔种植
- D. 淋巴转移
- E. 远处转移

【答案】 D

30、抗甲状腺药物引起外周血白细胞减少时的停药指征为

- A. 白细胞 $<6000/\text{mm}$
- B. 白细胞 $<4000/\text{mm}$
- C. 白细胞 $<3500/\text{mm}$
- D. 白细胞 $<3000/\text{mm}$
- E. 白细胞 $<5000/\text{mm}$

【答案】 D

31、关于慢性子宫颈炎的表现，错误的是

- A. 分泌物呈稀薄泡沫状
- B. 患者可有腰骶部疼痛、下坠感
- C. 阴道分泌物增多
- D. 不孕
- E. 宫颈有不同程度的糜烂、囊肿、息肉

【答案】 A

32、对产妇正确的出院指导是（ ）。

- A. 产后 42 天复查
- B. 坚持母乳喂养 42 天
- C. 哺乳期间无需避孕
- D. 新生儿生理性黄疸持续 1 周左右
- E. 性生活在产后即可恢复

【答案】 A

33、预防小儿佝偻病每日服用维生素 D 的剂量是

- A. 100IU
- B. 200IU
- C. 300IU
- D. 400IU
- E. 1000IU

**【答案】 D**

34、烧伤休克补液中，胶体液首选

- A. 全血
- B. 同型血浆
- C. 血浆代用品
- D. 低分子右旋糖酐
- E. 洗涤红细胞

**【答案】 B**

35、胎龄 33 周早产儿，生后 3 天，表现为拒乳，反应差，哭声低，心音低钝，心率减慢，尿少，体温 34℃，小腿及大腿皮肤发凉、硬肿，该患儿不适宜的处理措施是

- A. 快速复温
- B. 供给足够的热量
- C. 控制感染
- D. 支持疗法
- E. 对症处理

【答案】 A

36、急性血源性骨髓炎 X 线检查出现异常，最少要在发病后

A. 1 周

B. 2 周

C. 3 周

D. 4 周

E. 5 周

【答案】 B

37、患者，女，30 岁。宫内妊娠 39 周，产程进展顺利。现宫口开全，部头先露，先露+4，心率 148 次 / 分。第二产程的首要护理目标是

A. 每 5~6 分钟听胎心一次

B. 消毒外阴

C. 做好接生准备

D. 指导产妇正确使用腹压

E. 新生儿窒息复苏的准备工作

【答案】 D

38、下列关于特发性血小板减少性紫癜的描述，错误的是

A. 发病前 1~3 周有急性病毒感染史

B. 主要致死原因为皮肤、黏膜出血

C. 血小板减少

D. 出血时间延长

E. 血块收缩不良

【答案】 B

39、安装永久性人工心脏起搏器的患者，下列哪项护理措施不正确

A. 卧床 24 小时

B. 咳嗽时用手轻按伤口

C. 术侧卧位

D. 术侧上肢不宜过度活动

E. 48 小时后进行适当的床上活动

【答案】 C

40、急性白血病患者易感染的最主要原因是（ ）。

A. 缺乏成熟中性粒细胞

B. 缺少白蛋白

C. 缺少红细胞

D. 缺乏预防接种

E. 缺乏血小板

【答案】 A

41、患者男，因急性阑尾炎合并穿孔，急诊在硬膜外麻醉下行阑尾切除术。病人术后第 2 天主诉伤口疼痛，应采取的体位是（ ）。

A. 仰卧屈膝位

B. 半坐卧位

C. 头高脚低位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/398001112060006034>