

三基理论知识试题库+答案

1、颈椎骨折进行颅骨牵引时，采取何种体位（ ）

- A、头低足高位
- B、端坐位
- C、俯卧位
- D、头高足低位
- E、半坐卧位

答案：D

2、输注血小板的护理措施不妥的一项是（ ）

- A、输血过程中应经常观察采集袋中是否有发生凝集现象
- B、采集的血小板在
- C、选用塑料输血器
- D、连续输注不可间断
- E、避免长时间使用

答案：A

3、脑出血病人急性期头部抬高卧位的主要目的是（ ）

- A、防止呕吐
- B、有利于颅内血液回流
- C、减轻头痛
- D、有利于口腔分泌物的引流

答案：B

4、结核性脑膜炎的主要播散方式为（ ）

- A、支气管播散
- B、沿胸腹蔓延
- C、淋巴播散
- D、局部蔓延
- E、血行播散

答案：E

5、百日咳最典型的临床症状是（ ）

- A、鸡鸣样吸气声
- B、阵发性屏气
- C、口唇青紫
- D、发热
- E、咳嗽

答案：A

6、在新生儿窒息复苏方案中，应首先采取哪一步骤（ ）

- A、尽量吸净呼吸道粘液，保持气道通畅
- B、建立呼吸，增加通气
- C、给肾上腺素
- D、维持正常循环，保证足够心输出量

答案：A

7、癫痫病人出院时，健康教育错误的是（ ）

- A、随意增减药物剂量
- B、保持情绪稳定
- C、定期查血象及肝、肾功能
- D、避免疲劳烟酒

答案：A

8、麻疹的传染源是（ ）

- A、病人
- B、水源
- C、家畜
- D、带菌者
- E、家禽

答案：A

9、外科急腹症病人未明确诊断前护理中强调的四禁不包括（ ）

- A、禁食
- B、禁用吗啡类镇痛药
- C、禁止活动
- D、禁服泻药
- E、禁止灌肠

答案：C

10、母乳中含有大量体液因子，下列不符合的一项是（ ）

- A、乳铁蛋白
- B、溶菌酶
- C、粒细胞
- D、低聚糖
- E、巨噬细菌

答案：D

11、原发性腹膜炎是最常见的病原菌感染途径是（ ）

- A、外伤导致腹腔开放

- B、经血液循环
- C、经女性生殖道逆行
- D、经急性阑尾炎穿孔部位
- E、腹腔脏器破裂

答案：B

12、患者女性，30岁。右前臂骨折石膏绷带固定。若病人石膏绷带固定后，诉肢体疼痛难忍，护理不应做的是（ ）

- A、询问病人肢端感觉、运动情况
- B、观察桡动脉搏动
- C、立即给药物镇痛
- D、发现异常报告医生
- E、观察肢端肤色和体温

答案：C

13、新鲜骨折是指几周之内的骨折（ ）

- A、2周
- B、3周
- C、4周
- D、5周
- E、1周

答案：A

14、急性白血病化疗期间多饮水何故（ ）

- A、稀释血中药浓度
- B、加强血流动
- C、防尿酸性肾病
- D、多尿可缓解对肾的损害

答案：C

15、使用阿托品、碘解磷定治疗有机磷农药中毒，患者神志转清醒，呼吸困难减轻，肺部湿啰音减少。约半小时左右，患者突然再次出现意识模糊、躁动、抽搐，体温高达39.5℃，伴尿潴留。护士应想到可能发生下列哪种病情变化

- A、阿托品中毒
- B、碘解磷定中毒
- C、脑出血
- D、脑水肿
- E、阿托品量不足

答案：A

16、关于胸部的解剖生理结构描述有误的是（ ）

- A、稳定的负压可以维持正常的呼吸，且能防止肺萎缩
- B、吸气时胸腔负压增大，呼气时减小
- C、壁胸膜遮盖胸壁、膈和纵隔
- D、脏胸膜包裹肺并深入叶间隙
- E、脏胸膜和壁胸膜相连接，形成两个相通的胸膜腔

答案：E

17、急性肾小球肾炎是感染后免疫反应引起的疾病，病原体是（ ）

- A、原虫和寄生虫
- B、支原体
- C、病毒
- D、葡萄球菌
- E、链球菌

答案：E

18、红细胞输注前应该用哪一种溶液稀释（ ）

- A、生理盐水
- B、碱性液体
- C、葡萄糖
- D、蒸馏水
- E、葡萄糖生理盐水

答案：A

19、脑出血患者 CT 图像为（ ）

- A、起病后即可见高密度异常影
- B、起病
- C、起病后即可见低密度异常影
- D、可见脑室扩大
- E、起病后

答案：A

20、患者，男，35岁，因在高热环境下持续工作12小时而出现头痛、头晕、乏力、多汗等症状，不久体温迅速升高到41℃，并出现颜面潮红、昏迷、休克。此时最佳的降温措施应为

- A、冬眠合剂
- B、冰盐水灌肠
- C、物理降温+药物降温

- D、冰帽
- E、静脉滴注葡萄糖盐水

答案：C

21、患者男性，43岁，膀胱内的乳头状瘤，就诊时医生告诉病人，应尽早手术，因为易发生（ ）

- A、尿潴留
- B、恶变
- C、出血
- D、结石
- E、感染

答案：B

22、属低效消毒剂者为（ ）

- A、过氧乙酸
- B、洗必泰
- C、乙醇
- D、戊二醛
- E、甲醛

答案：B

23、下述哪项不是宫内节育器的并发症（ ）

- A、节育器异位
- B、带器妊娠
- C、血肿
- D、感染
- E、节育器脱落

答案：C

24、引起中枢性呼吸衰竭常见的原因是（ ）

- A、心力衰竭
- B、支气管异物
- C、喉头水肿
- D、颅内感染
- E、支气管哮喘

答案：D

25、癫痫大发作可以减药的情况是（ ）

- A、癫痫发作停止1年后
- B、癫痫发作停止2年以上

- C、脑电图正常后
- D、服药 2 年以上
- E、服药后，1

答案：B

26、瞳孔散大多见于（ ）

- A、巴比妥类药物中毒
- B、颅内病变
- C、脑瘤
- D、有机磷药物中毒
- E、阿托品药物中毒

答案：E

27、关于腹膜的解剖特点描述，不正确的是（ ）

- A、腹膜腔分为腹腔和网膜囊
- B、脏层腹膜痛觉定位准确，壁层腹膜痛觉定位较差
- C、正常腹膜腔内有 75~100ml 黄色澄清液体
- D、膈肌中心部分的腹膜受刺激后，可引起肩部放射性疼痛或呃逆
- E、腹膜腔是人体最大的体腔

答案：B

28、目前流行性腮腺炎主要的治疗方法是（ ）

- A、流质饮食
- B、抗病毒治疗
- C、对症治疗
- D、抗生素治疗
- E、隔离休息

答案：C

29、在外科急腹症鉴别中，一般起病较缓的是（ ）

- A、炎症性病变
- B、绞窄性病变
- C、梗阻性病变
- D、穿孔性病变
- E、出血性病变

答案：A

30、下列哪项不是下运动神经元瘫痪的特点（ ）

- A、瘫痪以肌群为主
- B、无病理反射

- C、肌张力增高
- D、肌萎缩明显
- E、位反射减低或消失

答案：C

31、引起慢性肾衰竭患者贫血最重要的原因是

- A、肾脏产生红细胞生成素减少
- B、血液透析失血及频繁抽血化验导致失血
- C、食物的摄入减少
- D、叶酸缺乏
- E、红细胞生存周期缩短

答案：A

32、肝脏结构和功能的基本单位是（ ）

- A、肝门
- B、肝小管
- C、肝窦
- D、肝细胞索
- E、肝小叶

答案：E

33、有出血倾向的病人应多休息，避免过度活动，其用意（ ）

- A、减慢血循环
- B、防止外伤出血
- C、缓解呼吸困难
- D、减少氧需量

答案：B

34、患者女，65岁，冬季晨起家人发现其呼之不应、推之不动、脉快、多汗、皮肤黏膜呈樱桃红色。下列治疗原则中，最首要的是

- A、治疗脑水肿
- B、纠正缺氧
- C、降低脑代谢
- D、立即脱离此环境
- E、促进脑细胞功能恢复

答案：D

35、男性，46岁，近月来，每遇刷牙即引起同侧颜面部剧痛，需以手掌摩颊，历时半小时可自行停止，痛时不呕吐。您考虑为（ ）

- A、脑肿瘤

- B、三叉神经痛
- C、周期性头痛
- D、偏头痛
- E、牙周病

答案：B

36、在传染病管理中，属强制管理的传染病为（ ）

- A、艾滋病
- B、肺结核
- C、霍乱
- D、黑热病
- E、肾综合征出血热

答案：C

37、石膏绷带固定病人正确护理的措施是（ ）

- A、石膏未干前用手掌托扶，不可留下手指压痕
- B、有伤口者应在石膏干燥后开窗
- C、患肢平放并停止一切肢体活动
- D、手指、脚趾端应包裹在石膏内
- E、石膏内肢体局部疼痛时，应填塞物品衬垫

答案：A

38、癫痫大发作最具特征的表现是（ ）

- A、发作性肢体麻木
- B、发作性头痛
- C、发作性偏瘫
- D、发作性强直，阵挛抽搐及意识障碍
- E、发作性意识障碍

答案：D

39、胰腺疾病与胆道疾病相互关联的解剖基础是（ ）

- A、均属肝门部器官
- B、胆总管与胰腺紧贴，并位于其后方
- C、胰腺炎胰腺肿大时常能压迫胆总管
- D、胆总管与胰管有共同通道及出口
- E、均受肝内胆汁分泌压的影响

答案：E

40、男性，33岁，左小腿被锈铁钉刺伤一段时间后出现乏力、头疼、打哈欠，继而有张口困难、蹙眉和苦笑面容等表现，全身肌肉阵发性痉挛，但神志一直清醒，诊断为破伤风。对于已经发生破伤风者，治疗的中心环节是

- A、维持水、电解质平衡
- B、控制痉挛
- C、中和游离毒素
- D、应用抗生素
- E、彻底清创

答案：B

41、外科急腹症中最常见的是（ ）

- A、急性胆囊炎
- B、急性胰腺炎
- C、急性肠梗阻
- D、急性胃十二指肠穿孔
- E、急性阑尾炎

答案：E

42、患者女，58岁，全胃切除术后第3天，遵医嘱给予肠内营养液500ml输入。在输注200ml后，自诉腹胀明显，稍有腹痛。查体：无腹部紧张及反跳痛。对该患者的护理措施，错误的是

- A、遵医嘱给予开塞露纳肛
- B、停止输入，丢弃剩余肠内营养液
- C、顺时针按摩或热敷下腹部
- D、检查肠内营养液的输注速度及温度
- E、鼓励患者下床活动

答案：B

43、小儿最易发生意外事故的阶段为（ ）

- A、学龄期
- B、幼儿期
- C、学龄前期
- D、新生儿期
- E、婴儿期

答案：B

44、对心源性水肿患者实施护理措施的要点中，哪项不妥

- A、嘱患者应保持身心休息，以减轻心脏负荷
- B、限制钠盐的摄入

- C、保持皮肤清洁、干燥，防止破损和感染
- D、使用排钾利尿剂后特别观察血压的变化
- E、老年人病人尤其注意输液速度，不可太快

答案：D

45、某病区白班 7:30 至 15:30，共计 8 小时，白班接班时在院患者总数 40 人，期间出院 1 人，转出 1 人，死亡 1 人，转入 1 人，新入院 3 人。计算护患比时该白班收治的患者数为（ ）

- A、47 人
- B、44 人
- C、43 人
- D、45 人
- E、46 人

答案：B

46、初次抗原刺激后，先产生的对传染病早期诊断有帮助的是（ ）

- A、IgA
- B、IgM
- C、IgG
- D、IgE
- E、IgD

答案：B

47、安装永久性人工心脏起搏器的病人，下列哪项护理措施不正确

- A、术侧卧位
- B、咳嗽时用手轻按伤口
- C、术侧上肢不宜过度活动
- D、卧床 24 小时
- E、48 小时后适当的床上活动

答案：A

48、继发性胆管结石多见的类型是（ ）

- A、混合性结石
- B、胆色素结石
- C、胆固醇结石
- D、胆囊结石
- E、肝内胆管结石

答案：C

49、重度 CO 中毒患者血液 HbCO 的浓度可高于

- A、10%
- B、20%
- C、30%
- D、40%
- E、50%

答案：E

50、若骨折后关节僵硬已成定型，此时处理方法叙述正确的是（ ）

- A、以主动运动为主
- B、操作时手法应强硬
- C、可一次手法操作撕裂瘢痕组织
- D、自身力量不足，需要外力协助
- E、以被动运动为主

答案：C

51、患者男，雨雪天不慎摔伤，X线示左上臂有轻微可疑骨折线，给予石膏固定术。患者再次复诊时诉石膏内的局部皮肤疼痛，有腐臭气味，主动和被动伸指功能正常，应考虑可能的原因是（ ）

- A、肢体肿胀
- B、压疮
- C、肢体血运障碍
- D、血栓性静脉炎
- E、皮肤湿疹

答案：B

52、对传染病人皮肤的护理中，哪项错误（ ）

- A、瘙痒较重者，可用炉甘石
- B、观察皮疹的特点，如形
- C、出疹期可用肥皂水擦洗皮肤
- D、将病人指甲剪短，切勿抓破皮肤

答案：C

53、关于胃的解剖生理描述正确的一项是（ ）

- A、十二指肠能分泌碱性十二指肠液
- B、交感神经兴奋时刺激胃酸分泌
- C、黏膜层的主细胞，分泌盐酸和抗贫血因子
- D、胃壁从内向外分为浆膜层、肌层、黏膜下层和黏膜层
- E、入口为幽门，出口为贲门

答案：A

54、新生儿硬肿症硬肿最初出现在（ ）

- A、会阴部
- B、小腿
- C、面部
- D、大腿外侧
- E、躯干

答案：B

55、最易诱发急性粟粒型肺结核的是（ ）

- A、猩红热
- B、HIV 感染
- C、麻疹
- D、百日咳
- E、营养不良

答案：A

56、在 ARDS 治疗和护理中最关键的措施是

- A、抗感染
- B、营养支持
- C、维持有效循环
- D、积极治疗原发疾病
- E、纠正低氧血症和酸中毒

答案：E

57、骨折在胸腰椎引起脊髓损伤，出现下肢瘫痪，称为（ ）

- A、截瘫
- B、不完全瘫痪
- C、混合瘫痪
- D、完全瘫痪
- E、四肢瘫痪

答案：A

58、在人体试验中，以犯人为受试者，认识正确的是（ ）

- A、犯人是犯了罪的人，用他们作受试者，是给他们一个为社会做贡献，从而改过自新的机会
- B、应该按照公安部门的安排进行
- C、一般情况下，是不允许用犯人做实验的，即使使用犯人作为受试者，必须首先考察是否具备受试者的条件
- D、只要有犯人的签字同意，以犯人为受试者可以得到伦理的辩护

E、在任何情况下，都不允许以犯人作为受试者

答案：C

59、腹膜透析过程中发生引流不畅时，下列哪项护理措施不当

A、嘱患者改变体位

B、肝素加生理盐水向腹膜透析管内快速注射并保留，以促使纤维块溶解

C、服导泻剂或灌肠以加强肠蠕动

D、多饮水以充盈膀胱

E、若上述处理不能改善，应向医生报告

答案：D

60、治疗急性白血病时为何要保护静脉（ ）

A、以备长期有效静注药

B、避免出血

C、贫血血管不饱满

D、避免感染致败血症

答案：A

61、目前，小儿死亡第一位的疾病是（ ）

A、急性坏死性肠炎

B、室间隔缺损

C、急性白血病

D、小儿肺炎

E、原发性肾病综合征

答案：D

62、颅内压增高的发病机制是（ ）

A、神经、肌肉发育不成熟

B、神经细胞异常放电

C、脑组织及液体量异常增加超过代偿限度

D、神经系统受损的表现

E、急性呼吸衰竭所致的高碳酸血症

答案：C

63、关于麻疹患儿的饮食护理，下列哪项错误（ ）

A、恢复期仍需控制饮食

B、避免油腻饮食

C、给予流质或半流质

D、少食多餐

E、避免生冷饮食

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/398050054076006036>