

# 2023 年山东省烟台市医疗三严三基理论考试试题及答案

医院科室：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 考场：\_\_\_\_\_ 考号：\_\_\_\_\_

## 一、选择题

1. 洋地黄的主要适应证不包括哪项( )

- A、急、慢性充血性心力衰竭
- B、阵发性室上性心动过速
- C、房室阻滞
- D、心房扑动
- E、快速性心房颤动

答案：

C

2. ASA 三联症是指( )

- A、鼻息肉,支气管哮喘,高血压
- B、鼻息肉,支气管哮喘,阿斯匹林过敏
- C、鼻息肉,支气管哮喘,鼻窦炎
- D、鼻息肉,鼻出血,鼻窦炎

E、以上都不是

答案:

B

3. 弥散障碍导致呼吸衰竭时,肺泡呼吸面积一般减少( )

A、1/3 以上

B、1/2 以上

C、1/4 以上

D、3/4 以上

E、2/3 以上

答案:

B

4. 新生儿缺氧缺血性脑病出现颅压升高,甘露醇使用量为

A、0.1~0.25g/kg

B、0.25~0.5g/kg

C、0.5~1g/kg

D、1~2g/kg

答案:

B

5. 对脑血管有选择作用的是: ( )

A、尼莫地平

B、硝苯地平

C、尼群地平

D、非洛地平

E、氨氯地平

答案:

A

6. 诊断消化性溃疡最可靠的方法是 ( )

A、根据临床症状

B、测胃酸

C、钡餐

D、胃镜

E、大便隐血试验

答案:

D

7. 关于髋关节脱位的叙述,下列哪项不正确:( )

- A、以后脱位最常见
- B、前后和中心脱位都可有患肢短缩
- C、中心脱位可合并后腹膜血肿
- D、可并发坐骨神经,股神经和股动脉的损伤
- E、多在麻醉下行手法复位

答案:

B

8. 影响中心静脉压高低的因素是( )

- A、外周静脉压和静脉血流阻力
- B、心脏射血能力和外周阻力
- C、动脉压和静脉压
- D、心脏射血能力和静脉回心血量
- E、血管容量和循环血量

答案:

D

9. 核素诊断肝海绵血管瘤的最恰当的方法是( )

- A、肝胶体显像
- B、肝阳性显像
- C、肝血池显像
- D、肝胶体和肝血池联合显像
- E、肝胆显像

答案:

D

10. 药物产生的副作用剂量是

- A、中毒量
- B、LD
- C、无效剂量
- D、极量
- E、治疗剂量

答案:

E

11. 已知一核素半衰期为 2 天,剂量为 8mCi, 请问 8 天后为

- A、2mCi

B、0.5mCi

C、1mCi

D、0mCi

E、1.5mCi

答案：

B

12. 受精时,精子能穿透明带起作用的是:( )

A、精子的运动

B、顶体酶的释放

C、精子运动和输卵管粘膜的作用

D、精子运动和顶体酶释放

E、顶体酶释放和输卵管粘膜的作用

答案：

D

13. 保存温度对血小板活性影响很大,适宜温度为( )

A、4℃~6℃

B、8℃~10℃

C、室温

D、18℃~22℃

E、20℃~24℃

答案：

E

14. 风湿性疾病的概念是指( )

A、风湿性关节炎

B、风湿热

C、累及关节及软组织的一大类病因各不相同的疾病

D、类风湿关节炎

E、风寒痹症

答案：

C

15. 哪种病人应禁用或慎用羟丁酸钠

A、高血钾

B、低血钾

C、黄疸

D、老人、儿童

E、心功能不全

答案：

B

16. 患儿急起发热、咳嗽、气促,胸片示双下肺斑片影沿支气管播散,应考虑( )

A、大叶性肺炎

B、支气管肺炎

C、支原体肺炎

D、过敏性肺炎

E、干酪性肺炎

答案：

B

17. 什么病人术前用药应该酌增( )

A、甲亢病人

B、冠心病病人

C、休克病人

D、产科病人



E、青壮年病人

答案：

E

18. 肝性脑病给予肠道消毒剂的最主要目的是( )

A、清除致病菌的毒素

B、减少真菌繁殖

C、抑制肠道细菌减少氨的形成

D、预防原发性腹膜炎

E、防止继发性肠道感染

答案：

C

19. 肺梗死最常见的病因是( )

A、空气

B、脂肪

C、血栓

D、羊水

E、瘤栓

C

20. 脊髓灰质炎病毒的传播方式下述哪项是不可能的

A、通过粪-口传播

B、通过输血传播

C、通过污染的食物、手及玩具传播

D、通过污染的水传播

E、通过呼吸道传播

答案:

B

21. 口腔念珠菌性口炎的治疗包括哪些内容

A、抗生素治疗,2%~4% 碳酸氢钠溶液漱口,增强免疫力

B、抗病毒治疗,2%~4% 碳酸氢钠溶液漱口,增强免疫力

C、免疫抑制剂治疗,维生素治疗,心理治疗,中医中药治疗

D、局部和(或)全身抗真菌药物治疗,增强机体免疫力,手术治疗

答案:

D

· 影响硬膜外阻滞平面的因素是( )

A、导管的位置与方向

B、药物的容量

C、注药的速度

D、病人的情况

E、以上都是

E

23. 现场心肺复苏时简单有效的人工呼吸法是( )

A、仰式人工呼吸法

B、伏式法

C、举腰压背法

D、轩轻板法

E、口对口人工呼吸法

答案:

E

24. 张力性气胸急救措施为:

、粗针头排气减压

B、胸腔闭式引流

C、胸探查

D、加压给氧

E、输液、输血

A

25. 血栓形成是指( )

A、血液成分凝固形成固体质块的过程

B、心血管内血液成分凝固形成固体质块的过程

C、在活体组织内血液成分凝固形成固体质块的过程

D、活体组织内红细胞发生凝固形成固体质块的过程

E、在活体心血管内血液成分发生析出凝集或凝固形成固体质块的过程

答案:

E

26. 要对一个正在发生的疾病现状进行调查,应使用哪种调查方法( )

A、前瞻性词查

、横断面调查

C、追踪调查

D、回顾性调查

E、以上都不是

B

27. 区别腹部肿块来自腹腔或腹壁最简易的检查方法是( )

A、超声检查

B、胃肠钡餐检查

C、腹部体格检查

D、腹部 X 线平片

E、放射性核素显像

答案:

C

28. 测定新生儿听阈,做哪项检查最好( )

A、纯音侧听

B、耳声反射

、声导抗

D、听性脑干电位

E、音叉检查

B

29. 重度子痫前期患者,血压 210/120mmHg, 首先的降压药是( )

A、甲基多巴

B、卡托普利

C、肼屈嗪

D、甲基多巴

E、降压灵

答案:

C

30. 肺癌最常见的组织学类型是:( )

A、腺样囊性癌

B、巨细胞癌

C、鳞状细胞癌

、腺癌

E、未分化癌

C

31. 治疗室的管理中下列哪项错误( )

A、注射、治疗时,应辅无菌盘,抽出的药液存放不能超过 2 小时

B、治疗室中开启的各种溶媒不得超过 24 小时

C、治疗室中开启的无菌溶液需要 4 小时内使用

D、碘酊、乙醇瓶应保持密闭,每周更换及灭菌 1~2 次

E、经消毒后的棉球、纱布包,一经打开,保存时间不得超过 48 小时

答案:

E

32. 调节胰岛素分泌最重要的因素是

A、血中氨基酸浓度

B、血糖浓度

C、血中脂肪酸浓度

D、迷走神经

E、胰高血糖素

答案:

B

33. 开放性脑损伤的描述哪项正确( )

A、头皮裂伤

B、颅骨骨折

C、有脑脊液漏或脑组织从伤口溢出

D、头皮裂伤并颅骨骨折

E、以上都不是

答案:

C

34. 骨折刚达到临床愈合时,正处于骨折愈合过程的哪一阶段( )

A、血肿机化演进期

B、骨折后2周以内

C、原始骨痂形成期

D、骨痂改造塑形期 E 永久骨痂形成期

答案:



C

35. 最早在妊娠多少周时用超声检查能够测量双顶径( )

A、14 周

B、12 周

C、8 周

D、6 周

E、10 周

答案:

B

36. 下列哪项代谢过程的细胞内定位不正确( )

A、酮体合成:线粒体

B、胆固醇合成:胞液和内质网

C、脂肪酸活化:胞液

D、三酰甘油:肝内质网

E、 $\beta$ -氧化:细胞膜受体

答案:

E

37. 诊断急性心肌梗死最重要的心电图表现是( )

- A、病理性 Q 波或 QS 波
- B、ST 段弓背向上型上移
- C、T 波倒置
- D、对应导联 ST 段下移
- E、多发室性期前收缩

答案:

A

38. 左心衰时呼吸困难的特点,不包括( )

- A、活动时加重
- B、休息时减轻
- C、仰卧时加重
- D、常伴淤血性肝大
- E、常采取端坐呼吸体位

答案:

D

39. 天然牛奶中缺乏哪种营养素( )

A、优质蛋白质

B、钾

C、铁

D、钙

E、乳糖

答案：

C

40. 食管异物最危险的并发症是( )

A、颈部皮下气肿

B、食管周围炎

C、食管周围脓肿

D、纵隔气肿

E、刺破大血管

答案：

E

41. 成人胸外心脏按压,下列哪项正确 ( )

A、按压部位在胸骨下段,剑突上 2.5~5 cm 处

- B、按压时以使胸廓下陷 2 cm 为度
- C、应用冲击式猛压,下压时间与放松时间比为 2:1
- D、放松时手掌根离开胸骨
- E、按压频率以 30 次/min 为宜

答案:

A

42. 从医院获得幽门螺杆菌感染的高危人群中主要是( )

- A、检验人员
- B、消化内科医师
- C、消化内科护士
- D、腹部外科医师
- E、口腔科医师

答案:

B

43. 盆腔炎的合并症或后遗症极少见的是

- A、输卵管卵巢囊肿
- B、输卵管积水

- C、弥漫性腹膜炎
- D、输卵管妊娠
- E、粘连性子宫后屈

答案:

C

44. 关于脂溶性维生素,下述哪项不对( )

- A、溶于有机溶剂
- B、在食物中与脂类共存
- C、随脂类一同吸收
- D、体内很少蓄积
- E、可与脂蛋白结合

答案:

E

45. 深部脓肿的特点是( )

- A、局部波动感明显
- B、全身中毒症状不明显
- C、局部仅有红肿现象,但无压痛

D、局部红肿,压痛明显,穿刺可抽到脓液

E、局部红、肿、热、痛明显

答案:

D

46. 失眠症的患病率为 ( )

A、5%~15%

B、20%~30%

C、30%~40%

D、40%~50%

E、10%~20%

答案:

E

47. 成人颅内压增高最常见的 X 线征象是 ( )

A、头颅扩大

B、囟门增宽

C、颅缝分离

D、脑回压迹增多

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/406005134232010045>