

临床护士应知应会及三基理论考试试题及答案

1、使用前需测心率的药物是

- A、洋地黄
- B、泼尼松
- C、地西洋
- D、普萘洛尔
- E、氯丙嗪

答案：A

2、抢救车未用,每[]也需进行清理,必须保证抢救物品处于完好备用状态 .

- A、一周
- B、半个月
- C、一个月
- D、1次/三周
- E、必要时

答案：A

3、在寒冷季节进行膀胱冲洗,防止低温刺激膀胱,引起膀胱痉挛,冲洗液可加温至()。

- A、30℃ ~32℃
- B、32℃ ~34℃
- C、34℃ ~36℃
- D、35℃ ~37℃
- E、37℃ ~38℃

答案：D

4、属于主观资料的是:()

- A、体温 38℃
- B、黄疸
- C、发绀
- D、头晕
- E、颈项强直

答案：D

5、患者男 47 岁,中午包餐后 1 小时突然出现中上腹剧烈的刀割样疼痛,且向腰背部放射,继而呕出胆汁,伴高热、面色苍白,急症时全腹疼痛,腹肌强直,紧急治疗措施为:

- A、胃肠减压
- B、手术治疗

- C、静脉输液
- D、解痉止痛
- E、上氧

答案：A

6、如患者口腔内有真菌感染,应选用的口腔护理液是()

- A、生理盐水
- B、1%-3%过氧化氢溶液
- C、1%-4%碳酸氢钠溶液
- D、0.02%洗必泰溶液
- E、0.1%醋酸溶液

答案：C

7、肘关节脱位的标志性体征是:

- A、活动受限
- B、反常活动
- C、关节肿胀
- D、肘后三角关系失常
- E、鹰嘴固定压痛

答案：D

8、刘某,因交通事故致伤昏迷,3小时后入院,患者处于昏迷状态,呼之不应,但按压眶上神经有反应,左侧瞳孔散大,对光反射迟钝。入院第2天,血压150/100mmHg,脉搏缓慢有力,呼吸深而慢,时而躁动、呕吐,按压眶上神经无反应,左侧瞳孔散大,对光反射消失,右侧肢体瘫痪,病理反射阳性。对该患者的护理措施欠妥的是

- A、密切观察生命体征、瞳孔等变化
- B、取平卧位头偏向一侧以防止误吸
- C、持续留置导尿
- D、保持大便通畅以防用力排便导致颅内压增高
- E、配备吸痰器、气管切开等抢救用物

答案：C

9、消毒与灭菌的区别主要在于能否杀灭

- A、病原微生物
- B、非致病微生物
- C、繁殖体
- D、芽孢
- E、鞭毛

答案：D

10、医疗废物袋装量达()时应扎紧袋口后放入医疗废物暂存容器中。

A、1/2

B、2/3

C、3/4

D、4/5

E、5/6

答案：B

11、患者男,45岁。从事仓库保管员20年,双下肢内侧皮下静脉隆起、迂曲、呈团块状。足靴区色素沉着,诊断为原发性静脉曲张。其病因不包括

A、长时间站立工作

B、静脉壁薄弱

C、从事负重工作

D、工作环境寒冷

E、静脉瓣膜发育不良

答案：D

12、关于输血三查说法错误的是()

A、查血制品的有效期

B、血制品的质量

C、血制品种类和剂量

D、输血装置是否完好

答案：C

13、患者,女性,65岁。间歇性腹痛伴恶心、呕吐。呕吐物为胃内容物,有宿食。水、电解质紊乱类型考虑

A、高钠血症,代谢性酸中毒

B、低钾血症,代谢性碱中毒

C、低钾血症,代谢性酸中毒

D、高钾血症,呼吸性酸中毒

E、高钾血症,代谢性酸中毒

答案：B

14、某男,30岁,5天前被汽车撞伤左上腹,当时腹痛伴局部压痛。今日上厕所时突然昏倒,面色苍白,脉细速。可能是

A、肝破裂

B、脾破裂

C、胆囊穿孔

D、肾破裂

E、肠穿孔

答案：B

15、急性肺水肿患者高浓度吸氧(6-8L/min)时湿化瓶内可加入()

A、0、9%氯化钠液

B、20%-30%乙醇溶液

C、30%-35%乙醇溶液

D、灭菌注射用水

E、0、45%氯化钠液

答案：B

16、患者女,55岁。因发作性胸闷咳嗽就诊,诊为支气管哮喘。医嘱给予糖皮质激素吸入治疗,下列用药指导中正确的是

A、吸入激素的主要作用是快速缓解症状

B、如果哮喘症状缓解,即可停止用药

C、吸入激素不会有任何副作用

D、吸入激素后要漱口

E、如果您要进行运动,可在此前预防性吸入激素

答案：D

17、吸宫术后持续阴道出血、发热、下腹痛应考虑

A、吸宫不全

B、人工流产综合征

C、子宫穿孔

D、空气栓塞

E、吸宫不全并感染

答案：E

18、集中医学观察场所需要配备一定的医疗器材及防护物资,但不需要配备。

()

A、体温计

B、听诊器

C、降温药

D、口罩

E、消毒剂

答案：C

19、新型冠状病毒肺炎患者有效的氧疗措施为:

A、鼻导管给氧

- B、面罩给氧
- C、经鼻高流量氧疗
- D、氢氧混合吸入气
- E、以上都是

答案：E

20、李某,男.53岁。出院前6分钟步行试验,行走距离为320米。该病人的心力衰竭程度为()

- A、极轻度心力衰竭
- B、轻度心力衰竭
- C、中度心力衰竭
- D、重度心力衰竭
- E、极重度心力衰竭

答案：C

21、以下哪些病人应进行二级护理

- A、器官移植、大面积烧伤
- B、高热、大出血
- C、休克、瘫痪
- D、年老体弱、幼儿
- E、疾病恢复期、选择性手术前的准备阶段

答案：D

22、急性胰腺炎行胃肠减压治疗的目的是()

- A、解除胃痉挛
- B、解除胰管痉挛
- C、解除肠梗阻症状
- D、以免胃酸进入十二指肠刺激胰液分泌
- E、减轻弥漫性腹膜炎的症状

答案：E

23、患者男、46岁。溃疡病合并瘢痕性幽门梗阻,术前不可缺少的处理是

- A、每晚温盐水洗胃
- B、输血
- C、胃液分析
- D、灌肠
- E、吸氧

答案：A

24、新生儿经皮胆红素测定的部位一般为()

- A、前额及胸腹部
- B、前额及背部
- C、胸腹部及背部
- D、上肢及胸腹部
- E、下肢及背部

答案：A

25、诊断癫痫最重要的检查方法是()

- A、血糖
- B、血液检查
- C、脑部 CT
- D、脑电图
- E、磁共振成像

答案：D

26、患者 56 岁女性, 风湿性心脏病, 二尖瓣狭窄伴关闭不全病史 26 年, 入睡时无呼吸困难, 可以平卧, 入睡两小时后突然从噩梦中憋醒, 伴有呼吸困难, 被迫坐起, 听诊两肺可及哮鸣音, 10 分钟后呼吸困难逐渐缓解, 此病人的情况属于:

- A、噩梦后的正常反应
- B、支气管哮喘急性发作
- C、夜间阵发性呼吸困难
- D、劳累性呼吸困难
- E、睡眠呼吸暂停综合征

答案：C

27、测血压放气速度:()

- A、1mmHg/秒
- B、2mmHg/秒
- C、3mmHg/秒
- D、4mmHg/秒
- E、5mmHg/秒

答案：D

28、新型冠状病毒感染的早期症状一般不会表现为

- A、发热
- B、干咳
- C、乏力
- D、皮下出血点
- E、味觉缺失

答案：D

29、为昏迷患者保暖时,热水袋的温度要低于()℃

- A、20
- B、30
- C、50
- D、60
- E、70

答案：C

30、酒精性肝病最根本的治疗措施是()。

- A、戒酒
- B、降血脂
- C、护肝治疗
- D、激素治疗
- E、改善营养不良

答案：A

31、刘某,女,79岁。因低热、乏力、盗汗2个月,加重伴咳嗽、咳痰1周,入院进一步诊治。下列关于该病人留取痰标本的方法,不妥的是()

- A、晨起后清水漱口数次后留取痰标本
- B、用力咳出深部第一口痰并留取
- C、痰液留取后应尽量于2小时内送检
- D、如果病人无痰,需经纤维支气管镜留取标本
- E、尽可能在抗生素使用或更换前留取痰标本

答案：D

32、腹外疝容易嵌顿的是()

- A、斜疝
- B、直疝
- C、股疝
- D、脐疝
- E、切口疝

答案：C

33、乳癌改良根治术后,病人进行功能锻炼的方法正确的是()

- A、术后2天进行腕部活动
- B、术后6天进行肘部活动
- C、术后6天进行肩关节活动
- D、术后8天进行上肢外展活动

E、术后 10~12 天进行全范围关节活动

答案：E

34、下列哪项戴、脱无菌手套的操作是错误的()

- A、戴手套前先将手洗净擦干
- B、核对手套外标明的手套号码, 无菌日期
- C、取出滑石粉, 用后放回袋内
- D、戴好手套后, 两手置腰部水平以上
- E、脱手套时, 将手套口翻转脱下

答案：C

35、发生输液反应后要封：

- A、病历
- B、护理记录
- C、输液器
- D、输液器和药液
- E、药液

答案：D

36、下列哪项不是住院患者健康教育内容()

- A、医院规章制度
- B、一般卫生知识
- C、药物知识
- D、常用急救知识
- E、检查知识

答案：D

37、患者安全管理内容包括()

- A、评估患者安全因素, 做好安全教育工作
- B、儿童、老年、意识障碍和需要卧床休息的患者加床栏
- C、保持病区地面清洁干燥
- D、保持消费设施完好
- E、以上都是

答案：E

38、患者男, 32 岁, 因反复肛周肿痛伴脓性分泌物流出 1 周入院, 直肠指检: 扪到条索状, 伴有轻压痛, 挤压时外口有脓性分泌物流出。诊断考虑()

- A、内痔
- B、肛瘘
- C、外痔

D、肛周脓肿

E、直肠癌

答案：B

39、下列哪一项是诊断深静脉血栓形成后综合征的主要依据()

A、患肢活动后明显肿胀,平卧休息后肿胀减轻

B、浅静脉曲张

C、下肢静脉顺行造影

D、患肢足靴区反复溃疡

E、患肢大片色素沉着,脂质硬化

答案：C

40、患者男性、70岁,因外伤住院,住院3天出现持续高热伴寒颤。遵医嘱给予血培养采集。护士采集血标本时,下类哪项不正确()

A、血培养标本采集时尽量在使用抗生素之前

B、血培养标本采集时尽量在伤口局部治疗前

C、血培养标本采集时尽量在高热寒颤期前

D、.成人血培养采血一般10—20ml

E、成人血培养采血一般5—10ml

答案：E

41、典型心绞痛不常发生于

A、卧床时

B、寒冷时

C、情绪激动时

D、饱餐时

E、吸烟时

答案：A

42、王某,男,25岁,患化脓性扁桃体炎,在注射青霉素数秒钟后出现胸闷、气促、面色苍白、出冷汗及濒危感、血压75/45mmHg,护士首先采取的急救措施是()

A、给予氧气吸入

B、针刺人中、内关等穴位

C、停止注射青霉素,皮下注射盐酸肾上腺素1mg

D、给予静脉输液

E、报告医师

答案：C

43、文某,男,56岁。因双下肢麻木伴小腿萎缩2年加重1个月入院,既往无糖尿病史,为明确诊断拟行神经活检,护士给予的健康宣教中错误的是()

- A、活检有助于判断周围神经病的性质和病变程度
- B、检查部位常为腓肠神经
- C、术后需抬高患肢,24小时后应尽早下床活动
- D、术后需观察有无伤口出血和疼痛,保持敷料干燥
- E、一般检查后10-14天拆线

答案: C

44、肝昏迷者禁用何种溶液灌肠()

- A、生理盐水
- B、肥皂水
- C、温开水
- D、5%镁
- E、甘露醇

答案: B

45、胃癌最主要的转移途径是

- A、直接蔓延
- B、淋巴转移
- C、血行转移
- D、消化道转移
- E、浸润转移

答案: B

46、慢性呼吸衰竭最早最突出的表现是

- A、发热
- B、咳嗽
- C、发绀
- D、呼吸困难
- E、精神神经症状

答案: D

47、不符合医嘱查对制度相关要求的是()

- A、医嘱应做到班班查对、每日总对
- B、单线班处理的医嘱,由下一班负责查对
- C、临时执行的医嘱,需经第二人查对无误后方可执行,记录执行时间,执行者签名。

D、护士抢救患者时接到医师下达的口头医嘱,请第二人核对药物无误后即执行。

E、抢救完毕,医师补开医嘱并签名

安瓿留于抢救后再次核对

答案: D

48、新冠肺炎病例应在()小时内通过中国疾病预防控制中心信息系统进行网络直报。

A、1

B、2

C、6

D、12

E、24

答案: B

49、患者36岁男性,突发高热,咳嗽、咳痰,一周后突然咳出大量脓痰,体温下降,症状减轻,该患者最有可能的医疗诊断是:

A、支气管肺炎

B、支气管扩张

C、肺结核

D、支气管哮喘

E、肺脓肿

答案: E

50、急性白血病病人容易发生感染的主要原因是

A、白细胞增多

B、继发性营养不良

C、成熟粒细胞缺乏

D、长期贫血导致机体抵抗力下降

E、化疗药副作用

答案: C

51、Morse 跌倒评分是多少分以上提示为跌倒高度危险()

A、25分

B、35分

C、40分

D、45分

E、65分

答案: D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/408027047046006037>