

2023年急救技能比赛知识理论试题

共100题包括:A.1型题50题, A.2 型题10题, A.3 / A.4型题10题, B.型题10题, X型题20 题。

一、A.1型题

50题(即最佳回答题, 它由一个叙述主体和五个备选答案)组成, 选项中只有一个是恰当的, 其余四个答案为干扰答案)

1、下列哪一类水、电解质紊乱早期就易发生循环衰竭是()

- A.高渗性脱水
- B.等渗性脱水
- C.低渗性脱水(正确答案)
- D.水中毒
- E.低钾血症

2、严重创伤性休克后, 首先应预防的是: ()

- A.感染(正确答案)
- B.输血并发症
- C.急性心力衰竭
- D.肠麻痹
- E.急性呼吸窘迫综合征

3、感染性休克时, 心率降至 60-70次/分, 往往提示是: ()

- A.心功能好转
- B.休克好转
- C.代谢性酸中毒纠正
- D.微循环改善

E.心功能失代偿(正确答案)

4、休克时正确的补液原则是: ()

A.补液“宁多勿少”

B.需多少补多少(正确答案)

C.补充丧失的部分液体和当天继续丧失的液体

D.失多少补多少

E.如血压正常不必补液

5、使用阿托品的禁忌证是: ()

A.感染性休克

B.胃肠绞痛

C.前列腺肥大(正确答案)

D.胆绞痛

E.心动过缓

6、体温上升期的热代谢特点是: ()

A.产热等于散热

B.散热大于产热

C.产热大于散热(正确答案)

D.产热增加

E.散热障碍

7、休克患者缺血缺氧期微循环灌注的特点是: ()

A.少灌少流, 灌多于流

B.少灌少流, 灌少于流(正确答案)

- C.多灌多流，灌多于流
- D.少灌多流，灌少于流
- E.多灌少流，灌多于流

8、胸膜腔穿刺抽出不凝血的常见原因是：（）

- A.肋骨骨折
- B.张力性气胸
- C.心脏损伤
- D.开放性气胸
- E.血胸(正确答案)

9、有机磷农药生产或使用过程中，导致人体中毒的主要途径是：（）

- A.消化道
- B.皮肤(正确答案)
- C.粘膜
- D.呼吸道
- E.消化道和粘膜

10、休克患者血压低，中心静脉压低提示是：（）

- A.血容量严重不足(正确答案)
- B.严重酸中毒
- C.容量血管过度收缩
- D.心功能不全
- E.血容量不足

11、下列患者对氧疗效果最好的是：（）

- A.氰化物中毒
- B.心力衰竭
- C.一氧化碳中毒
- D.外呼吸功能障碍(正确答案)
- E.室间隔缺损伴有肺动脉狭窄

12、体温每升高 1℃，脑代谢率增加的是: ()

- A.1%
- B.2%
- C.4%
- D.6%
- E.8%(正确答案)

13、胸腔穿刺抽液引起急性肺水肿的原因是: ()

- A.穿刺损伤肺组织
- B.抽液过多、过快，胸膜腔内压突然下降(正确答案)
- C.胸膜超敏反映
- D.穿刺损伤肺血管
- E.空气栓塞

14、某休克患者，心率快，测中心静脉压为 5CmH₂O，应采取是: ()

- A.迅速补充液体(正确答案)
- B.控制少量输液
- C.心功能不全，立即给强心利尿药
- D.控制输液量，加用强心药
- E.休克与血容量无关

15、糖尿病酮症酸中毒抢救措施中不正确的是：（）

- A.小剂量胰岛素持续静脉滴注
- B.根据失水程度补液
- C. pH<7时补碱
- D.昏迷时输高渗糖脱水(正确答案)
- E.尿量达 40ml/h时补钾

16、高渗缺水早期的主要临床表现除口渴外，还同时伴有：（）

- A.狂躁
- B.昏迷
- C.幻觉
- D.血压下降
- E.以上都不是(正确答案)

17、呼吸衰竭最主要的临床表现是：（）

- A.呼吸费力伴呼气延长
- B.呼吸频率增快
- C.呼吸困难与发绀(正确答案)
- D.神经精神症状
- E.双肺有大量湿啰音
- F.受损节段平面以下双侧痛温觉缺失而触觉及深感觉保留

18、不属于判断休克指标的是：（）

- A.血压<12kPa
- B.脉压<4 kPa

C.神志改变

D.尿量<30ml/h

E.脉率<100次/分(正确答案)

19、有关腹内脏器损伤，不正确的是：（）

A.有恶心、呕吐、便血、气腹者，多为胃肠道损伤

B.排尿困难、血尿、外阴或会阴部牵涉痛者，提示泌尿系统损伤

C.内出血及同侧后背部牵涉痛常见于肝脾破裂

D.有休克者多为实质器官损伤(正确答案)

E.肝破裂，胆囊管损伤常有明显腹膜炎

20、心肌微循环灌注的决定因素是：（）

A.心肌收缩力

B.心排出量

C.心排血指数

D.动脉收缩压

E.动脉舒张压(正确答案)

21、符合休克不可逆期微循环特点的是：（）

A.毛细血管前括约肌、微动脉、微静脉均保持收缩

B.毛细血管前括约肌、微动脉、微静脉松弛(正确答案)

C.毛细血管前括约肌、微动脉松弛，微静脉收缩

D.毛细血管前括约肌和微动脉收缩，微静脉松弛

E.微循环血管对儿茶酚胺的反应性不变

22、各型休克的共同特点是：（）

A.有效循环血容量不足(正确答案)

B.尿少

C.低血压

D.代谢性酸中毒

E.昏迷

23、急性腹痛伴休克最常见的病因是：（）

A.急性心肌梗死

B.大叶性肺炎

C.急性坏死性胰腺炎(正确答案)

D.胃十二指肠溃疡急性穿孔

E.急性坏死性胆囊炎

24、服毒后洗胃抢救最有效的时间一般是：（）

A.48小时内

B.24小时内

C.12小时内

D.8小时内

E.4-6小时内(正确答案)

25、开放性气胸的现场急救措施是：（）

A.立即给氧、输液

B.胸膜腔穿刺抽气

C.清创术

D.立即用清洁物品封闭伤口(正确答案)

E.镇静、注射止痛药

26、多根多处肋骨骨折导致反常呼吸时的主要措施是：（）

- A.肋间神经阻滞
- B.骨折处局部封闭
- C.胸膜腔闭式引流
- D.使用呼吸兴奋剂
- E.固定胸壁(正确答案)

27、心搏骤停时最迅速有效的处理是：（）

- A.口对口人工呼吸
- B.纯氧人工呼吸
- C.胸外心脏按压
- D.胸内心脏按压
- E.胸外心脏按压同时行口对口人工呼吸(正确答案)

28、有效循环血量指的是：（）

- A.全身总血量
- B.在动脉内的血量
- C.单位时间内通过心血管系统进行循环的血量(正确答案)
- D.在微循环内的总血量
- E.在静脉内的血量

29、代谢性酸中毒最突出的症状是：（）

- A.呼吸深快，呼气时带酮味(正确答案)
- B.唇干舌燥，眼窝凹陷
- C.呼吸慢而浅，呼气时有烂苹果气味

D.心率加速，血压降低

E.疲乏，眩晕

30、判断腹腔内空腔脏器损伤最有价值的是：（）

A.腹膜刺激征

B.脉率增快

C.呕血

D.气腹(正确答案)

E.腹胀

31、过敏性休克的首选治疗药物是：（）

A.糖皮质激素

B.0.1%肾上腺素(正确答案)

C.抗组胺药

D.钙剂

E.硫代硫酸钠注射剂

32、不符合休克早期表现的是：（）

A.皮肤苍白

B.呼吸加快

C.烦躁不安

D.脉压<20mmHg(正确答案)

E.恶心、呕吐

33、较大面积组织渗血的止血措施是：（）

A.指压法

- B.加压包扎法
- C.屈曲肢体加垫止血法
- D.止血带止血法
- E.填塞止血法(正确答案)

34、急性心肌梗死早期（24小时内）的主要死亡原因是：（）

- A.心源性休克
- B.心律失常(正确答案)
- C.心力衰竭
- D.心脏破裂
- E.心肌梗死后心绞痛
- E.阿托品用量不足

35、代偿期出血性休克的失血量一般是：（）

- A.>2100ml
- B. 2100—1700ml
- C. 1200—1700ml
- D. <75ml(正确答案)
- E. 1200—800ml

36、弥散性血管内凝血（）指的是：()

- A.心、肝、肾等重要器官中有较多的血栓形成
- B.全身小动脉内有广泛性的血栓形成
- C.全身小静脉内有广泛性的血栓形成
- D.小动脉和小静脉内均有广泛性的血栓形成
- E.微循环内有广泛的微血栓形成(正确答案)

37、肋骨骨折后，保持呼吸道畅通的首选措施是：（）

A.止痛(正确答案)

B.胶布固定

C.多头胸带包扎

D.雾化吸入

E.气管插管

38、骨盆骨折最重要的体征是：（）

A.局部肿痛

B.骨盆分离挤压试验（+）(正确答案)

C.反常活动

D.畸形

E.骨擦音及骨擦感

39、诊断有机磷农药中毒最重要的指标是：（）

A.确切的接触史

B.毒蕈碱样和烟碱样症状(正确答案)

C.右眼鼻侧盲

D.左眼鼻侧盲

E.双眼颞侧盲

40、对诊断消化性溃疡穿孔最有价值的临床表现是：（）

A.突发上腹部剧痛

B.腹式呼吸消失

C.上腹部压痛明显

D.上腹部有反跳痛

E.肝浊音界消失(正确答案)

41、骨盆骨折最危险的并发症是: ()

A.盆腔内出血(正确答案)

B.膀胱破裂

C.尿道断裂

D.骶丛神经损伤

E.直肠损伤

42、大量失血时，首先发生的反应是: ()

A.脑和心脏的血管收缩

B.循环血液中儿茶酚胺减少

C.外周阻力降低

D.外周阻力增加(正确答案)

E.肾脏排出钠增多

43、急性失血时最先出现的调节反应是: ()

A.血管自身调节

B.交感神经兴奋(正确答案)

C.迷走神经兴奋

D.血液中血管加压素增多

E.血液中血管紧张素 II增多

44、内脏痛的主要特点是: ()

A.刺痛

B.快痛

C.定位不精确(正确答案)

D.必有牵涉痛

E.对牵拉不敏感

45、诊断右心衰最有意义的体征是: ()

A.心率明显增快

B.胸骨 3-4肋间闻及收缩期杂音

C.胸骨左缘 3-4肋间闻及舒张期奔马律(正确答案)

D.心律明显不齐

E.肺动脉瓣区第 2 心音明显亢进

46、右心衰体循环淤血的表现是: ()

A.端坐呼吸

B.心源性哮喘

C.劳力性呼吸困难

D.阵发性夜间呼吸困难

E.肝颈回流征阳性(正确答案)

47、治疗急性呼吸窘迫综合征最有效的措施是: ()

A.低浓度持续吸氧

B.高浓度吸氧

C.正压机械通气

D.呼气末正压通气(正确答案)

E.应用糖皮质激素

48、电击伤的主要损害是: ()

- A.心脏(正确答案)
- B.肺
- C.肝
- D.肾
- E.皮肤

59、急性阑尾炎最典型的临床表现是: ()

- A.阵发性右下腹疼痛
- B.腰大肌试验阳性
- C.发热
- D.转移性右下腹痛(正确答案)
- E.恶心呕吐

50、急性颅内压增高,有脑疝征像时,首选的药物是: ()

- A.25%山梨醇
- B.20%甘露醇(正确答案)
- C.50%葡萄糖
- D.50%甘油
- E.激素

二、A2型题(病例摘要型最佳选择题):试题结构是由

1个简要病历作为题干、5个供选择的备选答案组成,备选答案中只有1个是最佳选择。

1、男性,20岁,枕部外伤2小时来院就诊。X线平片示枕骨骨折,行CT检查时突然呼吸停止,昏迷,双瞳等大。此时病人最可能出现的情况是: ()

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/408030066127006035>