

2019 继续医学教育《抗菌药物临床应用指导原则》考试题及答案

2019 继续教育抗菌药物临床应用指导原则考试题及答案

1. 氨基糖苷类的抗结核药是 () A、链霉素
2. () 是最常见的社区获得性感染 A、急性上呼吸道感染
3. 氨基糖苷类抗生素不宜与呋塞米合用的原因是 () A、呋塞米增加其耳毒性
4. 对尚未发生侵袭性真菌感染的高危患者进行 () A、预防性治疗
5. 对厌氧菌无效的药物是 () A、克林霉素
6. 对于实施隧道式血管导管或药盒置入术的患者, 建议 () A、不推荐预防用药
7. 对于实施主动脉内支架植入术的高危患者, 建议预防性使用抗菌药物 () 次 A、1
8. 关于白喉抗毒素说法正确的是 () A、青霉素不可代替白喉抗毒素
9. 关于脓胸的治疗原则, 叙述有误的是 () A、慢性脓胸患者可口服给药, 若无好转可静脉给药
10. 关于社区获得性肺炎的治疗原则, 叙述有误的是 () A、重症患者选用口服药, 若临床表现无显著改善可肌肉注射
11. 关于碳青霉烯类抗菌药物在儿童群体中应用说法错误的是 () A、大于 6 月龄儿童的碳青霉烯类抗菌药物临床应用适应证与成人相
12. 关于头霉素类药物的使用注意事项说法错误的是 () A、不推荐头孢西丁用于 < 6 个月的婴儿
13. 经验治疗动物咬伤, 宜选药物为 () A、阿莫西林/克拉维酸
14. 抗菌药物品种的选用, 原则上应根据病原菌种类及病原菌对抗菌药物敏感性, 即 () 而定 A、药敏试验结果
15. 可诱发红斑狼疮的抗真菌药物是 () A、灰黄霉素
16. 流行性脑脊髓膜炎患者家庭的儿童, 可预防性给予下列哪种抗菌药物 A、利福平

17. 葡萄球菌性烫伤样综合征的病原体为 () A、产毒素金黄色葡萄球菌

18. 侵袭性真菌病的治疗疗程通常较长，需要考虑患者的免疫状态、感染病原菌和药物种类，一般在 () 周或以上 A、6~12

19. 时间依赖性抗菌药如青霉素类、头孢菌素类和其他 β -内酰胺类、红霉素、克林霉素等，应 () 给药 A、一日多次

20. 实施心脏射频消融术的患者，建议预防性使用 () 类抗菌药物 1 次 A、第一代头孢菌素

21. 使用 () 时，应注意抗生素相关腹泻和假膜性肠炎的发生，如有可疑应及时停药 A、克林霉素

22. 鼠咬伤所致的皮肤、软组织感染可选药物 () A、多西环素

23. 四环素用于 () A、斑疹伤寒

24. 碳青霉烯类抗菌药物临床合理应用的重点不包括 () A、多重耐药定植菌或携带状态，不宜使用碳青霉烯类抗菌药物治疗

25. 碳青霉烯类抗菌药物使用量增加的主要原因不包括 () A、免疫抑制治疗患者减少

26. 下列关于青霉素类药物的使用，叙述错误的是 () A、青霉素钾盐应快速静脉注

27. 下列关于碳青霉烯类药物使用注意事项描述错误的是 () A、本类药物不宜用于治疗轻症感染，可作为预防用药

28. 下列关于吸入炭疽的治疗说法错误的是 () A、宜选磺胺类治疗

29. 下列关于中性粒细胞缺乏伴发热说法错误的是 () A、常见病原体以病毒为主

30. 下列关于中性粒细胞缺乏伴发热说法错误的是 () A、常见病原体以病毒为主

31. 下列属于引起细菌性眼内炎的革兰阴性杆菌是 () A、铜绿假单胞菌及肠杆菌科细菌

32. 医疗机构应每月对院、科两级抗菌药物临床应用情况开展调查，项目不包括 () A、II、III类切口手术抗菌药物预防使用率和品种选择，

给药时机和使用疗程合理率

33. 以下对于抗菌药物给药剂量的认识，错误的是（） A、治疗单纯性下尿路感染时，应应用可耐受的最大剂量

34. 以下哪类手术 II、III 类切口可能含有革兰阴性杆菌、厌氧菌（如脆弱拟杆菌）（） A、结肠、直肠、阑尾手术

35. 以下哪类手术 II、III 类切口可能含有厌氧菌（如脆弱拟杆菌）（） A、肝、胆系统及胰腺手术

36. 治疗阿米巴肠病宜选药物（） A、甲硝唑

37. 治疗肠球菌属所致的血流感染，宜选药物为（） A、氨苄西林或青霉素氨基糖苷类

38. 治疗蜱传回归热可选多西环素 100mg 口服，（），7~10 天 A、bid ://doc.guandanr

39. 治疗由金黄色葡萄球菌（甲氧西林耐药）所致的脓胸，宜选药物为（） A、糖肽类±磷霉素

40. 中性粒细胞缺乏伴发热治疗原则说法错误的是（） A、尽早开始诊断性试验治疗

41. （）与异烟肼、吡嗪酰胺、乙胺丁醇联合是各型肺结核短程疗法的基石 B、利福平

42. 大环内酯类（）禁止与特非那定合用，以免引起心脏不良反应 B、克拉霉素

43. 对磺胺类药物不敏感的细菌是（） B、立克次体

44. 对青霉素过敏的细菌性脑膜炎病人，可选用（） B、氯霉素

45. 对于实施下腔静脉滤器植入术的患者，关于预防性应用抗菌药物的建议是（） B、不推荐常规预防使用抗菌药物

46. 对于头霉素类药物的适应证描述错误的是（） B、大肠埃希菌等肠杆菌科细菌、拟杆菌属等需氧菌引起的腹腔感染

47. 关于感染性心内膜炎的治疗原则叙述有误的是（） B、根据病原选用杀菌剂，应单一用药

48. 抗菌药物疗程因感染不同而异，一般宜用至体温正常、症状消退后（）小时，有局部病灶者需用药至感染灶控制或完全消散 B、

72~96

49. 抗菌药物临床应用的 () 是抗菌药物管理的核心策略 B、分级管理

50. 青霉烯类抗菌药物适应证不包括 () B、下呼吸道感染

51. 人工瓣膜感染性心内膜炎、真菌性心内膜炎疗程需 () 或更长, 以降低复发率 B、6~8 周

52. 属于大环内酯类抗生素的是 () B、罗红霉素

53. 替加环素的作用机制是 () B、抑制细菌蛋白质的合成

54. 万古霉素对哪种细菌引起的感染无效 () B、绿脓杆菌

55. 为预防外固定架植入术 II 类手术感染, 围手术期可以预防应用下列哪类抗菌药物 ()

e、第一、二代头孢菌素

56. 下列关于肾功能减退的成人美罗培南使用剂量错误的是 () B、血液透析患者剂量每次为 0.5g, 每 12h 给药一次

57. 下列哪些品种不属于 β -内酰胺类/ β -内酰胺酶抑制剂 () B、头孢拉定/舒巴坦

58. 下列哪种抗菌药物已证实对妊娠期妇女有危险性, 但仍可能受益多 () B、替加环素

59. 以下哪项属于 IV 类切口 (污秽-感染手术) () B、有失活组织的陈旧创伤手

60. 以下哪种抗菌药物可以引起新生儿的溶血性贫血 () B、磺胺药及呋喃类

61. 由 A 组溶血性链球菌引起的颌面部感染不选的药物是 () B、第三代头孢菌素

62. () 可用于治疗重症或伴血流感染的尿路感染患者 C、碳青霉烯类

63. 氨基糖苷类药物的不良反应不包括 () C、肝毒性

64. 滴虫阴道炎的宜选药物是 () C、甲硝唑

65. 对庆大霉素的描述, 下列说法错误的是 () C、耐药菌少

66. 肝病时避免应用以下哪种抗菌药物 () C、两性霉素 B

67. 钩端螺旋体病治疗时为避免治疗后出现（），初始治疗阶段抗菌药物的剂量宜小 C、赫氏反应

68. 关于替加环素，下列说法错误的是（） C、替加环素可用于铜绿假单胞菌感

69. 急性化脓性骨髓炎疗程为（） C、4~6 周

70. 经常发生链球菌咽峡炎或风湿热的儿童及成人，可预防性给予下列哪种抗菌药物（）

C、苄星青霉素

71. 可用于合并 HIV 患者的抗分枝杆菌感染的预防与治疗的药物是（ C、利福布汀

72. 利奈唑胺的适应证不包括（） C、社区获得性肺炎，由敏感的肺炎链球菌所致

73. 伤寒带菌者治疗可选用阿莫西林或氟喹诺酮类口服，疗程为（）周 C、6

74. 肾功能减退的患者使用磺胺甲恶唑时，应（） C、轻、中、重度肾功能减退时均需减量

75. 实施经颈静脉肝内门腔静脉分流术的患者，建议预防性使用抗菌药物，但以下哪种药物不在推荐之列（） C、阿奇霉素

76. 实施淋巴管造影术的患者，建议预防性使用（）类抗菌药物 1 次 C、第一代头孢菌素

77. 世界卫生组织推荐的成人麻风病患者少菌型疗程为（）个月 C、6

78. 碳青霉烯类抗菌药物临床应用存在的问题不包括（） C、自我我国开展抗菌药物临床应用专项整治以来，我国住院患者抗菌药物使用率上升

79. 碳青霉烯类抗菌药物临床应用评价细则中不包括下列哪种药物（） C、多立培南

80. 替加环素适应证不包括（） C、中枢神经系统感染患者

81. 下列关于立克次体病说法正确的是（） C、立克次体病是由立克次体科，柯克斯体科，巴通体科中的多个属、种的病原微生物引起

的感染病

82. 下列关于碳青霉烯类抗菌药物在特殊人群中的使用说法错误的是 () C、肝功能不全患者使用时一般都需要调整剂量

83. 下列哪种抗菌药物已证实对人类致畸，危险性大于受益 () C、奎宁

84. 心脏人工瓣膜置换术、人工关节置换术等，若术前发现有耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA) 定植的可能或者该机构 MRSA 发生率高，可选用 () 预防感染，但应严格控制用药持续时间 C、万古霉素、去甲万古霉素

85. 新生儿期应避免应用可导致脑性核黄疸及溶血性贫血的 () C、磺胺类药和呋喃类药

86. 猩红热主要由 () 引起 C、A 组溶血性链球菌

87. 严重中性粒细胞缺乏持续时间超过 () 天的高危患者和实体器官移植及造血干细胞移植的患者，在某些情况下也有预防用抗菌药物的指征 C、7

88. 以下哪类手术 II、III类切口可能含有口咽部厌氧菌 (如消化链球菌) () C、胃、十二指肠、小肠手术

89. 以下情况原则可以预防使用抗菌药物 () C、尚无细菌感染征象但暴露于致病菌感染的高危人群

90. 易透过血脑屏障，对隐球菌性脑膜炎有较好疗效的药物是 (C、氟胞嘧啶

91. 由流感嗜血杆菌引起的细菌性结膜炎不选的药物是 () C、阿糖腺苷

92. 有关特比萘芬的叙述不正确的 () C、对念珠菌有杀菌作用

93. 粘脓性宫颈炎最常见的病原是 () C、淋病奈瑟菌和沙眼衣原体

94. 治疗肠杆菌科细菌所致的肺脓肿，宜选药物为 () C、第三代头孢菌素±氨基糖苷类

95. 治疗肺炎克雷伯菌所致的皮肤、软组织感染，宜选药物为 (C、第三代头孢菌素

96. 治疗淋球菌性宫颈炎宜选的治疗药物是 () C、第三代头孢菌素
97. 治疗鼠疫的首选药物是 () C、链霉素
98. BSI 肺炎链球菌对 () 耐药者多见, 需注意药敏试验结果 D、红霉素或克林霉素
99. 百日咳的治疗药物首选 () D、红霉素
100. 不属于时间依赖性杀菌剂的是 () D、阿奇霉素
101. 多黏菌素类药物适用于以下哪类感染 () D、铜绿假单胞菌
102. 革兰阴性杆菌脑膜炎疗程至少为 () D、4 周
103. 红霉素不能作为下列哪种疾病的首选药物 () D、肺炎球菌所致的大叶性肺炎
104. 回归热螺旋体引起的中枢神经系统感染可以选青霉素、头孢曲松、头孢噻肟, 方式为 () D、iv. gtt
105. 急性肾盂肾炎伴发热等明显全身症状的患者, 疗程一般为 () D、2 周
106. 急性细菌性咽炎及扁桃体炎的病原菌主要为 () D、A 组溶血性链球菌
107. 急性细菌性中耳炎的病原菌以 () 最为常见, 三者约占病原菌的近 80% D、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌和卡他莫拉菌
108. 急性细菌性中耳炎为减少复发, 疗程应为 () D、7~10 天
109. 甲硝唑属于 FDA 妊娠期用药中的哪种类别 () D、B 类
110. 具有抗非发酵菌的碳青霉烯类药物不包括 () D、厄他培南
111. 慢性细菌性前列腺炎患者的磺胺疗程为 () D、1~3 月
112. 目前国内肠球菌属对万古霉素等糖肽类的耐药率在 () 以内 D、5%
113. 脓肿 > () 的脑脓肿患者考虑手术引流 D、2.5cm
114. 气性坏疽病原菌是 () D、产气荚膜梭菌
115. 青霉烯类抗菌药物使用注意事项是 () D、禁用于对青霉烯类药物过敏者
116. 世界卫生组织推荐的成人麻风病患者多菌型用药为 () D、利福平+氨苯砜+氯法齐明

117. 替加环素不可用于下列（）感染 D、变形杆菌属
118. 晚发医院获得性肺炎于入院几天发生（） D、 ≥ 5
119. 为避免回归热初始治疗时出现赫氏反应，应该（） D、抗菌药物的剂量不宜过大
120. 为预防脊髓手术 I 类手术切口感染，围手术期可以预防应用下列哪类抗菌药物（） D、第一、二代头孢菌素
121. 为预防皮瓣转移术（游离或带蒂）或植皮术 II 类手术切口感染，围手术期可以预防应用下列哪类抗菌药物（） D、第一、二代头孢菌素
122. 为预防胃、十二指肠、小肠手术 II、III 类手术切口感染，围手术期可以预防应用下列哪类抗菌药物（） D、第一、二代头孢菌素，或头霉素类
123. 下列不属于第一代头孢菌素类药物的是（） D、头孢克洛
124. 下列不属于梅毒治疗应选的药物是（） D、甲硝唑
125. 下列不属于治疗皮肤炭疽的药物是（） D、甲硝唑
126. 下列关于布鲁菌病说法错误的是（） D、属丙类传染病
127. 下列关于鼠疫说法错误的是（） D、属乙类传染病
128. 下列关于性传播疾病说法正确的是（） D、同时检查和治疗性伴侣
129. 下列属于第四代头孢菌素的是（） D、头孢吡肟
130. 小于 5 岁的婴幼儿脓胸，常见病原菌为（） a、黄色葡萄球菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌
131. 胸外科手术（食管、肺）II 类手术切口，不太可能含有污染菌是（） D、大肠杆菌
132. 氧头孢烯类抗菌药物使用注意事项不包括（） D、在治疗期间及治疗结束后 3 天内禁酒
133. 以下哪种抗菌药物可以引起灰婴综合征（） D、氯霉素
134. 以下情况原则上不应预防使用抗菌药物（） D、普通感冒、麻疹
135. 因颅底骨折导致化脓性脑膜炎，可能的致病菌为（） D、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、A 组溶血性链球菌
136. 因溶血性链球菌感染发生的非化脓性并发症，抗菌治疗疗程

需 () 天 D、10 137. 引起淋巴管炎及急性蜂窝织炎最常见的病原菌是 () D、A 组溶血性链球菌

138. 支气管扩张合并急性细菌感染，最常见的病原菌为 () D、铜绿假单胞菌

139. 治疗 B 组链球菌所致的细菌性脑膜炎及脑脓肿，宜选药物为 () D、氨苄西林或青霉素氨基糖苷类

140. 治疗不动杆菌属所致的医院获得性肺炎，宜选药物 () D、氨苄西林/舒巴坦，头孢哌酮/舒巴坦

141. 治疗草绿色链球菌所致的感染性心内膜炎，宜选药物为 () D、青霉素+庆大霉素 142. 治疗头癣的首选药物是 () D、灰黄霉素

143. () 是新大环内酯类抗生素 E、阿奇霉素

144. () 与氟胞嘧啶联合治疗隐球菌脑膜炎时，前者的剂量可适当减少，以减少其毒性反应 E、两性霉素 B

145. 艾滋病患者隐球菌性脑膜炎的首选药物是 () E、氟康唑

146. 初治菌阳/或菌阴结核疗程一般是 () 个月 E、6

147. 达托霉素为 () 抗菌药物 E、环脂肽类

148. 对多黏菌素类药物，错误的描述是 () E、快速杀菌剂

149. 复杂性血流感染需全身使用抗菌药物 () E、4~6 周

150. 肝功能减退的患者在应用林可霉素时，应 () E、肝病时减量慎用

151. 钩端螺旋体中、重度感染可选头孢曲松 () g，静脉滴注，qd b、1

152. 关于达托霉素，以下说法正确的是 () E、不可用于治疗肺炎，因其可被肺泡表面活性物质灭活

153. 关于对氨基水杨酸，下列描述错误的是 () E、严重肾病者可使用本药

154. 急性细菌性鼻窦炎最常见的病原菌是 () b、肺炎链球菌和流感嗜血杆菌

155. 急性细菌性中耳炎的初始治疗可 () E、口服阿莫西林

156. 加强监督检查有助于临床合理应用抗菌药物，具体措施包括

- () E、以上均是 157. 抗菌药物购用品种遴选应以 () 为目标, 保证抗菌药物类别多元化 E、优化结构、确保临床合理需要
158. 可引起视神经炎的抗结核药是 () E、乙胺丁醇
159. 喹诺酮类药物的适应证, 错误的是 () E、对甲氧西林耐药葡萄球菌感染有效 160. 立克次体感染的首选药物是 () E、多西环素
161. 利福平对哪种疾病无效 () E、乙脑
162. 联合用药时宜选用具有协同或相加作用的药物联合, 抗菌药物的联合用药通常采用 () 种药物联合 E、2
163. 林可酰胺类抗生素有神经肌肉阻滞作用, 应避免与以下哪种药物联用 () E、西咪替丁
164. 猫、狗咬伤 (多杀巴斯德菌) 所致的皮肤、软组织感染不可用 () E、头孢氨苄 165. 念珠菌血症的抗真菌治疗疗程为血培养阴性后再用 () 周 E、2
166. 青霉烯类抗菌药物目前临床应用仅有 () E、口服品种法罗培南
167. 伤寒和副伤寒治疗疗程一般为 () 天 E、10~14
168. 肾功能减退时, 不宜使用以下哪种抗菌药物 () E、四环素
169. 实验室工作者不慎暴露于鼠疫耶尔森菌, 应预防性给予下列哪些抗菌药物 () E、多西环素或 SMZ/TMP
170. 使用四环素治疗无效的是 () E、变形杆菌
171. 首选红霉素治疗的疾病是 () E、军团菌肺炎
172. 下列不属于治疗气性坏疽的可选药物是 () c、卡泊芬净
173. 下列关于破伤风说法错误的是 () E、新生儿破伤风应按丙类传染病报告
174. 下列关于替加环素给药方案说法错误的是 () E、治疗广泛耐药格兰阴性菌感染宜单药治疗
175. 下列关于阴道感染治疗说法错误的是 () E、治疗期间不影响性生活
176. 下列哪项不属于 β -内酰胺类/ β -内酰胺酶抑制剂的适应证 () b、风湿性心内膜炎 177. 下列哪项不属于第一代头孢菌素的适应证 ()

E、鼻炎

178. 新生儿为预防淋病奈瑟菌或衣原体眼炎，可给予下列哪些抗菌药物的眼药水（）E、四环素或红霉素

179. 以下除哪种情况，可先予以抗菌药物注射给药（）E、某些皮肤表层及口腔、阴道等黏膜表面的感染

180. 引起脓疱病最主要的病原菌为（ E、溶血性链球菌和/或金黄色葡萄球菌

181. 早产儿、新生儿应避免使用（ E、氯霉素

182. 治疗放线菌属所致的皮肤、软组织感染，宜选药物为（）E、氨苄西林或青霉素 183. 治疗空肠弯曲菌所致的肠炎，宜选药物（）E、阿奇霉素

184. 治疗沙眼衣原体所致的细菌性前列腺炎的，宜选药物为（）E、多西环素

185. 注射用乳糖酸红霉素使用时必须首先以注射用水完全溶解，加入生理盐水或 5% 葡萄糖溶液中，药物浓度不宜超过（），缓慢静脉滴注 E、0.1% ~0.5%

186. （）对氟喹诺酮类耐药率达 50% 以上，应尽量参考药敏试验结果选用 C、大肠埃希菌 187 （）对胎儿有致畸或明显毒性作用，妊娠期应禁用 E、利巴韦林

188 （）仅对结核分枝杆菌有效，对其它分枝杆菌及其它微生物无效 D、吡嗪酰胺

189 （）可用于治疗重症或伴血流感染的尿路感染患者 A、碳青霉烯类治疗淋病奈瑟菌所致的细菌性前列腺炎的，宜选药物为（）E、头孢曲松（单剂）

190 （）可作为美洲利什曼原虫病的替代治疗药物 B、两性霉素 B

191 （）是最常见的社区获得性感染 C、急性上呼吸道感染

192 （）所致的血流感染多生在社区 B、肺炎链球菌

193 （）为麻风联合化疗中的主要药物之一 A、利福平

194 （）与氟胞嘧啶联合治疗隐球菌脑膜炎时，前者的剂量可适当减少，以减少其毒性反应 A、两性霉素 B

195 () 与异烟肼、吡嗪酰胺、乙胺丁醇联合是各型肺结核短程疗法的基石 A、利福平 196 () 可用于治疗重症或伴血流感染的尿路感染患者 C、碳青霉烯类

197 () 是新大环内酯类抗生素 A、阿奇霉素

198 () 是新大环内酯类抗生素 E、阿奇霉素

199 () 是最常见的社区获得性感染 A、急性上呼吸道感染

200 () 为麻风联合化疗中的主要药物之一 A、利福平 BSI肺炎链球菌对

201 () 耐药者多见，需注意药敏试验结果 A、红霉素或克林霉素

202 艾滋病患者隐球菌性脑膜炎的首选药物是 () C、氟康唑

203 艾滋病患者隐球菌性脑膜炎的首选药物是 () E、氟康唑

204 氨基糖苷类的抗结核药是 () A、链霉素

205 氨基糖苷类抗生素不宜与呋塞米合用的原因是 () D、呋塞米增加其耳毒性

206 氨基糖苷类药物的不良反应不包括 () B、肝毒性

207 百日咳的治疗药物首选 () A、红霉素

208 不属于吡嗪酰胺的特点的是 () A、不易进入脑脊液和细胞内

209 不属于抗分枝杆菌药物的是 () D、利福布汀

210 不属于利福霉素类抗生素的是 () D、克林霉素

211 不属于时间依赖性杀菌剂的是 () D、阿奇霉素

布鲁菌病可选药物为 () A、多西环素联合利福平 6 周，或 SMZ/TMP6 周庆大霉素 2 周布鲁菌病一旦发现，应于 () 小时内向有关部门报告 C、24

布鲁菌病宜选药物为 () B/错

布鲁菌病宜选药物为 () D、多西环素 6 周庆大霉素 2~3 周

初治菌阳/或菌阴结核的推荐治疗方案是 () D、2HRZE/4HR

初治菌阳/或菌阴结核疗程一般是 () 个月 D、6

初治菌阳/或菌阴结核疗程一般是 () 个月 E、6

除以下哪项外，均是符合质量管理标准的临床微生物 (科) 室应具备的条件 () D、检测项目只涵盖细菌、病毒

达托霉素对（）无抗菌活性 D、革兰阴性菌

达托霉素通过与细菌（）结合、引起其电位的快速去极化，最终导致细菌细胞死亡 B、细胞膜

达托霉素为（）抗菌药物 E、环脂肽类

大肠埃希菌、克雷伯菌属、肠杆菌属产生碳青霉烯酶时，可选择（） B、替加环素

大环内酯类（）禁止与特非那定合用，以免引起心脏不良反应 C、克拉霉素、红霉素

大环内酯类对下列哪类细菌无效（） E、大肠埃希菌

单环 β -内酰胺类抗菌药物适应证不包括（） B、代谢疾病

滴虫阴道炎的宜选药物是（） D、甲硝唑

第三代头孢菌素注射用品不包括（） D、头孢泊肟酯

对多黏菌素类药物，错误的描述是（） D、快速杀菌剂

对磺胺类药物不敏感的细菌是（） Ab 错

对磺胺类药物不敏感的细菌是（） B、立克次体

对可能已发生侵袭性真菌感染的患者进行（） B、诊断性试验治疗

对青霉素过敏的细菌性脑膜炎病人，可选用（） A、氯霉素

对庆大霉素的描述，下列说法错误的是（） C、耐药菌少

对尚未发生侵袭性真菌感染的高危患者进行（） A、预防性治疗

对四环素类药物的不良反应，描述错误的是（） D、长期大量静脉给药不引起严重肝脏损害

对厌氧菌无效的药物是（） A、克林霉素

一、选择题（单选）

1、正确的抗菌治疗方案需考虑（D、以上 3 项）

2、可辅以抗菌药局部应用的情况有（C、隐球菌脑膜炎）

3、下列情况有抗菌药联合用药指征（B、病原菌尚未查明的严重细菌感染）

4、抗菌药分三类管理是为了（C、抗菌药合理使用的管理

5、限制使用类抗菌药是限制（ A、抗菌药应用适应证和适用人群

6、下列情况何种是预防用药的适应（D、人工关节移植手术）

- 7、预防用药用于何种情况可能有效（D、风湿热复发）
- 8、外科手术前预防用药应在何时使用（B、术前 60min 内
- 9、手术前预防用药目的是预防（D、切口感染和手术深部气管或腔隙感染
- 10、外科手术预防用药多数不超过（B、术后 24 小时
- 11、肝功能减退时，不需调整给药剂量的药物为（D、头孢他啶）
- 12、肾功能减退时，需调整给药剂量的药物为（ A、氨基糖甙类
- 13、新生儿感染时不宜选用（D、氨基糖甙类
- 14、氨基糖甙类抗生素不宜用于（D、孕妇无症状菌尿
- 15、下列哪种药物对铜绿假单胞菌不具抗菌活性（D、头孢噻肟
- 16、需鞘内给药的抗菌药物为（C、两性霉素）
- 17、大肠埃希菌所致尿路感染治疗不宜选用（ A、克林霉素
- 18、无论脑膜有无炎症，不能透入脑脊液的抗菌药物为（D、多粘菌素 B）
- 19、氨基糖甙类抗生素具有一定耳肾毒性，适用于（B、严重 G- b 感染）
- 20、肺炎链球菌、溶血性链球菌感染的首选药物为（D、青霉素
- 21、治疗甲氧西林耐药葡萄球菌感染时首选（D、万古霉素
- 22、妊娠期可以选用的抗菌药物有（D、哌拉西林
- 23、治疗艰难梭菌引起的假膜性肠炎可选用（ A、甲硝唑
- 24、治疗厌氧菌感染可以选用（D、甲硝唑
- 25、隐球菌脑膜炎可以选用的药物有（D、两性霉素 B）
- 26、氨基糖甙类对以下哪种细菌抗菌活性差（B、肺炎链球菌
- 27、有神经肌肉接头组织作用，不宜用于重症肌无力患者感染的药物为（D、阿米卡星

28、对曲霉有效的抗真菌药物为（D、两性霉素 B

二、是非题

- 1、第一代头孢菌素主要经过肾脏排泄（√）
- 2、产 ESBLs 菌株所致感染的治疗宜选用第四代头孢菌素（X）
- 3、肾功能不全时，头孢曲松及头孢哌酮亦需减量应用（X）

- 4、对青霉素过敏休克患者，亦可应用头孢菌素（X）
- 5、两性霉素 B 静滴不易发生畏寒、寒颤、发热、静脉炎等不良事件（X）
- 6、治疗假膜性肠炎首选氟康唑（X）
- 7、肾功能不全时禁用氨基糖甙类抗生素（）
- 8、引起过敏性休克最常见的药物为青霉素（√）
- 9、氯霉素可致早产儿、新生儿发生“灰婴综合征”，应避免使用（√）
- 10、应用头孢菌素类抗菌药物前应进行皮肤试验（X）
- 11、亚胺培南-西司他丁为治疗细菌性脑膜炎的选用药物（X）
- 12、所有 β 内酰胺类抗生素均不宜用于甲氧西林耐药葡萄球菌感染，即使体外药敏结果显示敏感（√）
- 13、氟喹诺酮类药物适用于各年龄段感染性腹泻患者的治疗（X）
- 14、氨苄西林为肠球菌感染的首选用药（√）
- 15、青霉素类、头孢菌素类等易产生过敏反应的药物不可局部应用（√）
- 16、SMZ-TMP 适用于治疗卡氏肺孢菌感染（√）

抗菌药物临床应用指导原则试题

一、单项选择（11 题）

- 1、老年人和儿童在应用抗菌药时，最安全的品种是（C）
 - A 氟喹诺酮类
 - B 氨基糖苷类
 - C β -内酰胺类
 - D 氯霉素类
- 2、亚胺培南、美罗培南等青霉烯类抗菌药主要用于（A）
 - A 革兰氏阴性产酶菌
 - B 革兰氏阳性产酶菌
 - C 真菌
 - D 支原体
- 3、对产生超广谱 β -内酰胺酶的细菌感染的患者进行治疗时宜首

选素。(A)

- A 碳青霉烯类
- B 氯霉素类类抗生
- C 大环内酯类
- D 氨基糖苷类

4、引起医院内感染的致病菌主要是 (B)

- A 革兰阳性菌
- B 革兰阴性菌
- C 真菌
- D 支原体

5、在细菌所引起的医院内感染中，以 A 尿路感染 B 术后伤口感染 C 肺部感染 D 皮肤感染

6、抗菌药物的选择及其合理使用是控制和治疗院内感染的关键和重要措施，以下哪项说法不正确 (D)感染在我国最常见。(C)

- A 病毒性感染者不用
- B 尽量避免皮肤粘膜局部使用抗菌药物
- C 联合使用必须有严格指征
- D 发热原因不明者应使用抗菌药物

7、下列哪种手术宜预防性应用抗生素 (D)

- A 疝修补术
- B 甲状腺腺瘤摘除术
- C 乳房纤维腺瘤切除术
- D 开放性骨折清创内固定术

8、耐甲氧西林的葡萄球菌 (MRSA) 的治疗应选用 (D)

- A 青霉素
- B 头孢拉定
- C 头孢哌酮
- D 万古霉素

9、预防用抗菌药物药缺乏指征(无效果，并易导致耐药菌感染)的是 (D)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/416040045044010204>