

五官科护理专项考核试题

一、选择题

1.眼球近似球形，其前后径约为（ ）[单选题]*

- A、 21mm
- B、 22mm
- C、 24mm✓
- D、 28mm
- E、 32mm

2.不构成眼球壁的组织是（ ）[单选题]*

- A、 角膜
- B、 结膜✓
- C、 巩膜
- D、 葡萄膜
- E、 视网膜

3.屈光系统不包括下列哪项（ ）[单选题]*

- A、 角膜
- B、 房水
- C、 晶状体
- D、 玻璃体
- E、 虹膜✓

4.关于角膜的说法正确的是() [单选题]*

- A、前后曲率半径相等
- B、各方向子午线曲度都相等
- C、营养主要来自空气
- D、呈竖椭圆形
- E、屈光度相当于+43.00D 凸透镜✓

5.角膜的解剖特征哪项是错误的() [单选题]*

- A、透明、屈光
- B、表层丰富感觉神经末梢
- C、无血管
- D、上皮细胞再生能力强
- E、内皮细胞含有色素✓

6.角膜组织再生能力强，对细菌亦有较强抵抗力的是() [单选题]*

- A、上皮细胞层
- B、前弹力层
- C、基质层
- D、后弹力层✓
- E、内皮细胞层

7.房水来源于() [单选题]*

- A、玻璃体液化
- B、房水静脉
- C、睫状突分泌✓

D、虹膜分泌

E、脉络膜分泌

8.晶状体的解剖生理特征哪项是错误的() [单选题]*

A、扁圆形双凸透明体

B、屈光、调节

C、无血管

D、介于角膜与玻璃体之间✓

E、介于虹膜与玻璃体之间

9.黄斑中心凹视力最敏锐是由于() [单选题]*

A、该处神经纤维较密集

B、该处有大量杆细胞

C、该处离视盘近

D、该处有大量锥细胞✓

E、该处是神经纤维汇总处

10.眼球中起“暗房”作用的是() [单选题]*

A、视网膜

B、葡萄膜✓

C、角膜

D、巩膜

E、角膜和巩膜

11.司明视觉和色觉的细胞是() [单选题]*

A、色素上皮细胞

- B、双级细胞
- C、神经节细胞
- D、锥细胞✓
- E、杆细胞

12.感受弱光的细胞是（ ）[单选题]*

- A、色素上皮细胞
- B、双级细胞
- C、神经节细胞
- D、锥细胞
- E、杆细胞✓

13.视盘为生理盲点所对应的部位，主要原因为该处（ ）[单选题]*

- A、无色素上皮
- B、有色素上皮
- C、无视网膜
- D、仅有神经纤维而无视细胞✓
- E、视细胞被中央动静脉遮盖

14.泪液中的粘液是由哪种组织或细胞分泌（ ）[单选题]*

- A、泪腺✓
- B、副泪腺
- C、睑板腺
- D、结膜杯状细胞
- E、睑缘腺

15.有关晶状体的描述，错误的是（ ）[单选题]*

- A、形如双面凹透镜✓
- B、位于虹膜与玻璃体之间
- C、具有调节作用
- D、由囊膜、皮质、核组成
- E、具有屈光作用

16.眼睑组织中，比较疏松，容易水肿的是（ ）[单选题]*

- A、皮肤层
- B、皮下组织层✓
- C、肌层
- D、睑板
- E、睑结膜

17.支配上斜肌的神经是（ ）[单选题]*

- A、视神经
- B、动眼神经
- C、滑车神经✓
- D、三叉神经
- E、面神经

18.下列哪项不是角膜的组成部分（ ）[单选题]*

- A、上皮细胞层
- B、前弹力层
- C、基质层

D、后弹力层

E、下皮细胞层✓

19.眼球内容物不包括（ ）[单选题]*

A、角膜✓

B、房水

C、晶状体

D、玻璃体

E、以上都包括

20.以下不属于眼附属器（ ）[单选题]*

A、眼睑

B、结膜

C、角膜✓

D、泪器

E、眼眶

21.眼睑的组织结构不包括（ ）[单选题]*

A、皮肤层

B、皮下组织层

C、基质层✓

D、睑板

E、睑结膜

22.暗室内应做到（ ）[单选题]*

A、地面应反光

B、窗户应安装避光窗帘✓

C、室内应光线明亮

D、地面打滑

E、墙壁为白色

23.在进行激光操作时应做到（ ）[单选题]*

A、保持瞳孔缩小

B、在普通治疗室进行

C、工作人员戴防护眼罩✓

D、操作前不用滴表面麻醉

E、可放置镜面反射物品

24.盲的标准是指双眼视力较好，眼最佳矫正视力为（ ）[单选题]*

A、大于 0.05

B、小于等于 0.05

C、小于 0.05✓

D、小于等于 0.5

E、小于 0.5

25.世界卫生组织规定，较好眼最佳矫正视力低于多少为低视力（ ）[单选题]*

A、 1.0

B、 0.8

C、 0.3✓

D、 0.1

E、 0.05

26.世界卫生组织规定，较好眼最佳矫正视力低于多少为盲（ ）[单选题]*

- A、 0.5
- B、 0.3
- C、 0.1
- D、 0.05✓
- E、 眼前手动

27.国际标准视力表远视力检查距离为（ ）[单选题]*

- A、 50m
- B、 6m
- C、 5m✓
- D、 3m
- E、 2.5m

28.近视力表检查的距离为（ ）[单选题]*

- A、 2尺
- B、 1尺
- C、 10cm
- D、 30cm✓
- E、 任意

29.如果在 2m 处才能看清 0.1 行视标，则该眼视力为（ ）[单选题]*

- A、 0.2
- B、 0.1
- C、 0.06

D、0.04✓

E、0.02

30、如走到视力表前距离多远仍不能识别 0.1 最大视标，则检查指数（ B ）

A、5m B1m C0.5m D30cm E10cm

30.如眼前指数仍不能识别，则改查（ ） [单选题]*

A、光感

B、光定位

C、手动✓

D、近视力

E、针孔视力

31.如眼前手动仍不能识别，则改查（ ） [单选题]*

A、指数

B、光定位

C、光感✓

D、针孔视力

E、色觉

32.色觉检查须在充足自然光线下进行，应在多少时间内读出（ ） [单选题]*

A、3 秒

B、5 秒✓

C、0 秒

D、15 秒

E、30 秒

33.色觉检查图表距眼应 () [单选题]*

- A、1尺
- B、0.5m✓
- C、1m
- D、5m
- E、任意

34.进行色觉检查时，正确的是 () [单选题]*

- A、距离为 50 厘米✓
- B、辨认时间可超过 5 秒
- C、距离为 30 厘米
- D、人工照明下进行
- E、遮盖一眼

35.下列哪项不属于内眼手术 () [单选题]*

- A、角膜
- B、晶状体
- C、视网膜
- D、慢性泪囊炎✓
- E、玻璃体

36.滴眼药水正确的部位为 () [单选题]*

- A、上穹窿部
- B、下穹窿部✓
- C、内眦部

D、外眦部

E、角膜

37.泪道冲洗患者冲洗时，进针阻力大，冲洗液体由原来泪点或上泪点全部溢出，说明（ ）[单选题]*

A、泪道狭窄

B、泪总管阻塞✓

C、鼻泪管阻塞

D、慢性泪囊炎

E 发生假道

38.张女士，57岁。2日前无明显诱因出现右眼胀痛、视力急剧下降，伴头痛，视力:右眼指数/30cm，左眼 1.0，指测右眼眼压结果是 T+2，说明眼压（ ）[单选题]*

A、正常

B、轻度增高

C、中度增高✓

D、重度增高

E、中度降低

39.黄先生，28岁。左眼被树枝刮伤，眼痛、畏光、流泪、眼红、视力锐减2日，遂来医院诊治。查远视力，右眼 1.0，左眼在 2.5m 处才看清最大视标。对其进行眼前段的检查时，错误的一项是（ ）[单选题]*

A、只进行左眼的检查✓

B、先查右眼，后查左眼

C、左眼滴 1%丁卡因 2 次

D、左眼滴 1%荧光素钠溶液

E、尽量避免对左眼的加压操作

40. 腮腺炎最常见的致病菌是 () [单选题]*

- A、链球菌
- B、金黄色葡萄球菌 ✓
- C、摩—阿双杆菌
- D、绿脓杆菌
- E、真菌

41. 腮腺囊肿的病因是 () [单选题]*

- A、细菌感染
- B、真菌感染
- C、腮腺分泌过旺 ✓
- D、腮腺出口阻塞
- E、腮腺变性

42. 老年人腮腺囊肿术后复发，首先应排除 () [单选题]*

- A、手术未切除干净
- B、瘢痕组织增生
- C、腮腺癌可能 ✓
- D、继发感染
- E、正常现象

43. 外腮腺炎切开部位及方向是 () [单选题]*

- A、皮肤面，与睑缘垂直
- B、皮肤面，与睑缘平行 ✓
- C、睑结膜面，与睑缘垂直

D、睑结膜面，与睑缘平行

E、以上均不是

44.睑板腺囊肿刮除术，切口应在（ ）[单选题]*

A、皮肤面，与睑缘垂直

B、皮肤面，与睑缘平行

C、睑结膜面，与睑缘垂直✓

D、睑结膜面，与睑缘平行

E、以上均不是

45.哪项体征不为睑腺炎所具有（ ）[单选题]*

A、睑结膜面形成肉芽肿✓

B、红肿

C、压痛

D、可出现脓点

E、炎症可向颅内扩散

46.关于睑板腺囊肿，错误提法是（ ）[单选题]*

A、俗名霰粒肿

B、无明显症状

C、应尽早切除✓

D、慢性肉芽肿增生

E、以上均不是

47.对眼球存在潜在威胁的眼病是（ ）[单选题]*

A、外睑腺炎

- B、睑板腺囊肿
- C、内睑腺炎
- D、慢性泪囊炎✓
- E、以上均不是

48.对睑腺炎的护理特别注意的是（ ）[单选题]*

- A、热敷
- B、涂眼膏
- C、滴眼药
- D、全身应用抗生素
- E、切忌挤压或用针挑✓

49.慢性泪囊炎最常见的致病菌是（ ）[单选题]*

- A、肺炎双球菌✓
- B、大肠杆菌
- C、变形杆菌
- D、脑膜炎双球菌
- E、绿脓杆菌

50.慢性泪囊炎常见于（ ）[单选题]*

- A、婴幼儿
- B、青少年
- C、中老年女性✓
- D、中老年男性
- E、青壮年男性

51.慢性泪囊炎常见于中老年女性的原因是 () [单选题]*

- A、女性好哭
- B、与月经有关
- C、女性鼻泪管较细长 ✓
- D、女性免疫力较弱
- E、女性眼轮匝肌较松弛

52.慢性泪囊炎从下泪点作泪道冲洗 () [单选题]*

- A、液体从鼻腔流出
- B、液体从下泪点流出
- C、液体从上泪点流出并伴脓液 ✓
- D、液体从原泪点流出
- E、以上均有可能

53.慢性泪囊炎最常见的有效治疗是 () [单选题]*

- A、泪道置管术
- B、泪道探通术
- C、泪道激光术
- D、鼻腔泪囊吻合术 ✓
- E、泪囊摘除术

54.急性结膜炎所表现的充血是 () [单选题]*

- A、睫状充血
- B、结膜充血 ✓
- C、混合充血

D、局限性充血

E、以上均不是

55.沙眼慢性期的特征是（ ）[单选题]*

A、滤泡增生

B、乳头肥大

C、血管模糊

D、瘢痕形成✓

E、以上均不是

56.不属于急性卡他性结膜炎的症状体征是（ ）[单选题]*

A、异物感

B、视力下降✓

C、灼热感

D、结膜充血

E、粘脓性分泌物

57.急性结膜炎护理措施哪项错误（ ）[单选题]*

A、热敷，包扎✓

B、频滴抗生素眼药水

C、涂眼膏

D、冲洗

E、做好消毒隔离

58.超急性细菌性结膜炎最常见的病因是（ ）[单选题]*

A、淋球菌✓

- B、绿脓杆菌
- C、金黄色葡萄球菌
- D、肺炎双球菌
- E、链球菌

59.有“脓漏眼”之称的是() [单选题]*

- A、成人淋球菌性结膜炎
- B、新生儿淋球菌性结膜炎✓
- C、成人脑膜炎球菌性结膜炎
- D、新生儿脑膜炎球菌性结膜炎
- E、各类型的急性结膜炎

60.超急性细菌性结膜炎的治疗应首选() [单选题]*

- A、青霉素滴眼液滴眼
- B、青霉素全身治疗
- C、利福平滴眼液滴眼
- D、四环素全身治疗
- E、青霉素局部和全身治疗同时进行✓

61.翼状胬肉如果侵入瞳孔区影响视力，则首选治疗方法是() [单选题]*

- A、丝裂霉素
- B、β射线照射
- C、手术治疗✓
- D、配戴眼镜
- E、以上都对

62.治疗沙眼效果较好的药物是（ ）[单选题]*

- A、青霉素滴眼液
- B、利福平滴眼液✓
- C、氧氟沙星滴眼液
- D、庆大霉素滴眼液
- E、氯霉素滴眼液

63.新生儿出生时眼部点用抗生素眼液或眼膏，是为了预防（ ）[单选题]*

- A、新生儿急性泪囊炎
- B、新生儿淋球菌性结膜炎✓
- C、新生儿白喉杆菌性结膜炎
- D、新生儿脑膜炎球菌性结膜炎
- E、各类型的急性结膜炎

64.引起沙眼的病原体（ ）[单选题]*

- A、细菌
- B、病毒
- C、衣原体✓
- D、支原体
- E、寄生虫

65.细菌性角膜炎由病菌感染，其前提多是（ ）[单选题]*

- A、角膜上皮损伤✓
- B、抵抗力下降
- C、滥用激素

D、沙眼

E、屈光不正

66.哪一种角膜溃疡病情发展最凶猛 () [单选题]*

A、匍行性角膜溃疡

B、铜绿假单胞菌性角膜溃疡 ✓

C、真菌性角膜溃疡

D、病毒性角膜溃疡

E、蚕蚀性角膜溃疡

67.单纯疱疹病毒性角膜炎的最常见类型是 () [单选题]*

A、树枝状角膜炎

B、地图状角膜炎

C、盘状角膜炎

D、坏死性角膜基质炎

E、树枝状和地图状角膜炎 ✓

68.铜绿假单胞菌性角膜炎溃疡首选的抗生素是 () [单选题]*

A、二性霉素

B、B 青霉素

C、环胞苷

D、多黏菌素 B ✓

E、甲硝唑

69.治疗真菌性角膜炎的最主要药物是 () [单选题]*

A、庆大霉素滴眼液

B、氧氟沙星滴眼液

C、链霉素滴眼液

D、两性霉素 B 滴眼液✓

E、氯霉素滴眼液

70.细菌性角膜溃疡的危险性在于() [单选题]*

A、前房积脓

B、角膜穿孔✓

C、眼痛

D、角膜薄翳

E、以上均不是

71.角膜溃疡应用 1%阿托品散瞳治疗是为了() [单选题]*

A、预防虹膜睫状体炎✓

B、保护溃疡面

C、迅速控制感染

D、预防穿孔

E、以上均不是

72.张先生,20岁。诉今晨起床后右眼红,灼热感,眼屎多并将睫毛粘住。初步诊断是() [单选题]*

A、病毒性结膜炎

B、急性细菌性结膜炎✓

C、沙眼

D、免疫性结膜炎

E、急性泪囊炎

73.白内障的主要症状是（ ）[单选题]*

- A、视力障碍✓
- B、眼痛
- C、眼充血
- D、压痛
- E、眼分泌物多

74.最常见的白内障类型是（ ）[单选题]*

- A、先天性
- B、代谢性
- C、外伤性
- D、并发性
- E、老年性✓

75.可诱发急性闭角性青光眼的是（ ）[单选题]*

- A、皮质性白内障初发期
- B、皮质性白内障膨胀期✓
- C、皮质性白内障成熟期
- D、皮质性白内障过熟期
- E、核性白内障

76.老年性白内障最好的治疗方法是（ ）[单选题]*

- A、手术治疗✓
- B、药物治疗
- C、放射治疗

D、验光配镜

E、补充营养

77.白内障术后无晶体眼的屈光状态是 () [单选题]*

A、高度近视

B、轻度近视

C、轻度远视

D、高度远视✓

E、老视

78.白内障手术前检查包括 () [单选题]*

A、血压

B、血糖

C、心电图、胸透和肝功能检查

D、血、尿常规及出、凝血时间检查

E、以上均有✓

79.目前较普遍应用的白内障摘除术为 () [单选题]*

A、囊内摘除术

B、现代囊外摘除术

C、超声乳化术✓

D、针吸术

E、针拨术

80.下列哪项白内障术前准备项目错误 () [单选题]*

A、术前滴抗生素眼液

- B、视功能检查
- C、眼压检查
- D、不是所有病人都要泪道冲洗✓
- E、检查有无结膜炎

81.以下哪项不属于白内障按其发展过程的分期（ ）[单选题]*

- A、进展期✓
- B、初发期
- C、成熟期
- D、过熟期
- E、膨胀期

82.王先生，63岁，左眼确诊为年龄相关性白内障，并行白内障囊外摘除术联合人工晶体植入术，术后护理指导错误的是（ ）[单选题]*

- A、清淡易消化饮食
- B、避免脏水入眼
- C、按摩术眼✓
- D、避免低头弯腰
- E、学会滴眼药水

83.调节眼压最主要的因素是（ ）[单选题]*

- A、房水✓
- B、晶状体
- C、玻璃体
- D、眼内血容量

E、巩膜硬度

84.一般正常人双眼压差异小于() [单选题]*

A、2mmHg

B、5mmHg ✓

C、8mmHg

D、10mmHg

E、不确定

85.一眼急性闭角型青光眼急性发作，对侧未发作眼为() [单选题]*

A、临床前期 ✓

B、先兆期

C、间歇期

D、慢性期

E、正常眼

86.急性闭角型青光眼好发于() [单选题]*

A、青壮年

B、老年男性

C、老年女性 ✓

D、青少年

E、婴幼儿

87.可使房角开放的药物是() [单选题]*

A、0.5%噻吗洛尔

B、20%甘露醇

- C、乙酰唑胺
- D、0.5%卡替洛尔
- E、1%毛果芸香碱✓

88.急性闭角型青光眼治疗不正确的是() [单选题]*

- A、手术是基本的治疗原则
- B、1%阿托品点眼✓
- C、口服乙酰唑胺
- D、口服维生素 B、维生素 C
- E、20%甘露醇

89.急性闭角型青光眼急性发作期表现不正确的是() [单选题]*

- A、剧烈头痛、眼痛、视力下降、眼压升高
- B、混合性充血
- C、角膜上皮水肿呈雾状
- D、前房极浅
- E、瞳孔缩小✓

90.口服乙酰唑胺可出现() [单选题]*

- A、瞳孔缩小
- B、四肢末端麻木✓
- C、心率减慢
- D、眼压升高
- E、房角开放

91.我国青光眼以何种居多() [单选题]*

A、闭角型青光眼✓

B、开角型青光眼

C、继发性青光眼

D、先天性青光眼

E、基本一致

92.可诱发急性闭角性青光眼的是 () [单选题]*

A、皮质性白内障初发期

B、皮质性白内障肿胀期✓

C、皮质性白内障成熟期

D、皮质性白内障过熟期

E、核性白内障

93.开角型青光眼典型的眼底表现是 () [单选题]*

A、视盘杯/盘比>0.6、✓

B、黄斑区樱桃红点

C、眼底有新生血管

D、微血管瘤形成

E、视网膜隆起

94.以下不是急性闭角性青光眼急性发作期的体征 () [单选题]*

A、混合性充血

B、角膜雾状浑浊

C、瞳孔散大

D、瞳孔缩小✓

E、眼压升高

95.引起葡萄膜炎的最主要原因是() [单选题]*

A、眼球穿孔伤

B、邻近组织炎症蔓延

C、手术创伤

D、内源性免疫反应✓

E、内源性细菌感染

96.急性虹睫炎的瞳孔改变是() [单选题]*

A、缩小✓

B、扩大

C、正常

D、闭锁

E、以上均不是

97.以下哪项不是急性虹睫炎的体征() [单选题]*

A、结膜混合性充血

B、角膜后沉着物

C、房水混浊

D、瞳孔扩大✓

E、虹膜前后粘连

98.治疗虹睫炎的关键是() [单选题]*

A、扩瞳✓

B、皮脂类固醇

- C、热敷
- D、抗感染
- E、病因治疗

99.预防 1%阿托品滴眼引起中毒的方法是 () [单选题]*

- A、滴后多饮水
- B、滴后即用缩瞳剂
- C、稀释后滴眼
- D、指压泪囊区 2-3 分钟✓
- E、以上均不是

100.王先生，65 岁高度近视患者，右眼下方出现黑影 3 天，应首先考虑 () [单选题]*

- A、视网膜中央动脉阻塞
- B、孔源性视网膜脱离✓
- C、视网膜色素变性
- D、老年黄斑变性
- E、高度近视黄斑变性

101.裂孔在颞侧的视网膜脱离，患者卧床体位为 () [单选题]*

- A、半卧位
- B、仰卧位
- C、鼻侧卧位
- D、颞侧卧位✓
- E、自由体位

102.机械性眼外伤不包括下列哪项 () [单选题]*

- A、角膜异物
- B、晶状体挫伤
- C、辐射性眼外伤✓
- D、前房积血
- E、视网膜震荡

103.眼睑淤血和肿胀较明显时，可在伤后多长时间内冷敷，以后热敷（ ）[单选题]*

- A、12h
 - B、24h✓
 - C、36h
 - D、48h
 - E、72h
- A、12h B、24h C、36h D、48h E、72h

104.下列哪种损伤最严重（ ）[单选题]*

- A、酸性烧伤
- B、碱性烧伤✓
- C、火焰性热烧伤
- D、红外线损伤
- E、紫外线损伤

105.对酸或碱性烧伤急救而言，最重要的是（ ）[单选题]*

- A、滴入碱性或酸性药物中和
- B、结膜下注射维生素
- C、散瞳

D、滴消炎眼药水

E、彻底冲洗眼部✓

106.眼球穿通伤的紧急处理不宜进行（ ）[单选题]*

A、预防感染

B、封闭伤口

C、彻底冲洗✓

D、止血

E、止痛

107.电光性眼炎一般在照射后多长时间发作（ ）[单选题]*

A、1-2h

B、2-3h

C、3-6h

D、6-8h✓

E、8-16h

A、1-2h B、2-3h C、3-6h D、6-8h E、8-16h

108.对电光性眼炎的处理，最主要的是（ ）[单选题]*

A、预防感染

B、治疗角膜上皮脱落

C、散瞳

D、减轻疼痛✓

E、防止角膜形成斑翳

109.眼屈光系统中，屈光力最大的是（ ）[单选题]*

- A、角膜
- B、晶状体✓
- C、房水
- D、玻璃体
- E、视网膜

110.正常情况下，婴儿为生理性的（ ）[单选题]*

- A、近视眼
- B、远视眼✓
- C、散光眼
- D、正视眼
- E、以上均不是

111.调节静止时，平行光线经眼的屈光焦点落在视网膜之前，其屈光状态为（ ）[单选题]*

- A、正视
- B、远视
- C、近视✓
- D、散光
- E、弱视

112.调节静止时，平行光线经眼的屈光焦点落在视网膜之后，其屈光状态为（ ）[单选题]*

- A、正视
- B、远视✓
- C、近视
- D、散光

E、弱视

113.调节静止时，平行光线经眼的屈光不能形成一个焦点，其屈光状态为（ ）[单选题]*

A、正视

B、远视

C、近视

D、散光✓

E、弱视

114.屈光不正不包括（ ）[单选题]*

A、近视

B、远视

C、散光

D、老视✓

E、以上都是

115.近视眼的眼球状态是（ ）[单选题]*

A、眼轴过长✓

B、眼轴过短

C、眼球突出

D、眼球凹陷

E、眼轴正常

116.高度近视并发症不包括（ ）[单选题]*

A、外斜视

B、玻璃体混浊

C、网膜脱离

D、闭角青光眼✓

E、开角青光眼

117.远视眼患者 () [单选题]*

A、仅看近需要调节

B、仅看远需要调节

C、远近均需调节✓

D、远近均不需调节

E、以上均不是

118.假性近视治疗哪项错误 () [单选题]*

A、点阿托品

B、雾视疗法

C、配凹透镜✓

D、眼保健操

E、针灸推拿

119.弱视是指 () [单选题]*

A、矫正视力 < 0.1

B、矫正视力 ≤ 0.8✓

C、裸眼视力 < 0.1

D、裸眼视力 < 0.8

E、裸眼视力 = 0.8

120.弱视治疗的最佳时期是 () [单选题]*

A、6岁之前✓

B、7-8岁

C、9-10岁

D、11-12岁

E、任何年龄

121.弱视经验光配镜后，最简单、有效和常用的治疗方法是（ ）[单选题]*

A、遮盖疗法✓

B、压抑疗法

C、红胶片疗法

D、红光刺激

E、理疗

122.第一斜视角等于第二斜视角可能是（ ）[单选题]*

A、麻痹性斜视

B、共同性斜视✓

C、弱视

D、以上都对

E、以上都不对。

123.近视眼患者视力改变的特点多为（ ）[单选题]*

A、远视力正常，近视力下降

B、远视力下降，近视力正常✓

C、近、远视力均正常

D、远、近视力均下降

E、以上均不对

124.矫正近视眼使用 () [单选题]*

A、凸透镜

B、凹透镜 ✓

C、圆柱镜

D、平面镜

E、三棱镜

125.高度远视的儿童，应尽早矫正，主要是预防 () [单选题]*

A、斜视

B、弱视 ✓

C、复视

D、低视力

E、双眼单视

126.老视的发生年龄在 () [单选题]*

A、30-40岁

B、40-50岁 ✓

C、50-60岁

D、60-70岁

E、70岁以上

127.以下哪项属于共同性斜视的特点 () [单选题]*

A、第二斜视角大于第一斜视角

B、第二斜视角小于第一斜视角

C、第二斜视角等于第一斜视角✓

D、眼球运动障碍

E、有复视及代偿头位

128.学生，14岁，诉最近几个月看书久时出现视远模糊。检查:右裸眼远视力 0.4，左裸眼远视力 0.5，双眼近视力均为 1.2;散瞳后右裸眼远视力 1.0，左裸眼远视力 1.2，双眼近视力均为 1.2。其诊断是() [单选题]*

A、近视真视

B、远视

C、散光

D、假性近视✓

E、老视

129.下列哪个鼻窦与牙根感染关系密切() [单选题]*

A、额窦

B、上颌窦✓

C、前组筛窦

D、蝶窦

E、后组筛窦

130.炎症第一位的鼻窦炎是() [单选题]*

A、额窦

B、上颌窦✓

C、筛窦

D、蝶窦

E、无明显差别

131.不属于鼻道窦口复合体的结构是() [单选题]*

A、中鼻甲

B、钩突

C、筛泡

D、半月裂孔

E、后组筛窦✓

132.中鼻道外侧壁结构不包括() [单选题]*

A、筛泡

B、钩突

C、半月裂孔

D、筛漏斗

E、鼻泪管✓

133.位于腭舌弓与腭咽弓之间的淋巴组织团块称() [单选题]*

A、咽扁桃体

B、腭扁桃体✓

C、管扁桃体

D、舌扁桃体

E、咽侧索

134.鼻泪管开口于() [单选题]*

A、上鼻道

B、中鼻道

C、下鼻道✓

D、鼻丘

E、半月裂孔

135.面部“危险三角区”是指() [单选题]*

A、两口角与鼻根部三点连线内✓

B、两眼外眦与下颏尖三点连线内

C、面前静脉与面后静脉间

D、强调外鼻静脉、眼静脉及海绵窦的关系，无具体范围

E、以上均不是

136.鼻咽癌的好发部位是() [单选题]*

A、咽隐窝✓

B、扁桃体窝

C、咽后壁

D、咽鼓管口

E、以上均不是

137.上呼吸道最狭窄的部位是() [单选题]*

A、声门裂✓

B、喉入口

C、喉室

D、声门下区

E、两侧假声带间

138.喉部唯一完整的环形软骨为() [单选题]*

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/418037020124006050>