
主治医师（口腔医学）-专业知识(A3/A4 型题 1)

1、主诉牙拟诊断为

- A. 慢性牙髓炎
- B. 慢性根尖周炎
- C. 急性根尖周炎
- D. 逆行性牙髓炎
- E. 急性牙周脓肿

2、提供的诊断依据如下，不必要的一项是

- A. 自发痛、夜间痛重
- B. 40 岁女性
- C. X 线片的表现
- D. 冷诊引起剧痛
- E. 牙周袋深 7mm

3、以下治疗方案中，除外

- A. 干髓术
- B. 根管治疗术
- C. 龈上洁治术
- D. 龈下刮治术
- E. 牙周手术

4、该患者拟诊断为

- A. 氟牙症
- B. 四环素牙
- C. 釉质发育不全
- D. 先天性梅毒牙
- E. 遗传性乳光牙本质

5、最有可能引起该疾病的时期在

- A. 母亲怀孕后期
- B. 母亲生产期
- C. 患儿出生以后
- D. 患儿 1 岁以后
- E. 患儿 2~3 岁以后

6、防治方面应注意

- A. 补充维生素和钙片
- B. 早期彻底地治疗母亲梅毒
- C. 口腔卫生与防龋措施
- D. 改变水源含氟量
- E. 用垫防止过度磨损

7、患牙初步诊断为

- A. 急性牙髓炎
- B. 慢性牙髓炎
- C. 急性根尖周炎
- D. 急性牙周脓肿
- E. 三叉神经痛

8、进一步的检查应是

- A. 牙周袋探诊
- B. 实验性备洞
- C. 选择性麻醉
- D. X线片检查
- E. 牙髓电活力测验

9、为对患者全身状态进行判断，问诊包括如下内容，除外

- A. 既往患病史
- B. 饮酒历史
- C. 妊娠情况
- D. 过敏反应
- E. 精神状况

10、该主诉牙的诊断首先考虑

- A. 浅龋
- B. 继发龋
- C. 深龋
- D. 慢性牙髓炎
- E. 急性牙髓炎

11、首选的修复术为

- A. 全冠
- B. 双层垫底后银汞合金修复术
- C. 垫底后复合树脂粘结修复术
- D. 玻璃离子粘结剂修复术
- E. 磷酸锌粘固剂修复术

12、窝洞应预备成

- A. 越过斜嵴向远中窝作预防性扩展
- B. 洞缘釉质壁应制备成斜面，以利于银汞合金与洞壁间的边缘封闭
- C. 应制备成洞缘斜面，有利于复合树脂嵌体与牙体间的密合
- D. 凹下的深洞底不必作成底平，以防穿髓
- E. 应制备成II类洞

13、在操作过程中应采取的护髓措施之一是

- A. 即使穿髓也要彻底干净地去除所有龋坏组织，然后直接盖髓

- B. 应该用高速涡轮机持续操作，争取一次去除腐质
- C. 慢钻去腐不必尖端切割
- D. 清洁和干燥窝洞直接用***喷吹
- E. 充填之前应对窝洞进行垫底

14、诊断为

- A. 牙隐裂
- B. 牙内陷
- C. 牙震荡
- D. 牙脱位
- E. 牙本质过敏

15、该牙的治疗方法为

- A. 开髓引流
- B. 降低咬合，患牙休息
- C. 结扎固定
- D. 抗感染治疗
- E. 牙髓失活

16、该症状诊断为

- A. 皮下血肿
- B. 过敏反应

- C. 皮下气肿
- D. 急性炎症
- E. 以上都不是

17、处理方法为

- A. 切开引流
- B. 加压包扎
- C. 穿刺
- D. 观察，酌情给予抗生素
- E. 抗过敏治疗

18、此病最可能诊断为

- A. 慢性牙周炎
- B. 局限型侵袭性牙周炎
- C. 广泛型侵袭性牙周炎
- D. 与糖尿病有关的牙周炎
- E. 青春期龈炎

19、此病的主要致病菌为

- A. 具核梭杆菌
- B. 链球菌
- C. 伴放线放线杆菌

D. 螺旋体

E. 乳杆菌

20、此病的治疗方案中，并不需要

A. 早期治疗

B. 调整机体防御功能

C. 同时进行正畸治疗

D. 同时使用阿莫西林和四环素作为辅助治疗

E. 定期复查和必要的后续治疗

21、为鉴别诊断，此患者采集病史时，在注意询问的各种情况中不包括

A. 家族史

B. 近来全身状况

C. 吸烟史

D. 长期服用药物史

E. 生理周期

22、若非由全身病变造成的牙周病变，通常不做的检查是

A. 牙龈色、形、质

B. 牙周探诊检查

C. 血常规及其分类

- D. 白细胞的趋化功能
- E. 不良修复体的检查

23、若诊断为妊娠期龈炎，临床检查最可能的发现是

- A. 牙龈鲜红色，表面呈分叶状，无疼痛
- B. 牙龈疼痛，出血，有恶臭味
- C. 牙龈出血及牙齿松动
- D. 化脓，恶臭味和牙龈疼痛
- E. 牙龈乳头出现溃疡

24、此病最可能诊断为

- A. 轻度牙周炎
- B. 中度牙周炎
- C. 重度牙周炎
- D. 与糖尿病有关的牙周炎
- E. 侵袭性牙周炎

25、完成全口的龈下刮治治疗后，再次复查时间应在

- A. 治疗后 1 周
- B. 治疗后 4~6 周
- C. 治疗后 8 周
- D. 治疗后 2~4 周

E. 以上均不正确

26、治疗后 6 周复查时，若无特殊主诉，应复查以下内容，除外

A. 拍 X 线片

B. 探牙周袋深度

C. 口腔卫生情况

D. 关系

E. 炎症消退情况

27、牙周病维护治疗阶段，不正确的是

A. 维护治疗与预后密切相关

B. 一般 3~6 个月复查 1 次

C. 复查间隔根据患者具体情况而定

D. 维护治疗只针对口腔卫生差的患者

E. 复查时应拍 X 线片

28、可能的诊断有

A. 血小板减少性紫癜

B. 创伤性血疱

C. 血友病

D. 再生障碍性贫血

E. 以上都是

29、所必需的辅助性检查是

- A. RPR
- B. TPHA
- C. 血常规
- D. 结核菌素试验
- E. 活组织检查

30、最可能的诊断是

- A. 乳头状瘤
- B. 黑棘皮病
- C. 增殖性天疱疮
- D. 白色海绵状斑痣
- E. 梅毒

31、治疗措施是

- A. 手术
- B. 激光
- C. 口服皮质类固醇激素
- D. 维生素 A 丸
- E. 肌注青霉素

32、最可能的诊断是

- A. 重型复发性阿弗他溃疡
- B. 结核性溃疡
- C. 癌性溃疡
- D. 创伤性溃疡
- E. Bednar 溃疡

33、最有效的处理方法是

- A. 修改义齿
- B. 重做义齿
- C. 切除溃疡
- D. 微波治疗
- E. 激光治疗

34、最可能的诊断是

- A. 雪口病
- B. 原发性疱疹性口炎
- C. 疱疹样口疮
- D. 复发性口疮
- E. 疱疹性咽峡炎

35、该病的病因是

- A. 真菌感染
- B. 病毒感染
- C. 细菌感染
- D. 遗传
- E. 营养不良

36、以下治疗措施不恰当的是

- A. 隔离并注意口腔卫生
- B. 补充维生素 C
- C. 口服阿昔洛韦
- D. 大剂量激素冲击疗法
- E. 局部应用中成药，如西瓜霜等

37、最可能的诊断是

- A. 单纯疱疹
- B. 带状疱疹
- C. 多形渗出性红斑
- D. 疱疹性咽峡炎
- E. 疱疹样口疮

38、该病治疗后仍能长期遗留的表现是

- A. 水疱

- B. 糜烂
- C. 疼痛
- D. 瘙痒
- E. 瘢痕

39、最可能的诊断是

- A. 轻型阿弗他溃疡
- B. 重型阿弗他溃疡
- C. 疱疹样阿弗他溃疡
- D. 疱疹性口炎
- E. 多形渗出性红斑

40、以下治疗措施不恰当的是

- A. 饮食隔离
- B. 口服肾上腺皮质激素
- C. 0.5%达克罗宁液局部涂布
- D. 微波理疗
- E. 局部应用中成药，如西瓜霜等

41、最具诊断价值的辅助检查手段是

- A. 免疫荧光
- B. RPR

- C. 细菌培养
- D. TPHA
- E. 甲苯胺蓝染色

42、若在上皮层间发现阳性检查结果，则治疗该病的首选药物是

- A. 抗病毒药
- B. 皮质激素
- C. 抗生素
- D. 维生素
- E. 性激素

43、以下不是以上首选药物禁忌证的为

- A. 高血压
- B. 糖尿病
- C. 孕妇
- D. 骨质疏松症
- E. 口腔溃疡

44、可能的诊断是

- A. 良性过角化
- B. 白斑
- C. 白色念珠菌病

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/418072130125006036>