





人的理





β 溶血性链球菌A组感



考点总结：链球菌感染的疾病

风湿性心瓣膜病：A族乙型溶血性链球菌

小儿急性肾小球肾炎：A族β溶血性链球菌

猩红热：A族乙型溶血性链球菌

风湿热：A族乙型溶血性链球菌

急性蜂窝组织炎：溶血性链球菌

急性淋巴管炎和淋巴结炎：化脓性链球菌

亚急性细菌性心内膜炎：草绿色链球菌

5~14岁,



- 水肿: 是最常见的症状, 初期仅累及眼睑及颜面, 重者波及全身, 非凹陷性。
- 血尿
:
- 高血压: 因水、钠潴留血容量扩大所致
- 高血压脑病和

例题

答案：E



□ 卧床休息

待肉眼血尿

消失，血压恢复正常、水肿减退可逐步增加室内活动量。3个月内避免剧烈体力活动。

□ 对症治疗：限制盐、水、蛋白质摄入，

□

□

体液过多 与肾小球滤过率下降有关

考点总结：常见的首优问题

首优护理问题	疾病
清理呼吸道无效	支气管扩张（大量脓痰时），颅脑损伤合并昏迷
体液不足（有体液不足的危险）	上消化道大出血、产后大出血、异位妊娠等
窒息（有窒息的危险）	支气管扩张（咯血时），维生素D缺乏性手足搐搦症，肺结核合并咯血，破伤风，口底颌下蜂窝织炎，高热惊厥等。
高热	肺炎链球菌肺炎、肺脓肿等。
体液过多	慢性心力衰竭，急性肾小球肾炎等。
疼痛	心肌梗死

水肿消退、血压正常、
肉眼血尿消失，可在室内轻度活动。

高糖、高维生素、适量蛋白质和脂
肪的低盐饮食

水肿消退、血压恢
复正常后，逐渐由低盐饮食过渡到普通饮食。

观察病

人有无剧烈头痛、呕吐、眼花、视物不清等

高血压脑病

年龄	正常尿量 (ml/d)	少尿 (ml/d)	无尿 (ml/d)
婴儿期	400~500	200	50
幼儿期	500~600		
学龄前期	600~800	300	
学龄期	800~1400	400	

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/425140324302011232>