

- 1 . 患者胃十二指肠溃疡穿孔腹膜炎 24 小时，伴有休克，应选择哪种治疗
  - A . 积极抗休克，如休克不能纠正，不手术
  - B . 积极抗休克，休克好转后手术
  - C . 立即手术
  - D . 抗休克同时手术
  - E . 积极抗休克，如休克纠正，则非手术治疗
- 2 . 男性，22 岁，反复肛旁红肿、溃破，有脓液流出 9 个月，可自愈但不久又发作。最可能的诊断是
  - A . 肛瘘
  - B . 皮脂囊肿感染
  - C . 血栓性外痔
  - D . 直肠脱垂
  - E . 肛裂
- 3 . 对于难治性肝硬化腹水，较好的治疗方法是
  - A . 大量利尿剂的应用
  - B . 多次放腹水，每次 6000ml 以上
  - C . 自家腹水经超滤浓缩回输体内
  - D . 加强保肝治疗
  - E . 反复输新鲜血
- 4 . 盆腔阑尾炎可引起下列哪项症状
  - A . 恶心呕吐
  - B . 大便秘结
  - C . 腹胀
  - D . 肠麻痹
  - E . 里急后重
- 5 . 5cm×4cm 的肾癌，靠近肾门，对侧肾功能正常，应选择的治疗方法是
  - A . 免疫治疗
  - B . 随访观察
  - C . 根治性肾切除
  - D . 肾部分切除
  - E . 放射治疗
- 6 . 男性，20 岁，反复出现咯血 1 周，进行性少尿 5 天，血压 160 /

100mmHg，尿蛋白（+++），红细胞满视野。入院后病情进行性恶化，出现肾功能衰竭，急需采取的治疗

- A . 止血药物应用
- B . 降低血压
- C . 纠正酸中毒
- D . 应用泼尼松
- E . 透析治疗

7 . 食管癌主要发生于

- A . 食管肌层
- B . 食管黏膜下腺体
- C . 食管旁淋巴组织
- D . 食管黏膜上皮细胞
- E . 食管黏膜下结缔组织

8 . 下列哪一项不属于胃的癌前期病变

- A . 胃黏膜脱垂
- B . 萎缩性胃炎
- C . 胃溃疡
- D . 胃息肉
- E . 胃酸缺乏

9 . 肝硬化腹腔积液患者，大量利尿后，嗜睡，多语，呼吸 14 次 / 分，有时四肢抽搐，血 pH7.5，CO<sub>2</sub>CP34mmol / L，HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>32mmol / L，BE+5.5，尿 pH5.0，PACO<sub>2</sub>7kPa，血 K<sup>+</sup>3.0mmo / L，Cl<sup>-</sup>90mmo / L，Na<sup>+</sup>145mmol / L，诊断为

- A . 肝硬化并肝性脑病
- B . 肝硬化并肝肾综合征
- C . 肝硬化并低钾低氯性代谢性碱中毒
- D . 肝性脑病并呼吸性碱中毒
- E . 肝硬化并酸中毒

10 . 中心型椎体结核正确的 X 线特征为

- A . 一般只影响单个椎体，椎体骨质破坏或压缩
- B . 脊柱呈竹节样，骨质疏松，多数伴有骶髂关节炎病变
- C . 患病椎体之间椎间隙变窄或骨性融合
- D . 一般影响相邻椎体，椎体压缩，椎间隙变窄
- E . 一般先影响关节边缘，引起破坏，关节间隙变狭窄，然后死骨形成，椎旁有肿块阴影

- 11 . 关于麻痹性肠梗阻的临床表现, 下列哪项是错误的
- A . 肠鸣音高亢, 伴气过水音
  - B . 常无阵发性绞痛
  - C . 腹胀往往显著
  - D . 腹痛为持续性钝痛
  - E . X 线检查显示大、小肠全部充气扩张
- 12 . 直肠肛管的检查体位中哪个是不常用的
- A . 胸膝位
  - B . 截石位
  - C . 蹲位
  - D . 右侧卧位
  - E . 左侧卧位
- 13 . 发现女孩尿道口肿物最有可能的诊断是
- A . 输尿管口囊肿
  - B . 尿道肉阜
  - C . 尿道黏膜脱垂
  - D . 尿道口囊肿
  - E . 处女膜伞
- 14 . 根据蛋白尿的发生机制, 尿蛋白分为五类, 错误的是
- A . 肾小球性蛋白尿
  - B . 肾小管性蛋白尿
  - C . 溢出性蛋白尿
  - D . 分泌性蛋白尿
  - E . 假性蛋白尿
- 15 . 女性, 50 岁黄疸病人, B 超检查显示肝内胆管直径约 1cm, 应进一步选择的检查是
- A . 静脉胆道造影
  - B . 核素扫描
  - C . 经皮肝穿刺胆道造影
  - D . 十二指肠低张造影
  - E . 腹腔动脉造影
- 16 . 男, 50 岁, 上腹闷胀, 进行性黄疸, 消瘦 2 个月。检查: 消瘦, 巩膜皮肤明显黄染, 腹软, 肝肋下 2 指, 有触痛及轻叩痛, 胆囊不大, 过去无胆道疾病史。化验: 尿胆红素+++ , 尿胆原不增加, 为明确诊断, 考虑作哪项检查

- A . 静脉胆道造影
  - B . 口服法胆囊造影
  - C . MRCP
  - D . 上消化道钡餐检查
  - E . 胃、十二指肠液检查
- 17 . 骨盆骨折的病人容易合并
- A . 肾损伤
  - B . 输尿管损伤
  - C . 膀胱损伤
  - D . 尿道损伤
  - E . 阴茎损伤
- 18 . 晚期肺癌病例 X 线检查可以看到
- A . 阻塞性肺炎
  - B . 肺门肿块
  - C . 胸膜腔积液
  - D . 肺不张
  - E . 癌性空洞
- 19 . 激素正规治疗儿童原发性肾病综合征临床最常见的疗效反应是哪种
- A . 激素敏感
  - B . 激素依赖
  - C . 激素耐药
  - D . 频繁复发
  - E . 以上均不是
- 20 . 男孩，5 岁，因膀胱肿瘤入院手术，术后病理显示是膀胱横纹肌肉瘤。同时发现肿瘤已经转移，以下哪一个不是常见的转移部位？
- A . 淋巴结
  - B . 肺
  - C . 骨
  - D . 脑
  - E . 骨骼肌
- 21 . 2 岁患儿，患单纯性肾病，激素敏感，泼尼松(强的松)隔日治疗已 3 个月，近半月夜间睡眠不安，多汗，今晨无诱因突发抽搐，既往无惊厥史，最大可能是
- A . 低钠血症

B . 低镁血症

C . 低钙血症

D . 低血糖

E . 癫痫

22 . 发现早期直肠癌最有效的方法是

A . 直肠指诊

B . 大便隐血

C . 直肠镜

D . CEA

E . 钡灌肠

23 . 青年男性，自高处跌下，致骨盆骨折，发生排尿困难，尿潴留，会阴部肿胀，导尿管不能插入膀胱，损伤的部位应是

A . 膀胱

B . 肛门直肠

C . 后尿道

D . 尿道球部

E . 阴茎部尿道

24 . 残胃癌发生在因良性病变施行胃大部切除术后至少

A . 1 年

B . 2 年

C . 3 年

D . 4 年

E . 5 年

25 . 男性，60 岁，半年来经常便秘，3 天前出现腹部持续疼痛，阵发性加剧，呕吐 2 次系胆汁性液体，约 500ml，过去无类似发作史，查体腹胀 BP18 / 13kPa，体温 37.5℃，右下腹稍压痛，腹软，未触及肿块，肠鸣音亢进，白细胞  $9 \times 10^9 / L$ ，其可能为

A . 急性胃炎

B . 急性胆囊炎

C . 急性胰腺炎

D . 肠梗阻

E . 急性肠扭转

26 . 关于脊柱脊髓损伤，正确的是

A . 脊柱骨折易发生于胸腰段

B . 脊柱中柱损伤、移位易损伤脊髓和马尾神经

- C . 颈脊髓损伤可出现体温失调
  - D . 脊髓中央管周围同损伤下肢症状重
  - E . 强直性脊柱炎多见
- 27 . 25 岁男性，右手中、环指肿胀、疼痛，X 片显示中、环指近节指骨膨胀性骨吸收，夹杂钙化斑。诊断内生软骨瘤，施刮除植骨术。术后 1 年复发，进一步的治疗是
- A . 肿瘤段切除，植骨术
  - B . 肿瘤段切除人工关节置换术
  - C . 刮除植骨术
  - D . 截指术
  - E . 放射治疗
- 28 . 关于强直性脊柱炎，下列哪项是错误的
- A . 基本病理为原发性、慢性、血管翳破坏性炎症
  - B . 多为自下而上型，少数病人为自上而下型，后者预后较好
  - C . 晚期 X 线检查可见双侧骶髂关节完全融合，脊柱呈现典型的“竹节”样改变
  - D . 治疗的目的是解除疼痛、防止畸形和改善功能
  - E . HLA-B27 检查多为阳性
- 29 . 冠状动脉造影结果如下述，哪一种情况才适合手术治疗
- A . 管径狭窄超过 50%，狭窄远端血流通畅，供吻合分支管腔在 1.5mm 以上
  - B . 管径狭窄超过 60%，狭窄远端血流通畅，分支在 1.5mm 以上
  - C . 管径狭窄超过 75%，狭窄远端血流通畅，分支在 1.5mm 以上
  - D . 管径狭窄超过 80%，狭窄远端血流通畅，分支在 1.5mm 以上
  - E . 管径狭窄超过 70%，狭窄远端血流不畅，分支是 10mm 时
- 30 . 隐睾的精子生成缺陷和下列哪一种情况有关
- A . 温度调节差
  - B . 原发性性腺功能不足（先天性）
  - C . 垂体功能不足
  - D . 以上都是
  - E . 以上都不是
- 31 . 迅速明确上消化道大出血的病因和部位应首选哪种检查
- A . 三腔二囊管压迫试验
  - B . 肝功能检查
  - C . 胃镜检查

- D . 选择性腹腔动脉造影  
E . X 线双重对比造影
- 32 . Calot 三角组成包括肝脏下缘、胆囊管和  
A . 副胆管  
B . 胆总管  
C . 肝总管  
D . 右肝管  
E . 胰腺下缘
- 33 . 男，50 岁，不慎右膝着地跌倒，造成右髌骨粉碎骨折，有移位，断端分离超过 0.5cm，其合适的治疗是  
A . 无菌条件下，抽尽血肿，保持伸膝位加压包扎  
B . 作髌骨切除术  
C . 中西医结合治疗早期康复治疗  
D . 切开复位，插针后用张力带缝合  
E . 手术切开复位，碎骨片切除，将肌腱缝合于骨面上，石膏托固定
- 34 . 我国学者发现能治疗消化性溃疡的抗生素是  
A . 羟氨卞青霉素  
B . 痢特灵  
C . 灭滴灵  
D . 四环素  
E . 克拉霉素
- 35 . 急性脓胸的治疗方法不正确的是  
A . 支持治疗  
B . 消炎治疗  
C . 闭式引流  
D . 开胸清除脓液  
E . 胸穿抽脓
- 36 . 畸胎瘤来源于  
A . 外胚层  
B . 中胚层  
C . 内胚层  
D . 三胚层  
E . 后肾胚基
- 37 . 95% 婴儿生后何时形成动脉导管的解剖上关闭  
A . 生后 3 个月内

- B . 出生后 6 个月内
- C . 出生后 9 个月内
- D . 出生后 12 个月内
- E . 出生后 18 个月内

38 . 下列不符合胸腹裂孔疝临床表现的是

- A . 重者出生后即有呕吐、气急、发绀，明显胸骨及肋间吸入性凹陷
- B . 轻者在食奶或哭闹时气急或轻度发绀，间歇性呕吐，易并发肺部感染
- C . 横膈上升超过 2 个肋间以上可出现呼吸急促和困难
- D . 心尖搏动、心浊音界向健侧移位；胸部叩呈浊音与鼓音，呼吸音弱，可闻肠鸣音
- E . 腹部不胀气或呈舟状腹

39 . 5 岁男孩，突起高热、畏寒 3 天，伴左膝关节肿痛就诊。查体：左侧膝关节红肿、压痛，活动时疼痛剧烈，浮髌试验(+)。下列处理欠佳的是

- A . 局部固定
- B . 大剂量静脉注射抗生素
- C . 关节内注射抗生素
- D . 全身支持疗法
- E . 立即切开引流

40 . 40 岁女性进行乳腺癌普查时，下列哪一项检查最为正确

- A . 细针穿刺细胞学检查
- B . 钼靶 X 线摄片
- C . 超声波检查
- D . 近红外线扫描
- E . 液晶热图检查

41 . 男，38 岁。1 年来活动后气促，伴腹胀及双下肢水肿。自述既往无不适，生活工作正常。查体：BP100 / 60mmHg，颈静脉怒张，双肺底可闻及湿啰音，心界向两侧扩大，S<sub>1</sub> 减弱，心尖部可闻及 3 / 6 级收缩期杂音，肝肋下 3cm，双下肢凹陷性<sup>1</sup>水肿。该患者最可能的诊断是

- A . 扩张型心肌病
- B . 风湿性心脏病
- C . 缩窄性心包炎
- D . 冠心病
- E . 肥厚型心肌病

- 42 . 胃、十二指肠溃疡术后几年发生的胃癌可称为残胃癌
- A . 10 年
  - B . 5 年
  - C . 3 年
  - D . 2 年
  - E . 1 年
- 43 . 女, 55 岁。进行性消瘦, 贫血、乏力、右下腹扪及包块, 大便隐血试验阳性。最可能的诊断是
- A . 降结肠癌
  - B . 结肠息肉
  - C . 溃疡性结肠炎
  - D . 升结肠癌
  - E . 慢性细菌性痢疾
- 44 . 急性胆囊炎致病菌主要来源于
- A . 肠道逆行人侵胆囊
  - B . 淋巴管道
  - C . 邻近脏器
  - D . 经门静脉
  - E . 经胃十二指肠动脉
- 45 . 由于内痔的动脉供应, 其好发部位多在截石位的
- A . 3、5、10 点
  - B . 1、5、9 点
  - C . 3、7、9 点
  - D . 1、6、11 点
  - E . 3、7、11 点
- 46 . 开放性气胸主要病生理变化是
- A . 胸壁软化
  - B . 反常呼吸
  - C . 纵隔摆动
  - D . 伤侧肺萎缩
  - E . 伤侧胸膜腔负压消失
- 47 . 女, 45 岁。肥胖。餐后发作右上腹部阵发性绞痛, 每次发作持续约 2~3 小时, 疼痛向右肩背部放射, 伴有饱胀感。首选的检查方法是
- A . B 超

B . CT

C . MRI

D . 上消化道钡餐

E . PET

48 . 下列哪种疾病可导致纵隔摆动

A . 张力性气胸

B . 闭合性气胸

C . 多根多处肋骨骨折

D . 进行性血胸

E . 肺爆震伤

49 . 肾炎并发症的药物治疗:可以保护肾功能, 延缓肾组织纤维化, 延缓肾功能慢性进展病程

A . 硝苯地平

B . 卡托普利

C . 硝普钠

D . 地高辛

E . 呋塞米

50 . 30岁男性, 枪伤后, 右上臂反常活动, 其远端未触及动脉搏动, 不能主动伸腕伸指, 需立即

A . 清创内固定, 探查血管、神经

B . 伤口清创, 骨牵引

C . 清创, 观察血液循环

D . 加压包扎, 观察血液循环

E . 闭合创口, 夹板外固定

51 . 对胸腔积液的患者, 若作胸腔穿刺发现脓液并有臭味, 应对脓液首先作下列哪项检查以确定病因

A . 涂片找癌细胞

B . 结核菌培养

C . 化脓菌培养

D . 厌氧菌培养

E . 真菌涂片及培养

52 . 何谓关节脱位

A . 关节分离

B . 关节囊扭伤并断裂

C . 关节面失去正常对台关系

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/426230201201010043>