

E 眶下区皮肤

106.采用头皮冠状切口治疗颧骨颧弓骨折时，切口处应到达哪一层？

- A 头皮下
- B 头皮浅筋膜下
- C 帽状筋膜深面
- D 颅骨骨膜深面
- E 根据患者具体情况而定

107.骨折后骨痂形成时间是

- A 24~48 小时
- B 48~72 小时
- C 3~5 天
- D 5~7 天
- E 7~14 天

108.患者，女性，18 岁，因车祸颌面外伤 6 小时急诊，患者右面部肿胀，压痛，右眶周瘀血，眶下区皮肤麻木，张口度 1 指，咬合关系正常，应考虑诊断为

- A 右侧下颌骨体部骨折
- B 右侧下颌骨髁状突颈部骨折
- C 右侧上颌骨骨折
- D 右侧颧骨颧弓骨折
- E 右侧上、下颌骨联合骨折

109.一患者从 2 米高处跌下二天，颈部着地，神志清，无头痛，呕吐史，两侧耳前区压痛明显肿胀，开口轻度受限，前牙开牙合，应考虑诊断为

- A 眶骨骨折
- B 颧弓骨折
- C 双侧下颌骨髁状突部骨折
- D 下颌体部骨折
- E 下颌骨颈部骨折

110.颧弓骨折必须复位的指征是

- A 咀嚼无力
- B 鼻孔出血
- C 骨折区疼痛
- D 张口受限
- E 病人要求治疗

111.鼻骨最常见的骨折是

- A 单侧线性骨折
- B 单侧粉碎性骨折
- C 双侧线性骨折
- D 双侧粉碎性骨折

E 横断骨折

112.鼻骨骨折时骨折块移位的方向取决于

- A 暴力的性质、大小和方向
- B 鼻骨骨折块上附着肌肉的牵引作用
- C 骨折线的方向
- D 患者的年龄和性别
- E 患者原有鼻骨的骨质、结构等

113.鼻骨骨折后出现鞍鼻畸形主要见于

- A 打击力来自侧面且力量较小
- B 打击力来自侧面且力量较大
- C 打击力来自于正前方
- D 打击力直接打击在鼻根部
- E 打击力直接打击在鼻底部

114.下述口腔颌面部骨折检查效果最好的检查手段是

- A 临床检查
- B 颌面部 X 线平片检查
- C 颌面曲面断层片
- D CT
- E 螺旋三维 CT 重建

115.鼻骨骨折时，鼻外复位法适用于

- A 向侧方移位的鼻骨骨折
- B 向内侧凹陷的鼻骨骨折
- C 同时向侧方和内侧移位的鼻骨骨折
- D 双侧粉碎性鼻骨骨折
- E 横断性鼻骨骨折

116.某青年男性患者，因交通事故而受伤，诊断为鼻骨骨折伴脑脊液鼻漏，采用鼻外复位法复位鼻骨骨折，保持脑脊液引流畅通，同时采用抗生素预防感染，10 天后脑脊液鼻漏仍未停止，应

- A 继续保持脑脊液引流畅通，同时继续采用抗生素预防感染
- B 继续保持脑脊液引流畅通，停用抗生素
- C 采用前鼻孔填塞法，以促使脑脊液鼻漏停止，同时采用抗生素预防感染
- D 采用后鼻孔填塞法，以促使脑脊液鼻漏停止，同时采用抗生素预防感染
- E 联系神经外科医师，进行硬脑膜裂口修复术

117.鼻骨骨折、骨折片向内塌陷移位的患者，同时伴有脑脊液鼻漏，应进行以下何种治疗？

- A 鼻外复位术，保持脑脊液引流畅通，应用抗菌药物预防感染
- B 鼻外复位术，采用前鼻腔填塞法促使脑脊液鼻漏停止
- C 鼻内复位法，复位后采用碘仿纱条填塞于鼻内骨折部固定，应用抗菌药物预防感染
- D 鼻内复位法，只采用鼻外夹板固定，应用抗菌药物预防感染

E 保持脑脊液引流畅通，应用抗菌药物预防感染，待脑脊液鼻漏停止后再进行鼻骨骨折复位固定

118.鼻骨骨折在进行鼻内复位术后，采用碘仿纱条填塞于鼻内骨折部，应在何时抽出碘仿纱条？

- A 1~2 天
- B 3~4 天
- C 5~6 天
- D 7~8 天
- E 2 周后

119.交通事故引起口腔颌面部损伤，常引起身体其他部分的合并伤，其中最常见的并发症是

- A 颅脑损伤
- B 四肢损伤
- C 眼损伤
- D 躯干部损伤
- E 骨盆伤

120.下述口腔颌面部损伤中处理难度最大的是

- A 面上份骨折
- B 面中份骨折
- C 面下部骨折
- D 牙槽骨骨折
- E 口腔颌面部软组织撕裂伤

121.某青年男性患者，被他人拳击眼部 1 天入院，检查发现眶周瘀血、肿胀，眼球陷没，复视和眶下区麻木，下直肌牵拉试验阳性，经 X 线检查和 CT 检查，确诊为眶底骨折、眶内容物移位进入上颌窦，应进行何种治疗？

- A 立即手术治疗，术后采用抗菌药物预防感染
- B 采用抗菌药物预防感染，伤后 1 周再进行手术治疗
- C 采用抗菌药物预防感染，伤后 2 周再进行手术治疗
- D 采用抗菌药物预防感染，密切观察即可，一般均可自行恢复
- E 采用抗菌药物预防感染，密切观察 2 周，如症状不恢复再进行手术治疗

122.眶底骨折进行手术治疗时最常采用的切口是

- A 颌下切口
- B 口内前庭切口
- C 下睑下切口或眶下切口
- D 眉弓外侧切口
- E 头皮冠状切口

123.口腔颌面部火器伤的严重程度主要取决于投射物的致伤力和受创组织器官的解剖特点，其中，投射物的致伤力中最重要的影响因素是

- A 投射物的动能

- B 投射物的速度
- C 投射物的体积
- D 投射物的质量
- E 投射物的形状

124.口腔颌面部火器伤严重程度的影响因素中，受创组织器官的解剖特点中最重要的影响因素是

- A 受创组织器官的密度
- B 受创组织器官的弹性
- C 受创组织器官的坚韧度
- D 受创组织器官的含气情况
- E 受创组织器官的含液情况

125.多数口腔颌面部火器贯通伤的出入口情况为

- A 出口小、进口大
- B 进口小、出口大
- C 进出口大小差别基本一样大
- D 出入口完全一样大
- E 出入口大小完全随机，没有规律

126.口腔颌面部火器伤引起颌骨粉碎性骨折，伴有约 2cm 的骨质缺损，进行清创缝合术时将软组织覆盖骨断端，骨质缺损留待二期植骨。进行二期植骨的时间为

- A 伤后 1 周以后
- B 伤后 2 周以后
- C 伤后 1 月以后
- D 伤后 3 月以后
- E 伤后 6 月以后

127.一名口腔颌面部爆炸伤患者，诊断为下颌骨粉碎性骨折，伤后进行了初期处理，伤后 1 周发现创口红肿，有脓性分泌物，进行切开引流后，每天换药。伤后 2 周时拍摄 X 片发现有死骨，应如何处理？

- A 继续每天换药，使创口生长肉芽组织，直至创口愈合
- B 应用大剂量抗生素，同时每天换药，换药时用抗菌药物溶液局部冲洗
- C 立即进行死骨刮治术，术后采用大剂量抗生素和每日换药
- D 继续每天换药和抗菌药物治疗，10 天后进行死骨刮治术
- E 继续每天换药和抗菌药物治疗，伤后 6 周进行死骨刮治术

128.口腔颌面部轻度烧伤常在下述何时愈合？

- A 伤后 5 日内
- B 伤后 7 日内
- C 伤后 10 日内
- D 伤后 2 周内
- E 伤后 1 月内

129.对芥子气直接染毒创伤进行清创时，冲洗创口应采用

- A 5%碳酸氢钠溶液和生理盐水
- B 0.1%高锰酸钾溶液和生理盐水
- C 15%氨水和生理盐水
- D 18%氯胺乙醇与生理盐水
- E 15%氨水与乙醇

130~132 题共用题干：

患者男性，35岁，1小时前从二楼跌下，颈部着地，不省人事数分钟后清醒。检查：神志清楚，呼吸急促，口唇紫绀，鼻翼煽动，下唇及2-2间牙龈撕裂，下颌弓变窄，舌体后坠，口底血肿形成。

130.最可能并发的颅脑损伤是

- A 颅骨骨折
- B 脑震荡
- C 脑挫裂伤
- D 硬膜外血肿
- E 脑脊液漏

131.抢救措施首先是

- A 吸氧
- B 清创缝合
- C 气管切开
- D 口对口人工呼吸
- E 骨折复位

132.颌骨骨折发生的部位可能是

- A 正中颈部单线骨折
- B 一侧颞孔区骨折
- C Lefort III型骨折
- D 下颌颈部粉碎性骨折
- E 双侧髁状突部骨折

133~135 题共用题干：

患者男性，因车祸颌面部外伤8小时急诊，检查，患者左面部肿胀明显，眶周、眼睑及结膜下淤斑、压痛，无复视和眼球运动受限；有张口受限，张口度1指半，咬合关系正常。

133.常规行X线检查时，最好拍摄

- A 头颅正位片
- B 头颅侧位片
- C 鼻颏位和颧弓位
- D 下颌曲面体层片
- E 颅底片

134.可能的诊断是

- A 面部软组织损伤
- B 下颌骨髁状突骨折
- C 颧骨及颧弓骨折
- D 上颌骨骨折
- E 下颌骨体部骨折

135.如果确诊，应采取的治疗措施是

- A 局部冷敷
- B 抗炎治疗
- C 颌间牵引固定
- D 颅颌固定
- E 手术切开复位固定

136~139 题共用题干：

患者因车祸颌面部损伤 2 小时急诊，伤后无昏迷史和呕吐史，检查：神志清楚，脉弱速，无呼吸困难，2-2 多个牙可整体摇动，后牙咬合正常，无张口受限，舌前 1 / 3 裂伤，出血明显，口底肿胀。

136.抢救措施首先是

- A 观察颅脑损伤
- B 气管切开
- C 局部止血
- D 立即静脉补液
- E 应用抗菌药物和 TAT

137.止血有效的方法是

- A 结扎颈外动脉
- B 压迫出血侧颈总动脉
- C 纱布压迫止血
- D 行清创缝合术
- E 注射止血药

138.最可能的骨折部位是

- A 上颌骨

- B 下颌骨
- C 牙槽骨
- D 下颌颏正中部
- E 下颌颏孔区

139~142 题共用题干：

患者因高速公路车祸导致口腔颌面部严重创伤，急诊入院

139.采集病史时应特别注意询问

- A 受伤时间
- B 致伤原因
- C 昏迷史
- D 疼痛部位及性质
- E 伴随症状

140.经检查发现双侧上颌骨可疑骨折，确诊最有价值的辅助检查是

- A 头颅正位片
- B 鼻颏位片
- C 颅底片
- D 下颌曲面体层片
- E 头颅侧位片

141.若上颌骨确诊骨折，急救首先是

- A 止血
- B 复位
- C 止痛
- D 防治感染
- E 保持呼吸道通畅及止血

142.对患者上颌骨骨折诊断中最有决定意义的症状是

- A 牙齿折断或错位
- B 鼻孔出血
- C 面部肿胀
- D 脑震荡
- E 上颌骨出现动度及错牙合

**【B 型题】**

143~145 题共用备选答案:

A 4周

B 8周

C 3周

D 10周

E 2~3周

143.采用单纯外固定法治疗下颌骨体部骨折时, 通常的颌间固定时间为

144.采用单纯外固定法治疗髁状突骨折时, 通常的颌间固定时间为

145.采用单纯外固定法治疗上颌骨骨折时, 通常的颌间固定时间为

146~148 题共用备选答案:

A 颌内动脉

B 颌外动脉

C 颞浅动脉

D 颈总动脉

E 唇动脉

146.额部、头顶颞部出血时可压迫

147.面部出血时可压迫

148. 头面部广泛严重出血时可暂压迫

149~151 题共用备选答案:

A 开放性损伤



B 闭合性损伤

C 复合伤

D 贯通伤

E 枪弹伤

149.皮肤或口腔粘膜完整性受到破坏的损伤称为

150.除颌面部损伤外，合并有其他部位或器官损伤称为

151. 皮肤或粘膜完整性尚存的损伤称为

152~155 题共用备选答案：

A 暂时制动

B 单颌牙弓夹板固定

C 颌间牵引固定

D 手术切开复位内固定术

E 暂不处理，随访

152.移位明显的颌骨骨折需要

153.没有移位的单发线性颌骨骨折需要

154.轻微移位的单发线性颌骨骨折需要

155.牙槽骨骨折可行

156~159 题共用备选答案：

A 颅面分离

B 耳鼻流出血性液体

C 复视

D 张口受限

E 局部水肿

156. 颅底骨折常伴有

157. 眶底骨折常伴有

158. 颧骨颧弓骨折常伴有

159. 上颌骨高位骨折常伴有

160~169 题共用备选答案:

A 1 级

B 2 级

C 3 级

D 4 级

E 5、6 级

160. 按照创伤简明定级标准 (abbreviated injury scale, AIS), 鼻骨骨折属于

161. 按照 AIS, Le Fort III型上颌骨骨折伴颅骨骨折属于

162. 按照 AIS, Le Fort II型上颌骨骨折属于

163. 按照 AIS, Le Fort III型上颌骨骨折属于

164. 按照 AIS, 牙折属于

165. 按照 AIS, 颧骨骨折属于

166. 按照 AIS, 下颌支骨折属于

167. 按照 AIS, 下颌骨体部骨折属于

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/427021050066006041>