

放射肿瘤科考试练习题及答案（一）

一、单选题（共 90 题，每题 1 分）

1、患者，男性，36 岁，咳嗽多日，左侧胸痛伴发热。最有可能的选择是B

- A、右侧肺炎
- B、左侧大叶性肺炎
- C、右肺气胸
- D、左侧气胸
- E、胸片正常

2、患者，女性，26 岁，跌倒胸部着地，胸痛。最有可能的选择是B

- A、张力性气胸
- B、左侧肋骨骨折
- C、大量胸腔积液
- D、弥漫性肺气肿
- E、肺叶性肺不张

3、关于良性骨肿瘤的治疗，下列哪项是错误的A

- A、若肿瘤生长较快才切除
- B、若肿瘤明显增大才切除
- C、均需手术切除
- D、若肿瘤影响功能才切除
- E、肿瘤恶变应尽早手术

4、不能作为判断幽门螺杆菌根除的检验方法是E

- A、活组织幽门螺杆菌培养
- B、组织学检查找幽门螺杆菌
- C、C13 尿素酶呼气试验
- D、快速尿素酶试验
- E、血清学检查

E、血清抗幽门螺杆菌抗体检测

5、女性，17岁，近两月胸闷，乏力，咳嗽，查体颈淋巴结肿大，心肺（一），胸片：肺门及纵隔淋巴结肿大，WBC $72 \times 10^9 / L$ ，结核菌素试验（1：10000）48小时观察（+++），诊断应首先考虑 B

A、淋巴肉瘤

B、胸内淋巴结结核

C、支气管肺癌

D、淋巴细胞白血病

E、肺结节病

6、男性，50岁，因发热、咳脓痰3个月余，一直给予抗感染治疗，但临床症状缓解不明显。胸片和胸部CT发现左下肺非偏心性空洞病变，内有少量液平。6小时前突然大咯血1600ml左右。以下哪项处理最合适 C

A、即刻作纤维支气管镜检查，确定出血部位

B、胸部CT扫描

C、在抢救同时请胸外科急会诊

D、反复痰培养确定病原，如细菌、真菌等

E、反复痰找瘤细胞

7、女性，45岁，突发右上腹及心窝部刀割样绞痛伴阵发性加剧1天，发病后12小时寒战、高热，巩膜黄染，剑突偏右侧深压痛，右上腹轻度肌紧张，体温 $38^{\circ}C$ ，WBC $14 \times 10^9 / L$ ，血清总胆红素 $30 \mu mol / L$ ，尿胆原（-），尿胆素（++），应诊断为 D

A、溃疡玻璃孔

B、急性胰腺炎

C、急性胆囊炎

D、胆总管结石

E、急性阑尾炎

8、复发或转移性宫颈癌姑息二线有效药物不包括以下哪项： C

A、贝伐单抗

- B、多西紫杉醇
- C、卡培他滨
- D、伊立替康
- E、脂质体阿霉素

9、59岁，女，肺源性心脏病，呼吸衰竭。心率154次/分，有多发房性早搏，血气分析， $PaO_2 55\text{mmHg}$ ， $PaCO_2 75\text{mmHg}$ ， $pH 7.19$ ，最重要纠正心律失常的措施是 E

- A、普萘洛尔
- B、维拉帕米
- C、胺碘酮
- D、毛花苷丙
- E、5%碳酸氢钠

10、小儿呼吸衰竭的诊断标准为 E

- A、 $PaO_2 < 50\text{mmHg}$ ， $PaCO_2 > 50\text{mmHg}$ ， $SaO_2 < 80\%$
- B、 $PaO_2 < 60\text{mmHg}$ ， $PaCO_2 > 45\text{mmHg}$ ， $SaO_2 < 91\%$
- C、 $PaO_2 < 50\text{mmHg}$ ， $PaCO_2 > 60\text{mmHg}$ ， $SaO_2 < 85\%$
- D、 $PaO_2 < 50\text{mmHg}$ ， $PaCO_2 > 50\text{mmHg}$ ， $SaO_2 < 91\%$
- E、 $PaO_2 < 50\text{mmHg}$ ， $PaCO_2 > 50\text{mmHg}$ ， $SaO_2 < 85\%$

11、自Hesselbach三角向外突出的疝称为 B

- A、股疝
- B、腹股沟直疝
- C、腹股沟斜疝
- D、脐疝
- E、混合疝

12、患者，男性，66岁，咳嗽，听诊右侧呼吸音减低。最有可能的选择是 D

- A、右侧液气胸
- B、右侧肺大泡
- C、右侧气胸

D、右侧胸腔积液

E、支气管扩张并感染

13、女，18岁。低热、腹痛、腹泻伴腹胀2个月。体查：腹壁揉面感，腹部移动性浊音阳性。腹水为渗出液。为明确诊断，下列哪项检查最有价值 C

A、血培养

B、结核菌素试验

C、腹膜活检

D、腹水细菌培养

E、血沉

14、下列不属于十二指肠球部溃疡并发症的是 C

A、急性穿孔

B、幽门梗阻

C、癌变

D、出血

E、慢性穿孔

15、B型超声(BUS)对哪种结石诊断准确率高 A

A、胆囊结石

B、胆总管结石

C、肾结石

D、肝内胆管结石

E、胰腺结石

16、怀疑胰腺癌首选的检查方法是 B

A、MRI

B、B超检查

C、CT

D、X线气钡双重造影

E、胃镜

17、胃癌最常见的转移部位 A

- A、左锁骨上(Virvow)淋巴结
- B、直肠前窝(Douglaspouch)
- C、肝
- D、腋下淋巴结
- E、肺

18、某慢性肺源性心脏病病人，因轻度上感有咳嗽咳痰，入院时神志清楚，自主体位，轻度发绀，入院时检查血气为 pH7.19，PaCO₂59mmHg，HCO₃⁻41mmol / L，按此血气应诊断 E

- A、慢性失代偿性呼吸性酸中毒
- B、呼吸性酸中毒+代谢性酸中毒
- C、慢性呼吸性酸中毒（代偿期）
- D、失代偿性代谢性酸中毒
- E、此血气可能有错误，应复查

19、胃溃疡最常见的位置是 E

- A、胃前壁
- B、胃后壁
- C、胃大弯及胃底
- D、贲门部
- E、胃窦小弯侧

20、最有助于自身免疫性胃炎诊断的实验室检查是 A

- A、血壁细胞抗体检测
- B、血胃蛋白酶原定量
- C、胃液中胃蛋白酶定量
- D、胃酸测定
- E、血清胃泌素测定

21、男性，60岁，既往高血压6~7年，2年前，曾患脑血栓，现仍有左肢体瘫痪，

两天前突然大咯血，今日 2 小时内咯血约 500ml，下列哪种药属于用药禁忌证 C

- A、止血芳酸
- B、安络血
- C、垂体后叶素
- D、2%普鲁卡因
- E、鱼精蛋白

22、下列不属于特殊型胃癌的是 E

- A、未分化癌
- B、鳞状细胞癌
- C、腺鳞癌
- D、类癌
- E、印戒细胞癌

23、胃食管反流病的主要发病机制不包括 A

- A、夜间胃酸分泌过多
- B、下食管括约肌压力降低
- C、异常的下食管括约肌一过性松弛
- D、胃排空异常
- E、食管酸廓清能力下降

24、患者 56 岁，直肠癌，距肛门 5cm，未侵出浆膜，经病理检查回报病理类型为腺癌，应选择哪种治疗 C

- A、Hartmann 手术
- B、Dixon 手术
- C、M 订 es 手术
- D、保留肛门，直肠癌切除，腹壁造瘘
- E、姑息乙状结肠造瘘术

25、女，38 岁。突发上腹剧痛 4 小时入院。既往有胃痛史。体检：呼吸较快，双肺呼吸音略粗糙，心率 108 次 / 分，上腹部压痛，腹肌紧张，肠鸣音弱。WBC 12×10^9

/L, N0.85, L0.15。胸部平片所示：膈下可见游离气体。可能的诊断是 C

- A、大叶性肺炎
- B、急性胰腺炎
- C、消化性溃疡合并急性穿孔
- D、下壁心肌梗死
- E、胃癌

26、急性昏迷病人，轻度黄疸，双侧，肢体肌张力对称性增高，瞳孔等大，尿蛋白及糖定性均阴性，下列哪项最可能 A

- A、肝性昏迷
- B、脑血管意外
- C、安眠药中毒
- D、尿毒症
- E、糖尿病昏迷

27、关于肝硬化食管静脉曲张破裂出血内科治疗，不正确的是 B

- A、普萘洛尔口服或硝酸甘油舌下含服
- B、吗啡镇静
- C、神经垂体素
- D、输新鲜血
- E、内镜下注射硬化剂

28、腹部损伤行腹腔穿刺抽得不凝血液，应考虑诊断为 B

- A、空腔脏器破裂
- B、实质脏器破裂
- C、后腹膜血肿
- D、误穿入腹腔血管
- E、前腹壁血肿

29、男性，20岁，反复气喘、咳嗽、咳少量白色黏痰15年，近2天气喘加剧，张口呼吸，大汗淋漓。查体：BP90 / 60mmHg，口唇发绀，双肺叩诊呈过清音，听诊双

肺可闻呼气相满布哮鸣音，心率 120 次 / 分。须立即采用的是哪一项措施 C

- A、吸入色甘酸二钠
- B、注射抗生素
- C、给氧并解除支气管痉挛
- D、补液并纠正酸中毒
- E、立即给予祛痰剂

30、以下支持结核性胸腔积液诊断的是 E

- A、胸水白蛋白 / 血清白蛋白 < 0.5
- B、黎氏试验阴性
- C、胸水细胞分类以中性粒细胞为主
- D、胸水细胞计数有核细胞为 $50 \times 10^6 / L$
- E、胸水 ADA $> 45U / L$

31、患者，男性，36 岁，咳嗽多日，伴发热。最有可能的选择是 A

- A、两肺小叶性肺炎
- B、肺不张
- C、肺大泡
- D、气胸
- E、纵隔气肿

32、腹股沟管内环体表投影的部位应在 D

- A、腹股沟韧带中点
- B、耻骨结节外侧
- C、肿块隆起最明显处
- D、腹股沟韧带中点上方 2 厘米
- E、髂前上棘的内侧

33、关于膀胱癌的治疗，下列哪项是错误的 B

- A、分化较好(G1、G2)的表浅性膀胱癌，肿瘤 $< 2cm$ ，首选经尿道膀胱肿瘤切除术
- B、分化较好(G1、G2)的表浅性膀胱癌，肿瘤 $< 0.5cm$ ，首选膀胱灌注治疗

- C、表浅性膀胱癌术后应行膀胱内灌注治疗降低膀胱癌的复发率
- D、浸润性膀胱癌的治疗以外科开放性手术为主
- E、膀胱颈部或三角区的浸润性癌首选全膀胱切除术+尿流改道手术

34、男，56岁。间断咳嗽、咳痰3年余。偶有痰中带血，经反复抗感染治疗效果欠佳，下肺纹理呈垂柳样改变。该患者最可能的诊断是 E

- A、克雷伯杆菌肺炎
- B、支气管扩张
- C、支气管炎
- D、干酪性肺炎
- E、肺结核

35、下列除哪条外均与胰岛细胞瘤有因果关系 D

- A、精神病发作
- B、精神的衰退
- C、肥胖
- D、库欣（Cushing）综合征
- E、发作性低血糖

36、女性，32岁，阵发性上腹痛2年，夜间加重，疼痛有季节性，冬季明显，有反酸，为进一步确诊。首选检查方法是 A

- A、X线钡餐检查
- B、CT检查
- C、胃液细胞学检查
- D、胃液分析
- E、B超

37、食管癌切除术后并发乳糜胸是术中损伤了 B

- A、奇静脉
- B、胸导管
- C、迷走神经

D、支气管

E、心包

38、男性，65岁，慢性咳嗽已20多年。有肺气肿征，1周来咳嗽加重，黄痰不易咳出，气促加重，血气分析：pH7.31，PaO₂50mmHg，PaCO₂60mmHg，如何改善缺氧

A、立即吸入高浓度氧

B、间歇吸入纯氧

C、呼气末正压呼吸

D、持续低浓度给氧

E、立即用双氧水，静脉内给氧

39、平素体健的患者发生急性II型呼吸衰竭时的血气特点中，不正确的是

A、pH迅速下降

B、pH下降和PaCO₂的升高呈线性关系

C、由于肾不能迅速代偿，HCO₃⁻不应该发生大的变化

D、PaCO₂迅速增加，使得机体的碱储备迅速下降

E、PaO₂（肺泡氧分压）的下降和PaCO₂的上升呈线性关系

40、肝硬化患者发生原发性腹膜炎的原因是

A、抵抗力降低

B、脾功能亢进

C、肝脏合成白蛋白的能力降低

D、腹水形成

E、肠道屏障作用减弱，下消化道细菌经淋巴系统进入腹腔

41、女性，63岁，经常在冬季和季节转变时咳嗽，咳痰史8年，近3年来活动时气急，近2天因受凉咳嗽，气急加重，咳黄痰，双肺散在干、湿性啰音，心率100次/分，下列哪项治疗措施是最重要的

A、持续低流量吸氧

B、使用氨茶碱等平喘药

C、选用氨溴索等祛痰药

D、超声雾化吸入

E、选用有效抗菌药

42、判断慢性胃炎是否属活动性的病理依据是 E

A、幽门螺杆菌感染的程度

B、黏膜糜烂的程度

C、脓性分泌物的多少

D、黏膜充血水肿的程度

E、黏膜有无中性粒细胞浸润

43、肺癌在较大支气管内长大后常出现 C

A、大咯血

B、痰量增多

C、刺激性咳嗽

D、上腔静脉阻塞

E、声音嘶哑

44、女，46岁。突发性右侧肢体无力，伴头痛、呕吐，排黑便3次。有高血压和糖尿病病史4年。黑便的原因很可能是 D

A、食管癌

B、胃癌

C、胃溃疡

D、急性胃黏膜病变

E、胃黏膜脱垂

45、下列哪项临床表现对诊断骨髓瘤最有价值 C

A、50岁以上的男性

B、全身性疼痛

C、尿中出现本周蛋白

D、进行性贫血

E、血清钙及球蛋白升高

46、女性，34岁，上腹痛72小时，右下腹痛12小时，体温37.8℃，术前诊断急性阑尾炎行手术治疗，术中发现阑尾外观无明显异常，右髂窝内有淡黄色混浊液。应考虑原发病为 E

- A、急性盆腔炎
- B、原发性腹膜炎
- C、阑尾黏膜化脓
- D、右侧尿路结石
- E、十二指肠球溃疡穿孔

47、腹部损伤行腹腔穿刺抽得不凝血液，应考虑诊断为 B

- A、空腔脏器破裂
- B、实质脏器破裂
- C、后腹膜血肿
- D、误穿入腹跨血管
- E、前腹壁血肿

48、既往身体健康的成年人，社区获得性肺炎的常见病原不包括 A

- A、铜绿假单胞菌
- B、肺炎支原体
- C、肺炎衣原体
- D、流感嗜血杆菌
- E、肺炎链球菌

49、患者，女，50岁。进油腻饮食后发生持续性上腹痛48小时。血淀粉酶升高。对判断其病情严重程度最有意义的检查是 A

- A、血钙
- B、血脂肪酶
- C、血胆红素
- D、血钠
- E、尿淀粉酶

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/436100115154010151>