

2021-2022 年护师类之护师（初级）精选试题及答案

一

单选题（共 85 题）

1、患者，女，48 岁，2 年来月经期不规则，持续时间长，经量增加，咨询避孕措施，应指导其选用（ ）。

- A. 阴茎套
- B. 长效避孕针
- C. 宫内节育器
- D. 安全期避孕
- E. 短效口服避孕药

【答案】 A

2、护士准备配制 1%苯扎溴铵溶液。现有 5%苯扎溴铵 10ml，欲加蒸馏水的容量是

- A. 150ml
- B. 250ml
- C. 360ml
- D. 490ml
- E. 550ml

【答案】 D

3、支气管扩张患者在施行体位引流时，错误的护理是

- A. 引流在晚间睡前进行
- B. 根据病变部位选择体位

- C. 引流时鼓励患者深呼吸
- D. 引流时间每次 30 分钟以上
- E. 引流完毕后给予漱口

【答案】 D

4、颅内高压三主征是（ ）。

- A. 头痛、呕吐、视神经乳头水肿
- B. 呕吐、视神经乳头水肿、抽搐
- C. 视神经乳头水肿、抽搐、昏迷
- D. 抽搐、昏迷、头痛
- E. 昏迷、头痛、呕吐

【答案】 A

5、患者，男，32 岁，因头痛经常服用止痛剂近 2 年。近日上腹部不适，昨日白天突然呕血约 200ml。此时应首选

- A. 急诊内镜检查
- B. 吞棉线试验
- C. X 线钡餐检查
- D. B 超检查
- E. CT 检查

【答案】 A

6、平时活动，走路即感觉呼吸困难，属于呼吸困难的类型是

- A. 轻度呼吸困难

- B. 中度呼吸困难
- C. 重度呼吸困难
- D. 混合性呼吸困难
- E. 呼气性呼吸困难

【答案】 B

7、可导致皮下气肿的损伤是

- A. 单跟单处肋骨骨折
- B. 张力性气胸
- C. 多根多处肋骨骨折
- D. 开放性肋骨骨折
- E. 血气胸

【答案】 B

8、下面哪个属于晶体溶液？（ ）

- A. 右旋糖酐
- B. 山梨醇
- C. 乳酸钠
- D. 高浓度葡萄糖
- E. 复方氨基酸

【答案】 C

9、高血压脑病的紧急处理中最关键的措施是

- A. 稳定情绪

- B. 制动，头高足低位
- C. 合理膳食
- D. 给予脱水剂，减轻脑水肿
- E. 迅速降低血压

【答案】 D

10、不属于胎盘分泌的激素是

- A. 雌激素
- B. 雄激素
- C. 孕激素
- D. 绒毛膜促性腺激素
- E. 胎盘生乳素

【答案】 B

11、以下有关新生儿败血症的临床表现，错误的是

- A. 产后感染最多见，发生在产后 3 天内
- B. 表现无特异性
- C. 可合并坏死性小肠炎、骨髓炎
- D. 可出现全身中毒症状
- E. 未成熟儿可表现为体温不升

【答案】 A

12、关于甲亢患者术后的护理措施，错误的是

- A. 患者血压平稳后取半卧位

- B. 床旁备气管切开包
- C. 指导患者深呼吸、有效咳嗽
- D. 可直接给予微温流质饮食
- E. 继续服用复方碘化钾溶液

【答案】 D

13、患者，女性，32岁。停经48天，阴道淋漓出血7天，今日突发下腹痛，并伴恶心，呕吐而就诊。检查体温36.7℃，脉搏120/min，血压11/7kPa(80/50mmHg)，尿绒毛膜促性腺激素(HCG)测定(+)，内诊后穹隆饱满，宫颈举痛明显，子宫未检清，右侧宫旁触到触痛明显包块。

- A. 宫外孕
- B. 不全流产
- C. 阑尾炎
- D. 黄体破裂
- E. 卵巢囊肿破裂

【答案】 A

14、患者男，30岁。患“化脓性扁桃体炎”，医嘱青霉素皮试，护士在做青霉素皮试后约五分钟，患者突感胸闷，面色苍白，出冷汗，脉细速，血压下降，呼之不应。

- A. 异丙肾上腺素
- B. 肾上腺素
- C. 地塞米松
- D. 多巴胺
- E. 去甲肾上腺素

【答案】 B

15、损伤性血胸患者胸腔内积血不凝固的原因

- A. 出血量太大
- B. 胸腔内存在抗凝物质
- C. 凝血因子减少
- D. 肺及膈肌的去纤维化作用
- E. 胸腔内渗出液的稀释作用

【答案】 D

16、新生儿体液分布的特点是

- A. 细胞内液较婴儿高
- B. 血浆比例较高
- C. 液体总量占体重百分比较低
- D. 间质液比例较高
- E. 细胞外液占体重百分比较低

【答案】 D

17、慢性粒细胞白血病

- A. 硫酸亚铁
- B. 糖皮质激素
- C. 雄激素
- D. 白消安（马利兰）
- E. 苯丁酸氮芥

【答案】 D

18、属于肿瘤二级预防的措施是（ ）。

- A. 环境保护
- B. 积极治疗癌前病变
- C. 手术
- D. 放疗
- E. 化疗

【答案】 B

19、女性，50岁，因内痔住院，拟行手术治疗，经检查发现直肠后正中位有一痔核，在截石位是（ ）。

- A. 2点
- B. 3点
- C. 6点
- D. 7点
- E. 11点

【答案】 C

20、葡萄胎

- A. 大量绒毛膜促性腺激素刺激卵巢颗粒细胞及卵泡膜细胞形成
- B. 妊娠后胎盘绒毛滋养细胞增生，绒毛呈水泡状
- C. 卵巢黄体直径超过3cm以上者
- D. 侵蚀性葡萄胎阴道转移症状
- E. 葡萄胎组织侵入子宫肌层或转移至子宫以外者

【答案】 B

21、王女士，65岁，近半个月来阴道流黄水样分泌物，有时带血，经检查排除恶性肿瘤。下列哪种诊断可能性较大

- A. 滴虫性阴道炎
- B. 老年性阴道炎
- C. 宫颈糜烂
- D. 宫颈息肉
- E. 子宫内膜炎

【答案】 B

22、“三凹征”产生的主要原因为

- A. 上呼吸道阻塞
- B. 下呼吸道阻塞
- C. 混合性呼吸道阻塞
- D. 弥漫性肺部阻塞
- E. 肺不张

【答案】 A

23、关于水痘的治疗原则，错误的是

- A. 发热者避免使用阿司匹林
- B. 阿昔洛韦宜在发病后48小时应用
- C. 给予人血丙种球蛋白可缩短病程
- D. 可用维生素B

E. 尽快减量或停用正在应用的激素

【答案】 B

24、原发型肺结核是

A. 结核菌初次进入机体

B. 结核菌侵入肺动脉

C. 结核菌侵入淋巴管

D. 结核菌侵入脑膜

E. 机体对结核菌的主要代谢产物敏感

【答案】 A

25、患儿男，1岁。因腹泻引起脱水需静脉补液，每250ml葡萄糖溶液中加10%氯化钾溶液，最多不得超过的量是

A. 6ml

B. 6.5ml

C. 7ml

D. 7.5ml

E. 8ml

【答案】 D

26、患儿，2岁，高热、咳嗽，伴疱疹性结膜炎和结节性红斑，有结核病密切接触史，疑为急性粟粒型肺结核，拟行结核菌素试验。结核菌素试验反应结果显示局部硬结平均直径为16mm，应记录为

A. (-)

B. (+)

- C. (++)
- D. (+++)
- E. (++++)

【答案】 C

27、预测直肠癌预后及监测复发的免疫学检查是

- A. 甲胎蛋白(AFP)测定
- B. 癌胚抗原(CEA)测定
- C. 糖链抗原 199(CA199)测定
- D. 神经元特异性烯醇化酶(NSE)测定
- E. 链抗原 242(CA242)测定

【答案】 B

28、急性肾炎伴高血压脑病时应立即

- A. 肌注苯巴比妥
- B. 静注呋塞米
- C. 肌注利血平（利舍平）
- D. 静点硝普钠
- E. 静注 20%甘露醇

【答案】 D

29、关于石膏固定后的护理要点，下面哪项不正确

- A. 适当抬高患肢
- B. 观察肢体远端血液循环

- C. 疼痛时，及时给予止痛剂
- D. 石膏未干时，用手指扶托，以防大面积压痕
- E. 可进行肌舒缩活动及固定外的关节伸屈活动

【答案】 D

30、卵巢因素导致不孕的根本原因是（ ）。

- A. 不排卵
- B. 多囊卵巢
- C. 卵裂异常
- D. 影响受精
- E. 精卵结合异常

【答案】 A

31、大多数新生儿最早出现生理性黄疸的时间是（ ）。

- A. 出生后 1~2 天
- B. 出生后 2~3 天
- C. 出生后 4~5 天
- D. 出生后 5~7 天
- E. 出生后 7~9 天

【答案】 B

32、确诊慢性胃炎的主要依据是

- A. 消化道症状
- B. 上腹部轻压痛

- C. 粪便隐血试验阳性
- D. 纤维胃镜检查
- E. 胃肠 X 线钡剂检查

【答案】 D

33、葡萄胎患者清宫术前需要特别准备的物品是

- A. 配血备用
- B. 抢救器械
- C. 大号吸管
- D. 缩宫素
- E. 抢救药品

【答案】 A

34、急性化脓性腹膜炎主要症状是（ ）。

- A. 持续腹痛，剧烈腹痛
- B. 恶心，呕吐
- C. 体温升高，脉搏增快
- D. 腹膜紧张
- E. 板状腹

【答案】 A

35、患者男，15 岁。阑尾穿孔，腹膜炎。腹部手术后 6 天，T39℃，伤口无红肿，有呃逆。最可能发生了

- A. 膈下脓肿

- B. 盆腔脓肿
- C. 肠间脓肿
- D. 肺脓肿
- E. 胸膜腔积液

【答案】 A

36、患儿女，15个月，发热、腹泻1天，尿少半天，院外补液治疗，护士对患儿家长的用药指导正确的是服用

- A. 温开水
- B. 生理盐水
- C. 葡萄糖溶液
- D. 口服补液盐
- E. 2:1等张含钠液

【答案】 D

37、风湿热心脏炎严重时需绝对卧床

- A. 1周
- B. 2周
- C. 4周
- D. 8周
- E. 12周

【答案】 C

38、下列关于小儿急性颅内压增高的临床表现中，错误的是

- A. 早期头痛明显
- B. 呕吐频繁，多呈喷射性
- C. 早期血压升高，继而脉率减慢
- D. 1岁以内的婴儿可出现前囟膨隆、头围增长过快
- E. 可出现复视或斜视、眼球运动障碍

【答案】 A

39、患者，30岁，有机磷农药中毒入院，发生急性肺水肿，最有效的药物是

- A. 吗啡
- B. 地高辛
- C. 氨茶碱
- D. 阿托品
- E. 呋塞米

【答案】 D

40、麦氏点的体表投影是

- A. 脐与右髂前上棘连线中外1/3交界处
- B. 脐与右髂前上棘连线内1/3交界处
- C. 脐与左髂前上棘连线中外1/3交界处
- D. 脐与左髂嵴连线中外1/3交界处
- E. 脐与右髂嵴连线中外1/3交界处

【答案】 A

41、女性生殖功能最旺盛，卵巢周期排卵应处于

- A. 青春期
- B. 性成熟期
- C. 围绝经期
- D. 老年期
- E. 儿童期

【答案】 B

42、脑震荡的病理解剖改变是

- A. 脑挫伤
- B. 无明显的器质性改变
- C. 脑组织明显水肿
- D. 脑组织萎缩
- E. 脑组织内出血

【答案】 B

43、患者，57岁，绝经4年。近1周来白带增多，色黄，偶有出血。外阴灼热感，阴道检查黏膜皱襞消失，有小出血点，宫颈光滑，宫体小，附件(-)，最大可能是

- A. 宫颈癌
- B. 子宫内膜癌
- C. 老年性阴道炎
- D. 外阴炎
- E. 滴虫性阴道炎

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/436114055031010044>