

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

急诊科出科试题

考试时间：90 分钟 考试范围：xxxxx

题号	一	二	三	总分
满分	40	40	20	100
得分				
核分人				

△注意事项：

- 1.填写答题卡请使用 2B 铅笔填涂
- 2.提前 5 分钟收答题卡

一、单 5 选 1 (本大题共 40 小题，共 40 分。题下选项可能多个正确，只能选择其中最佳的一项)

1.急性持续性腹痛，阵发性加剧并伴休克情况下，最可能的是：

- A. 输尿管结石肾绞痛
- B. 单纯性机械性肠梗阻
- C. 急性阑尾炎



D. 绞窄性肠梗阻

E. 胆管蛔虫病

2.急性心肌梗死急性期要慎用洋地黄的原因是:

A. 减慢心率

B. 降低血压使组织灌注不足

C. 加重肺淤血，使缺氧更明显

D. 增加心肌耗氧，加重心肌缺氧

E. 增加心室壁张力，使心肌收缩力增加

3.大咯血窒息患者体位引流取

A. 半坐卧位

B. 平卧位

C. 健侧平卧位

D. 患侧平卧位

E. 患侧卧位、头低、脚高

4.纠正呼吸性酸中毒，最主要的措施是:

A. 输碱性溶液

B. 纠正电解质紊乱

C. 改善通气

D. 使用脱水剂

E. 以上都不是

5.关于休克的叙述中，下列哪项是错误的

A. 休克的本质是血压下降

B. 休克时机体有效循环血量急剧减少



- C. 休克时脑动脉和冠状动脉收缩不明显
- D. 休克时肾血流量减少、肾小球滤过率降低
- E. 休克抑制期微循环的病理改变是毛细血管容积增大

6.急性颅内压增高，有脑疝征像时，应立即使用的最佳药物是：

- A. 25%山梨醇 B. 20%甘露醇 C. 50%葡萄糖
- D. 50%甘油 E. 激素

7.心肌坏死的心电图特征性表现是：

- A. ST 段水平型下降 B. 病理性 Q 波 C. T 波低平
- D. 冠状 T 波 E. ST 段抬高呈弓背向上型

8.帕金森病的主要原因是：

- A. 脑干网状结构胆碱能系统受损
- B. 脑桥蓝斑去甲肾上腺素能系统受损
- C. 低位脑干 5 羟色胺能系统受损
- D. 中脑黑质多巴胺能系统受损
- E. 纹状体 GABA 能系统受损

9.关于电击伤的叙述哪项不正确

- A. 高频交流电危害性较低频交流电为大



- B. 交流电的危害性较直流电为大
- C. 电流引起肌肉强烈收缩
- D. 电击伤引起心室颤动
- E. 电击伤累及脑干，呼吸、心跳迅速停止

10.室性心动过速心电图诊断的最主要依据是：

- A. QRS 波群形态宽大畸形
- B. 心室率 100 ~ 200 次/分
- C. 心室律稍微不规则
- D. 心室夺获和室性融合波
- E. 房室分离，房率 > 室率

11.关于流感病毒的致病性，不正确的是：

- A. 甲型流感病毒的表面抗原易发生变异
- B. 甲型流感病毒的核蛋白易发生变异
- C. 流感病毒通过空气飞沫传播
- D. 流感病毒一般不引起病毒血症
- E. 某些型别的禽流感病毒可传染给人

12.男性，66 岁。1 周来短暂意识障碍发作 3 次来诊，拟诊为阿-斯综合征。下列哪项心律失常最易引起此征



- A. 心房纤颤
- B. Ⅲ度房室传导阻滞
- C. 左前分支阻滞合并右束支阻滞
- D. 阵发性室上性心动过速
- E. 二度 I 型房室传导阻滞

13. 头部外伤后，最常扪及皮下波动的是：

- A. 皮下血肿
- B. 帽状腱膜下血肿
- C. 骨膜下血肿
- D. 皮下积液
- E. 皮下积脓

14. 病人被自行车撞伤右膝外侧，拍片证实为腓骨小头骨折，检查发现踝关节不能主动背伸，可能并发：

- A. 坐骨神经损伤
- B. 胫神经损伤
- C. 腓神经损伤
- D. 胫前肌撕裂伤
- E. 腓骨长短肌撕裂伤

15. 中枢病变可表现为：

- A. 传导性聋
- B. 感音性聋
- C. 神经性聋
- D. 混合性聋
- E. 中枢性聋

16. 匀称体形正常人肝叩诊相对浊音界，哪项是错误的：

- A. 右锁骨中线第 5 肋间
- B. 右锁骨中线上、下径为 9-11cm



- C. 右腋中线第 8 肋间
- D. 右肩胛线第 10 肋骨水平
- E. 肝绝对浊音界比相对浊音界低 1-2 肋间

17. 诊断腹腔内脏损伤最有价值的方法是

- A. 超声波检查
- B. 腹腔穿刺腹腔灌洗术
- C. 腹部压痛
- D. X 线检查
- E. 同位素检查

18. 毒蛇咬伤后易致失血性休克的最常见毒蛇是:

- A. 金环蛇 B. 蝮蛇 C. 五步蛇
- D. 眼镜蛇 E. 海蛇

19. 张力性气胸急救:

- A. 面罩吸氧 B. 加压包扎 C. 胸外按压
- D. 粗针头排气 E. 气管插管

20. 急性骨髓炎，骨膜下穿刺抽出脓液后。采取主要措施是:

- A. 联合应用大剂量有效抗生素



- B. 用清热解毒中药治疗
- C. 骨皮质开窗引流
- D. 局部石膏托固定
- E. 降温补液，少量多次输血

21. 头皮血肿的处理原则，正确的是

- A. 均需切开引流
- B. 均需用穿刺抽除积血加压包扎
- C. 采用局部适当加压包扎
- D. 巨大头皮血肿易引起中线移位故脱水治疗
- E. 均需静脉输血抗休克

22. ALI/ARDS 血气分析典型的改变为

- A. PaO₂ 升高，pH 升高
- B. PaO₂ 降低，pH 降低
- C. PaO₂ 降低，pH 升高
- D. PaO₂ 升高，pH 降低
- E. 以上均不对

23. 抢救一氧化碳中毒首要措施为

- A. 冬眠疗法
- B. 撤离中毒环境
- C. 应用脱水剂
- D. 应用利尿剂
- E. 应用呼吸兴奋剂

24. 自发性气胸的临床特点，以下哪项是对的



- A. 胸痛
- B. 呼吸困难
- C. 刺激性干咳
- D. 胸廓膨隆，运动减弱
- E. 以上都是

25.判断口对口人工呼吸法是否正确主要依据

- A. 吹入时阻力的大小
- B. 胸廓是否扩张
- C. 瞳孔是否缩小
- D. 口唇紫绀是否有改善
- E. 心跳是否改善

26.下列情况属于发热的是:

- A. 甲状腺功能亢进引起的体温升高
- B. 先天性汗腺缺乏引起的体温升高
- C. 妊娠期出现的体温升高
- D. 环境高温引起的体温升高
- E. 抗原抗体复合物引起的体温升高



27.男，60岁，主诉粘液血便，大便变细，钡灌肠显示直肠和乙状结肠充盈缺损，管腔不规则变窄，应考虑：

- A. 溃疡性结肠炎 B. 阿米巴结肠炎 C. Crohn 病
D. 结肠癌 E. 肠结核

28.癫痫病灶部位在 γ CBF 显像的阳性表现为：

- A. 发作期和发作间期均见局部放射性增高
B. 发作期和发作间期均见局部放射性减低
C. 发作期局部放射性减低，发作间期局部放射性增高
D. 发作期局部放射性增高，发作间期放射性减低
E. 发作期和发作间期均无放射性改变

29.女性，20岁。反复发作喘息、呼吸困难、咳嗽2年。体检：双肺散在哮鸣音，心脏无异常。有助于明确诊断的检查结果是：

- A. 最大呼气流量显著降低
B. 一秒钟用力呼气容积下降
C. 最大呼气中段流量下降
D. 支气管舒张试验阳性
E. X线胸片显示肺纹理稍多

30.下列患者对氧疗效果最好的是：



- A. 氰化物中毒
- B. 心力衰竭
- C. 一氧化碳中毒
- D. 外呼吸功能障碍
- E. 室间隔缺损伴有肺动脉狭窄

31. 髌关节后脱位的典型畸形是髌关节：

- A. 屈曲，内收，内旋 B. 屈曲，内收，外旋 C. 屈曲，外展，内旋
- D. 屈曲，外展，外旋 E. 屈曲，外旋

32. 胃十二指肠溃疡大出血宜行：

- A. 胃大部切除术
- B. 三腔二囊管压迫止血
- C. 贲门周围血管离断术+脾切除
- D. 肝叶切除术
- E. 肝总动脉结扎术

33. 最可能发生晕厥的心脏瓣膜病是：

- A. 二尖瓣狭窄 B. 主动脉瓣狭窄 C. 肺动脉瓣狭窄
- D. 二尖瓣关闭不全 E. 主动脉瓣关闭不全



34.对诊断消化性溃疡穿孔最有价值的临床表现是：

- A. 突发上腹部剧痛 B. 腹式呼吸消失 C. 上腹部压痛明显
D. 上腹部有反跳痛 E. 肝浊音界消失

35.患者，男性，18岁。1型糖尿病患者，2天前中断胰岛素后出现昏迷，血糖420mg/dl(23mmol/L)，经抢救并静脉滴注碳酸氢钠后血糖下降，神志好转，酸中毒减轻，但不久又进入昏迷，其最可能的原因是

- A. 并发脑水肿 B. 并发低血糖 C. 并发脑血管意外
D. 并发乳酸酸中毒 E. 并发肾衰竭

36.男，45岁。有高血压史。因阵发性心悸2天来诊。体检：血压120/70mmHg 心率180次/分，律齐，心音正常，无杂音。1分钟后心率降至80次/分，律齐。30秒后又回复至180次/分。最可能的诊断是：

- A. 窦性心动过速
B. 阵发性心房颤动
C. 阵发性室上性心动过速
D. 阵发性心房扑动
E. 三度房室传导阻滞

37.下列哪种属甲类传染病:

- A. 霍乱 B. 艾滋病 C. 梅毒
D. 炭疽 E. 麻疹



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/438066000141006033>