

# 风湿免疫科出科理论考试

## 一、单项选择题

1. 类风湿关节炎的早期临床表现 ( )

**A. 关节肿痛**

B. 晨僵

C. 关节畸形

D. 类风湿结节

2. 治疗系统性红斑狼疮的药物是 ( )

A. 氯丙嗪

B. 避孕药

**C. 泼尼松**

D. 胍苯哒嗪

3. 血中尿酸水平的正常值是 ( )

A. 男性 $<380\mu\text{mol/L}$ ，女性 $<350\mu\text{mol/L}$

B. 男性 $<460\mu\text{mol/L}$ ，女性 $<380\mu\text{mol/L}$

**C. 男性 $<420\mu\text{mol/L}$ ，女性 $<360\mu\text{mol/L}$**

D. 男性 $<440\mu\text{mol/L}$ ，女性 $<370\mu\text{mol/L}$

4. 强直性脊柱炎的病程发展是从身体的哪个部位开始 ( )

**A 骶髂关节**

B 腰椎

C 胸椎

D 四肢关节

5.对系统性红斑狼疮患者不正确的健康指导是（ ）

**A、须终身治疗**

B、避免皮肤直接阳光照射

C、忌用可能诱发本病的药物

D、患者妊娠期不能使用糖皮质激素

6.不属于类风湿关节炎的临床特征的是（ ）

A、近端指间关节肿胀

**B、远端指间关节肿胀**

C、掌指关节肿胀

D、腕关节肿胀

7. 痛风最易累及的关节是（ ）

A、膝关节

B、肘关节

**C、第一跖趾关节**

D、踝关节

8. 痛风的特征性损害是（ ）

**A、痛风石**

B、急性关节炎

C、痛风性肾病

D、尿酸性尿路结石

9.患者下肢近端肌肉无力，蹲下后站立困难，平卧时下肢可抬高并抗部分阻力，请问该患者下肢肌力为

( )

A、1级

B、2级

C、3级

**D、4级**

10. 类风湿关节炎最为特异性的抗体 ( )

**A、CCP**

B、RF

C、ds-DNA

D、SSA

11.类风湿关节炎病理特征性改变是 ( )

A、类风湿结节

B、苏木紫小体

C、洋葱皮样改变

**D 滑膜炎**

12. 最有助于确定类风湿关节炎诊断的辅助检查是 ( ) \*

A.抗核抗体

B.血沉

C.血C反应蛋白

**D.影像学**

E.血抗链球菌溶血"O"测定

13.早期强直性脊柱炎会出现哪种症状 ( ) \*

A、四肢关节畸形

B、高烧

**C、臀区疼痛**

D、脊柱侧弯

14. 患者男，19岁，反复左踝关节肿痛1年，偶有晨起背部不适，查HLA-B27阳性，最可能诊断为

( ) \*

A . 类风湿关节炎

B . 痛风

C . 银屑病关节炎

**D . 强直性脊柱炎**

E . 骨性关节炎

15.女，29岁，发热、面部红斑、关节肿痛1个月，如果诊断为系统性红斑狼疮，下列哪一种抗体的阳性率可能最高 答案: \*

性率可能最高 答案: \*

**A.抗核抗体**

B.抗 ds-DNA 抗体

C.抗 Sm 抗体

D.抗 RNP 抗体

E.抗 SS-A 或抗 SS-B 抗体

16.控制类风湿关节炎病情发展，缓解病情治疗的最佳药物是 答案: \*

A.强的松

B.地塞米松

C.柳氮磺吡啶

**D.甲氨蝶呤**

E.环磷酰胺

17.下列哪一种是 SLE 的标记性抗体? 答案: \*

A.ANA

B.抗单链 DNA 抗体

**C.抗双链 DNA 抗体**

D.抗 SSA 抗体

E.抗 RNP 抗体

18.女性,47岁,双手指近端指间关节和掌指关节对称性肿痛已2个月,ESR:42mm/h,CRP:100mg/L,

WBC: $8.2 \times 10^9$ /L, Hb:110g/L, RF(-), 该患者最可能诊断是 答案: \*

A.强直性脊柱炎

B.骨关节炎

C.风湿热

**D.类风湿关节炎**

E.系统性红斑狼疮

19.SLE 患者最典型的面部皮疹表现: 答案: \*

A.痤疮

B.色素沉着

C.紫癜

**D.蝶形红斑**

E.湿疹

20.关于非甾体抗炎药的不正确说法是:

A.具有消炎止痛作用

**B.可以控制病情**

C.抑制环氧酶 COX 的作用

D.减少前列腺素的产生

E.部分可以引起胃肠道出血

21.女,16岁,双下肢浮肿、面部皮疹1个月,诊断为系统性红斑狼疮,问下列哪一种抗体的特异性最高

答案: \*

A.抗核抗体

B.抗着丝点抗体

**C.抗 Sm 抗体**

D.抗 RNP 抗体

E.抗 SS-A 或抗 SS-B 抗体

22. AS 最基本的病理改变是 ( ) \*

A.滑膜炎

**B.附着点炎**

C.关节软骨变性

D.中、小血管炎

E.关节腔炎症

23.痛风的危害表现在会引起疾病的发生但不包括下列哪项? ( )【单选】 \*

**A.哮喘**

B.关节破坏

C.脑血管意外

D.冠心病

24.下列哪项不属于痛风急性期临床表现。( )【单选】 \*

A.关节红肿

B.关节炎

**C.关节结节、变形**

D.关节疼痛

25.下列食物中嘌呤含量最高的是( )【单选】 \*

**A.牛肝**

B.牛舌

C.牛肉

D.牛奶

### 三、多选题

1.系统性红斑狼疮的疾病特点是(ABCDE)

A. 临床表现多样化

B. 女性多见

C. 累及多器官

D. 大多病程迁延，病情反复发作

E. 累及多系统

2.. 系统性红斑狼疮病情活动的可能诱因包括( )

**妊娠**

**食用芹菜**

**日光暴晒**

**病毒感染**

**严重心理压力**

3. 类风湿关节炎患者常见的手部畸形有 ( )

**纽扣花样畸形**

**天鹅颈样畸形**

**掌指关节半脱位**

**关节纤维性强直**

**尺侧偏斜**

4. 风湿性疾病的临床特点 ( )

**以血管或结缔组织慢性炎症的病理改变为基础**

**呈发作与缓解相交替的慢性过程**

**同一疾病的临床表现具有差异性**

**免疫学异常或生化改变**

**治疗效果有较大的个体差异性**

5. 干燥综合征病人的健康教育包括 ( )

**保持口腔清洁，勤漱口，减少龋齿和口腔继发感染的可能**

**停止吸烟，饮酒**

**做好眼部护理，保持角膜避免受损害**

**定期门诊随访**

6. 白塞病系统治疗可选择 ( ) \*



- A. 泼尼松
- B. 秋水仙碱
- C. 沙利度胺
- D. 氨苯砞
- E. 吲哚美辛

7.白塞病心脏受累可出现 ( ) \*

- A. 心包积液
- B. 房室传导阻滞
- C. 主动脉瓣关闭不全
- D. 心肌梗死
- E. 二尖瓣狭窄和关闭不全

8.以下关于白塞病哪些正确 ( ) \*

- A. 神经系统病变
- B. 血管炎
- C. 游走性关节炎
- D. 虹膜睫状体炎
- E. 生殖器溃疡

9.关于白塞病神经系统病变表现正确的是 ( ) \*

- A. MRI 对本病的诊断不如 CT 灵敏
- B. 患者多急性起病
- C. 约 77%患者经治疗病情缓解，仍留有后遗症
- D. 神经系统病变的复发率 和死亡率都很高

E.据症状可分为脑膜脑炎，脑干损害，良性颅内压增高

10.白塞病关节炎的表现（ ） \*

**A. 你膝关节受累最常见**

**B.X 线可出现关节骨面有穿凿样破坏**

**C.当个关节或少数关节的疼痛肿胀 或活动受限**

**D.大多表现为一过性关节疼痛 ，可反复发作并自限**

E.大多数有关节畸形。

## B

1.皮炎典型的皮疹为（ ） [单选题] \*

A.面部蝶形红斑

B.各关节周围红斑

**C.面、颈、前胸上部弥漫性红斑√**

D.背部盘形红斑

E.全身各部位皮疹

2.类风湿关节炎最常累及的关节是（ ） [单选题] \*

A.肘关节

B.膝关节

**C.四肢小关节√**

D.脊柱小关节

E.肩关节

3.系统性红斑狼疮肌肉与关节受累表现主要为（ ） [单选题] \*

A.关节畸形

B.关节附近肌肉萎缩

C.关节肿痛✓

D.天鹅颈样畸形

E.梭状指

4.类风湿关节炎最基本的病理改变是( ) [单选题] \*

A.免疫反应

B.关节畸形

C.骨质破坏

D.滑膜炎✓

E.补体激活

5.急性痛风性关节炎期下床活动指征是关节肿痛缓解，缓解时间( ) [单选题] \*

A.24h

B.48h

C.72h✓

D.96h

E.120h

6.关于类风湿关节炎，下列关节症状中，可提示病变处于活动期的是( ) [单选题] \*

A.小关节受累

B.大关节受累

C.关节僵硬畸形

D.晨僵✓

E.关节肿大

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/438102014025006033>