

呼吸与危重症医学二科 规培 人员出科理论考试

您的姓名： 填空题] *

1. 大咯血窒息首要的抢救措施是单选题] *

清除呼吸道内积血(正确答案)

机械通气

手术止血

高压氧

2. 当前控制哮喘发作最有效的药物是单选题] *

糖皮质激素(正确答案)

茶碱类

色甘酸钠

磺胺类

3. 支气管哮喘的典型表现为单选题] *

混合型呼吸困难

吸气性呼吸困难

发作性呼气性呼吸困难(正确答案)

合并性呼吸困难

4. 病室最适宜的相对湿度为 单选题] *

10%-20%

30%-40%

50%-60% (正确答案)

70%-80%

5. 一次吸痰时间不超过（）秒 [单选题] *

10

20

15 (正确答案)

12

6. 成人静脉留置针留置的时间为 [单选题] *

2-3 天

3-4 天 (正确答案)

4-5 天

7 天

7. 急性肺水肿的痰液是 [单选题] *

白色泡沫痰

铁锈色痰

黄色粘痰

粉红色泡沫痰 (正确答案)

8. 肺结核传染的主要途径和方式是 [单选题] *

消化道

吸入病人排出的带菌飞沫 (正确答案)

血液传播

母婴传播

9. I 型呼吸衰竭患者应选用 [单选题] *

低浓度持续给养(正确答案)

高压给养

高浓度给氧

乙醇湿化给氧

10. 仰卧位最容易发生压疮的是 革选题] *

肩胛部

骶尾部(正确答案)

肘部

足跟前

11. 成年人安置胃管的长度是 革选题] *

40-50

45-55 (正确答案)

35-45

50-60

12. 肌肉注射应选择髂前上棘与尾骨两点连线的 革选题] *

外上 1/4

外上 1/2(正确答案)

外上 1/3

中点处

13. 抽取动脉血气分析标本时应注意革选题] *

清晨空腹采集

止血带应扎于穿刺点上方 5cm 处

寻找粗直的静脉进针

穿刺毕用无菌纱布或棉球加压按压 5-10 分钟(正确答案)

14. 为患者测量血压时，四定是 [单选题] *定时间

定部位

定体位

定血压计

以上均是(正确答案)

15. 细菌性肺炎最为常见，其最常见的病原菌是[单选题] *

肺炎链球菌(正确答案)

金黄色葡萄球菌

铜绿假单胞菌

支原体

16. 以下是呼吸中枢兴奋药的是 [单选题] *

洛贝林(正确答案)

氨茶碱

多巴胺

洋地黄

17. 与肺癌发病关系最密切的因素是[单选题] *

生活不规律

特异性感染

长期吸烟(正确答案)

大气污染

18. 如果再次使用同一批号青霉素治疗，免做过敏试验要求间断时间不超过[单选题] *

1 天

2 天

3 天(正确答案)

4 天

19. 血氧饱和度监测报警低限设置为革选题] *

85%

90%正确答案)

95%

88%

20. 禁忌使用管喂饮食的病人是 革选题] *

昏迷病人

腔手术病人

食管狭窄病人

食管下段静脉曲张病人正确答案)

21. 成人 24 小时尿量少于 4ml 称为 单选题] *

少尿正确答案)

尿闭

尿潴留

排尿困难

22. 测量呼吸的方法错误的是 革选题] *

成人、儿童计数 30S，得数乘以 2

测量前向病人解释取得合作正确答案)

观察病人胸腔起伏，一起一伏为一次

呼吸异常者测量 1 分钟

23. 一套无菌物品仅供一人使用是 革选题] *

节省物品

方便操作

防止交叉感染(正确答案)

防止差错

24. 低浓度吸氧，氧流量为 [革选题] *

5-6L 分

2-3L 分

1-2L 分(正确答案)

1-3L 分

25. 哮喘持续状态是指严重哮喘持续时间达 [单选题] *

6h

10h

24h (正确答案)

48h

26. 急性上呼吸道感染是指以下哪个部位的局限性炎症[革选题] *

鼻腔

鼻、咽

鼻、咽、喉(正确答案)

鼻、咽、喉、支气管

27. 抢救过敏性休克首选[革选题] *

异丙肾上腺素

盐酸肾上腺素(正确答案)

去甲肾上腺素

多巴胺

28. 导尿时以下哪一项是错误的操作 [单选题] *

严格执行无菌技术操作

导尿管粗细适宜

插管时动作轻柔

膀胱高度膨胀的病员第一次放尿不少于 10ml (正确答案)

29. 无菌区的定义是 [单选题] *

经过灭菌处理而未被污染的区域 (正确答案)

经过灭菌处理的区域

灭菌处理后被污染的区域

灭菌处理后可疑污染的区域

30. 正常尿的颜色为 [单选题] *

茶色

淡黄色 (正确答案)

红色

深黄色

31. 尿失禁病人经常发生褥疮的主要原因是 [单选题] *

全身营养状态欠佳

皮肤常受潮湿刺激 (正确答案)

皮肤受机械刺激

局部组织长期受压

32. 输血前，需经（）查对。革选题] *

2人正确答案)

1人

3人

5人

33. 关于注射输液时哪种说法不对革选题] *

多种药物配伍时，只需要注意医嘱与药物是否相符合。正确答案)

凡需做过敏试验的药物，首次注射前要了解过敏试验情况

输液后再次核对姓名、年龄等、调节好输液滴速并记录，按时巡视，注意用药后反应。

配药后要核对安瓶与输液标签的药名、剂量，还要查药品质量，有无浑浊和杂质。

34. 接班者前（）分钟到科室，阅读病房交班报告本、护理记录单等，接班前发现的问题由（）负责，接班后发现的问题由（）负责。单选题] *

10，交班者，交班者

20，接班者，交班者

15，交班者，接班者正确答案)

5，交班者，交班者

35. 无菌包一经打开不超过（）单选题] *

24小时正确答案)

12小时

4小时

72小时

36. 下列不属于一级护理的患者是单选题] *

发热正确答案)

瘫痪患者

昏迷患者

病情较重，生活不能自理者

37. 病人出院时，护士送别语忌用革选题] *

注意休息

按时复诊

按时服药

再见，欢迎下次(正确答案)

38. 吸氧设施“四防”标志是*

防油(正确答案)

防火(正确答案)

防热(正确答案)

防震(正确答案)

39. 生命体征包括*

体温(正确答案)

脉搏(正确答案)

心率

呼吸(正确答案)

血压(正确答案)

氧饱和度

40. 给病人实施治疗时要做到三查八对二注意，其中三查是*

摆药后(正确答案)

配药时(正确答案)

给药治疗时(正确答案)

给药操作结束时(正确答案)

41. 三查八对二注意中二注意是*

配伍禁忌(正确答案)

药品有效期

药品质量

用药后反应(正确答案)

42. 常见的输液反应有*

发热反应(正确答案)

静脉炎(正确答案)

液体外渗(正确答案)

急性肺水肿(正确答案)

43. 呼吸系统疾病病人常见的症状体征*

咳嗽咳痰(正确答案)

呼吸困难(正确答案)

咯血(正确答案)

疼痛

44. 慢性阻塞性肺疾病的并发症有*

呼吸衰竭(正确答案)

肺源性心脏病(正确答案)

肺气肿

自发性气胸(正确答案)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/445040004222011110>