

| | | |
|--|---|--|
| <p>1[多项选择题]促排卵治疗可采用</p> <p>A.克罗米酚</p> <p>B.HMG-HCG 方案</p> <p>C.倍美力+黄体酮方案</p> <p>D.GnRH-α</p> <p>E.溴隐亭+性激素+促性腺激素</p> <p style="text-align: right;">答案:ABE</p> | <p>2[多项选择题]羊水过少的病因有</p> <p>A.胎儿先天肾缺如, 肾发育不全, 输尿管或尿道狭窄</p> <p>B.过期妊娠</p> <p>C.无脑儿、脊柱裂、脑脊膜膨出</p> <p>D.胎儿宫内发育缓慢</p> <p>E.无羊膜病变答案:ABD</p> | <p>3[多项选择题]宫颈不典型增生轻度和中度的转归是</p> <p>A.消退</p> <p>B.不变</p> <p>C.癌变</p> <p>D.重度不典型增生</p> <p>E.转化为柱状上皮答案:ABCD</p> |
| <p>2[多项选择题]以下哪些属于体腔上皮来源的卵巢肿瘤</p> <p>A.胚胎癌</p> <p>B.透明细胞瘤</p> <p>C.勃勒纳瘤</p> <p>D.纤维瘤</p> <p>E.未分化癌</p> <p style="text-align: right;">答案:BCE</p> | <p>3[多项选择题]确定子宫内膜癌治疗方法, 应根据</p> <p>A.子宫大小</p> <p>B.肌层是否被浸润</p> <p>C.颈管是否被累及</p> <p>D.癌细胞分化程度</p> <p>E.患者全身情况</p> <p style="text-align: right;">答案:ABCDE</p> | <p>4[多项选择题]对于宫颈癌诊断有帮助的检查方法</p> <p>A.宫腔镜</p> <p>B.阴道镜</p> <p>C.碘试验</p> <p>D.宫颈涂片细胞学检查</p> <p>E.宫颈活检答案:BCDE</p> |
| <p>3[多项选择题]以下哪些疾病早期即可引起绝经后子宫出血</p> <p>A.卵巢子宫内样癌</p> <p>B.卵巢颗粒细胞瘤</p> <p>C.子宫内膜腺癌</p> <p>D.子宫平滑肌肉瘤</p> <p>E.卵巢浆液性囊腺癌</p> <p style="text-align: right;">答案:BC</p> | <p>4[多项选择题]关于子宫内膜癌的诊断和治疗, 正确的选项是</p> <p>A.宫腔冲洗液对诊断有极大价值</p> <p>B.分段诊刮术对鉴别内膜癌还是颈癌帮助极大</p> <p>C.子宫镜无大价值</p> <p>D.手术治疗是首选方法</p> <p>E.晚期或复发癌患者可用雄激素治疗</p> <p style="text-align: right;">答案:BD</p> | <p>5[多项选择题]以下哪些疾病可较早表现为阴道不规则出血</p> <p>A.念珠菌阴道炎</p> <p>B.阴道癌</p> <p>C.绒癌</p> <p>D.宫颈癌</p> <p>E.子宫平滑肌肉瘤</p> <p style="text-align: right;">答案:BCD</p> |
| <p>4[多项选择题]以下哪些情况镜下可见间质浸润</p> <p>A.黏液性囊腺癌</p> <p>B.临界恶性浆液性囊腺瘤</p> <p>C.临界恶性黏液性囊腺瘤</p> <p>D.无性细胞瘤</p> <p>E.未成熟畸胎瘤</p> <p style="text-align: right;">答案:AD</p> | <p>5[多项选择题]关于孕激素治疗子宫内膜癌说法不正确的选项是</p> <p>A.适用于年轻、早期、要求保存生育功能者</p> <p>B.对晚期及复发癌患者无效</p> <p>C.因不良反响较大, 需小剂量用药</p> <p>D.对分化差, 生长快的内膜癌效果明显</p> <p>E.对孕激素受体含量较低的患者可与他莫昔芬合用</p> <p style="text-align: right;">答案:BCD</p> | <p>1[多项选择题]手术证实为子宫内膜癌Ⅰ期, 行腹主动脉旁淋巴结清扫术的依据包括</p> <p>A.侵犯肌层>1/2</p> <p>B.侵犯肌层>2/3</p> <p>C.肿瘤直径>3cm</p> <p>D.病理类型是鳞状细胞癌或 G3 的内膜样癌</p> <p>E.病理类型是透明细胞癌、黏液性癌</p> <p style="text-align: right;">答案:ABCD</p> |
| <p>5[多项选择题]关于原发性输卵管癌的病理学特点, 以下说法中不恰当的是</p> <p>A.病灶起自输卵管浆膜层</p> <p>B.多双侧发生, 好发于壶腹部</p> <p>C.镜下构造主要为腺癌</p> <p>D.早期呈结节状增大, 以后增粗似腊肠形, 外观似输卵管积水</p> <p>E.乳头型恶性度高</p> <p style="text-align: right;">答案:ABE</p> | <p>1[多项选择题]对于合体细胞及朗汉斯细胞, 以下哪些项是恰当的</p> <p>A.朗汉斯细胞是分裂生长的细胞</p> <p>B.合体细胞由朗汉斯细胞分化而来</p> <p>C.合体细胞是执行功能的细胞</p> <p>D.朗汉斯细胞分泌人胎盘生乳素</p> <p>E.朗汉斯细胞分泌绒毛膜促性腺激素</p> <p style="text-align: right;">答案:ABC</p> | <p>2[多项选择题]盆腔炎传播途径, 错误的选项是</p> <p>A.流产及产后感染主要是血行性传播</p> <p>B.结核性盆腔炎主要是沿黏膜上行性传播</p> <p>C.沙眼衣原体主要是沿黏膜上行性传播</p> <p>D.阑尾炎可通过淋巴系统蔓延到生殖系统</p> <p>E.淋球菌是通过性接触先入侵泌尿系统再蔓延到生殖系统答案:ABDE</p> |
| <p>1[多项选择题]妊娠期血液成分的变化为</p> <p>A.多种凝血因子均增加</p> | <p>2[多项选择题]胎儿在子宫内的姿势, 以下哪些是恰当的</p> | <p>3[多项选择题]盆腔结核的诊断依据有</p> |

| | | |
|---|---|---|
| <p>B. 优球蛋白溶解时间延长 C. 凝血酶原时间轻度缩短 D. 凝血时间缩短 E. 血浆纤维蛋白原比非孕时增加 40%~45%</p> <p>答案:ABC</p> | <p>A. 胎头俯屈 B. 整个胎体呈椭圆形 C. 颈部贴近胸壁 D. 脊柱直伸 E. 四肢屈曲穿插于胸腹前</p> <p>答案:ABCE</p> | <p>A. 盆腔+线摄片 B. 子宫内膜病理检查 C. 子宫输卵管碘油造影 D. 输卵管通液 E. 阴道镜检查</p> <p>答案:ABC</p> |
| <p>4[多项选择题]生殖系统结核子宫输卵管碘油造影时可见到的征象有</p> <p>A. 宫腔狭窄变形, 边缘锯齿状 B. 输卵管串珠状 C. 输卵管管腔细小、僵硬 D. 碘油进入子宫两侧或一侧静脉丛 E. 相当于盆腔淋巴结、卵巢等部位有钙化灶</p> <p>答案:ABCDE</p> | <p>5[多项选择题]腹腔镜诊断急性盆腔炎的标准有</p> <p>A. 输卵管外表明显充血 B. 输卵管壁水肿 C. 输卵管伞端或浆膜面有脓性渗出物 D. 盆腔有积液 E. 卵巢外表有囊肿</p> <p>正确答案:ABC</p> | <p>1[多项选择题]正常妊娠的辅助诊断以下哪些项是恰当的</p> <p>A. 超声显像法于妊娠第 5 周即可见妊娠环 B. 乳胶凝集抑制试验无凝集现象 C. 黄体酮试验阴性 D. 双相型根底体温高温项持续两周未降 E. 妊娠 7~8 周超声多普勒检查阳性</p> <p>正确答案:ABCD</p> |
| <p>5[多项选择题]有关生殖器结核的诊断正确描写为</p> <p>A. 胸部透视未见肺内结核灶, 不能排除生殖器结核 B. 子宫内膜病理阴性者, 可排除生殖器结核 C. 宫腔小无组织物刮出者, 不能排除生殖器结核 D. 血沉正常者不应诊断 E. 月经血培养阴性者, 亦可排除诊断</p> <p>正确答案:AC</p> | <p>1[多项选择题]下面各项哪些项与外因性不均称型胎儿宫内发育缓慢无关</p> <p>A. 属继发性生长发育不良 B. 孕早期胚胎发育正常, 正常至孕晚期才受到有害因素的影响 C. 由遗传因素引起 D. 有害因素的影响 E. 一些合并症致使胎盘功能不全</p> <p>正确答案:CD</p> | <p>2[多项选择题]关于妊娠剧吐的相关病因以下恰当的是</p> <p>A. 绒毛膜促性腺激素水平的变化 B. 黄体酮对胃肠道平滑肌的松弛作用 C. 神经系统功能不稳定, 精神紧张* D. 与胎儿的性别有关 E. 营养不良</p> <p>正确答案:AC</p> |
| <p>1[多项选择题]关于幼女性阴道炎, 正确的选项是</p> <p>A. 缺乏雌激素, 阴道上皮抵抗力低, 易受感染 B. 常见病原体为葡萄球菌、链球菌及大肠杆菌 C. 可因接触污物或异物误入阴道内引起 D. 蛲虫感染也可引起炎症 E. 高锰酸钾溶液冲洗阴道是有效的治疗</p> <p>正确答案:ABCD</p> | <p>2[多项选择题]下面哪些项是外因性均称型胎儿宫内发育缓慢的特点</p> <p>A. 常见宫内缺氧, 存在代谢不良 B. 不常见宫内缺氧, 存在代谢不良 C. 不常见宫内缺氧, 无代谢不良 D. 60% 病例脑细胞数减少 E. 新生儿常有明显的生长与智力障碍</p> <p>正确答案:BDE</p> | <p>3[多项选择题]妊娠剧吐终止妊娠的指征是</p> <p>A. 持续性黄疸 B. 病情不见好转, 体温持续在 38°C 以上 C. 心率每分钟超过 120 次 D. 精神病症及韦尼克脑病 E. 考虑到引发胎儿畸形</p> <p>正确答案:ABCD</p> |
| <p>2[多项选择题]黏液脓性急性宫颈炎主要致病菌是</p> <p>A. 葡萄球菌 B. 链球菌 C. 肠球菌 D. 淋球菌 E. 沙眼衣原体</p> <p>正确答案:DE</p> | <p>3[多项选择题]胎儿生长受限哪些情况是剖宫产指征</p> <p>A. 胎儿窘迫 B. 孕妇高危病情加剧 C. 羊水过少 D. 胎儿停顿发育 3 周以上 E. 胎儿停顿发育 2 周以上</p> <p>答案:ABCD</p> | <p>4[多项选择题]重症妊娠剧吐的临床表现有</p> <p>A. 体重减轻, 严重脱水, 营养不良 B. 每天呕吐次数达 10 次以上 C. 尿比重增加, 出现酮体甚至蛋白、管型 D. 黄疸, 肝功能异常 E. 抽搐</p> <p>正确答案:ABCD</p> |
| <p>3[多项选择题]关于急性盆腔炎描述正确的选项是</p> <p>A. 常发生于产后、宫腔内手术操作后 B. 表现下腹剧痛, 伴阴道分泌物增多 C. 可引起盆腔脓肿 D. 盆腔脓液培养诊断较宫颈管分泌物培养可</p> | <p>4[多项选择题]孕期治疗 FGR 的一般治疗原则包括</p> <p>A. 休息 B. 均衡膳食 C. 吸氧 D. 左侧卧位</p> | <p>5[多项选择题]以下哪些不属于宫外孕</p> <p>A. 输卵管妊娠 B. 卵巢妊娠 C. 腹腔妊娠 D. 宫颈妊娠 E. 子宫残角妊娠</p> |

| | | |
|---|---|---|
| <p>靠</p> <p>E.疑心脓肿破裂立即在抗感染治疗同时行剖腹探查 正确答案:ABCDE</p> | <p>E.舒喘灵口服</p> <p>正确答案:ABCD</p> | <p>正确答案:DE</p> |
| <p>4[多项选择题]以下哪些项是急性生殖器炎症后病变</p> <p>A.输卵管积水</p> <p>B.输卵管卵巢囊肿</p> <p>C.卵巢巧克力囊肿</p> <p>D.卵巢黏液性囊腺瘤</p> <p>E.慢性盆腔结缔组织炎 答案:ABE</p> | <p>5[多项选择题]关于胎膜早破, 以下正确的选项是</p> <p>A.阴道液涂片用苏丹染色见橘黄色脂肪小粒可确定为羊水</p> <p>B.阴道液 pH\geq6.5 时可考虑胎膜早破</p> <p>C.孕期达 35 周以上胎膜早破者, 可令其自然分娩</p> <p>D.假设羊水池深度\leq5 个单位可采用羊水灌注法注入羊水</p> <p>E.足月破膜 > 24 小时未临产者予催产素引产</p> <p>正确答案:ABCE</p> | <p>1[多项选择题]巨大儿经阴道分娩可能对胎儿造成以下哪些损伤</p> <p>A.锁骨骨折</p> <p>B.臂丛神经损伤</p> <p>C.颅内出血</p> <p>D.肩难产</p> <p>E.死亡 正确答案:ABCDE</p> |
| <p>2[多项选择题]临床及 B 超诊断脑积水的依据是</p> <p>A.胎头周径明显大于腹周径</p> <p>B.胎头宽大、骨质薄软, 有弹性, 囟门大, 颅缝宽</p> <p>C.颅内大局部被液性暗区占据</p> <p>D.中线飘动</p> <p>E.孕 20 周后, 脑室率〔中线至侧脑室侧壁距离 / 中线至颅骨内缘距离〕 > 0.5</p> <p>正确答案:ABCDE</p> | <p>3[多项选择题]可能发生胎盘早剥的因素包括</p> <p>A.慢性肾炎</p> <p>B.腹部撞击伤</p> <p>C.孕晚期长时间左侧卧位</p> <p>D.合并妊娠期高血压综合征</p> <p>E.宫腔压力突然降低</p> <p>正确答案:ABDE</p> | <p>4[多项选择题]预防发生人工流产吸宫手术并发症的措施有</p> <p>A.禁用带负压的吸管通过宫颈管</p> <p>B.吸宫术中出血多, 静脉或宫颈局部注射催产素后继续吸空宫腔内容物</p> <p>C.扩*宫颈不宜过速或用暴力吸宫负压应适当</p> <p>D.吸宫时注意是否吸净, 并需查吸出物中的绒毛胎儿是否平安</p> <p>E.上述都不是 正确答案:ABCD</p> |
| <p>3[多项选择题]确诊无脑儿后, 下述处理哪些项不恰当</p> <p>A.一经确诊应引产</p> <p>B.可行毁胎术</p> <p>C.出现肩难产可行剖宫产</p> <p>D.因胎头小, 不能扩*产道, 可行胎头吸引器助娩</p> <p>E.因胎头小, 不能扩*产道, 可行产钳助娩</p> <p>正确答案:CDE</p> | <p>3[多项选择题]可能发生胎盘早剥的因素包括</p> <p>A.慢性肾炎</p> <p>B.腹部撞击伤</p> <p>C.孕晚期长时间左侧卧位</p> <p>D.合并妊娠期高血压综合征</p> <p>E.宫腔压力突然降低</p> <p>正确答案:ABDE</p> | <p>5[多项选择题]骨盆入口平面, 胎头矢状缝与母体骨盆左斜位一致的胎位包括</p> <p>A.ROP</p> <p>B.ROA</p> <p>C.LOP</p> <p>D.LOA</p> <p>E.LOT</p> <p>正确答案:BC</p> |
| <p>4[多项选择题]无脑儿的特点是</p> <p>A.女胎比男胎多 4 倍</p> <p>B.是先天畸形胎儿中最常见的一种</p> <p>C.缺少头盖骨, 脑髓暴露</p> <p>D.双眼突出, 颈短</p> <p>E.伴羊水过多常早产, 不伴羊水过多常为过期产 正确答案:ABCDE</p> | <p>5[多项选择题]过期妊娠通常合并以下哪些情况</p> <p>A.羊水过多</p> <p>B.巨大胎儿</p> <p>C.巨体儿</p> <p>D.羊水过少</p> <p>E.胎盘粘连或胎盘植入 正确答案:BCD</p> | <p>1[多项选择题]胎儿镜的适应证包括</p> <p>A.排除胎儿畸形</p> <p>B.抽取脐血</p> <p>C.胎儿组织活检</p> <p>D.宫内治疗</p> <p>E.检查羊水量的多少</p> <p>正确答案:ABCD</p> |
| <p>4[多项选择题]无脑儿的特点是</p> <p>A.女胎比男胎多 4 倍</p> <p>B.是先天畸形胎儿中最常见的一种</p> <p>C.缺少头盖骨, 脑髓暴露</p> <p>D.双眼突出, 颈短</p> <p>E.伴羊水过多常早产, 不伴羊水过多常为过期产</p> | <p>1[多项选择题]外阴鳞状上皮增生手术治疗适应证为</p> <p>A.瘙痒严重者</p> <p>B.有恶变可能者</p> <p>C.已有恶变者</p> <p>D.长期药物治疗无效者</p> | <p>2[多项选择题]围婚保健的内容包括</p> <p>A.婚前医学检查</p> <p>B.婚育知识宣传</p> <p>C.维护生殖功能的正常</p> <p>D.异常情况分类指导</p> <p>E.降低孕妇死亡率</p> |

| | | |
|---|---|--|
| 产正确答案:ABCDE | E.精神紧张*而失眠者正确答案:BCD | 正确答案:ABD |
| 1[多项选择题]慢性盆腔炎的病理为 A.慢性输卵管炎 B.输卵管积脓 C.输卵管内有干酪样物 D.输卵管卵巢炎 E.慢性盆腔结缔组织炎 正确答案:ADE | 2[多项选择题]颅内动脉前干分支直接供血的部位包括 A.阴道 B.子宫 C.输卵管 D.卵巢 E.膀胱顶、膀胱颈 正确答案:ABCE | 3[多项选择题]属于治疗早产的药物包括 A.β肾上腺素受体冲动药 B.前列腺素合成酶抑制药 C.硫酸镁静脉缓慢滴注 D.钙拮抗药 E.肾上腺糖皮质激素 正确答案:ABCDE |
| 2[多项选择题]*患者, 53 岁, 绒毛化疗 1 疗程后失访, 2 个月后因子宫穿孔、大量腹腔内出血、休克急症入院。恰当的处理是 A.补充血容量和输新鲜血 B.建立有效的静脉通路, 必要时静脉切开 C.开腹探查, 全子宫切除 D.必要时行双侧髂内动脉结扎止血 E.纠正一般情况, 给予联合化疗 确答案:ABCDE | 3[多项选择题]促进母乳喂养成功的措施包括 A.对所有保健人员进展必要的技术培训 B.把母乳喂养的好处告诉所有的孕妇 C.帮助母亲在产后 1 天内让新生儿吸吮乳头 D.指导母亲如何喂奶 E.实行母婴同室 正确答案:ABCDE | 4[多项选择题]异常阴道镜图像有 A.白色上皮 B.点状构造 C.黄斑 D.镶嵌 E.异型血管 正确答案:ABDE |
| 1[多项选择题]有关女性生殖器淋巴回流, 以下哪些是正确的 A.外阴的淋巴大局部汇入腹股沟浅淋巴 B.阴皮下 1/3 淋巴汇入腹股沟浅淋巴 C.腹股沟深淋巴汇入髂淋巴 D.子宫颈淋巴汇入腹股沟深淋巴 E.子宫体淋巴汇入腰淋巴及腹股沟浅淋巴 正确答案:ABCE | 2[多项选择题]关于女性生殖器黏膜上皮, 正确的选项是 A.阴道黏膜上皮为复层鳞状上皮 B.子宫颈阴道部黏膜为复层鳞状上皮 C.子宫颈管黏膜为单层高柱状上皮 D.子宫体黏膜为柱状上皮 E.输卵管黏膜为复层高柱状上皮 正确答案:ABCD | 3[多项选择题]子宫内膜的功能层指 A.功能层靠近宫腔 B.外表 1/3 C.外表 2/3 D.外表 1/2 E.外表 2/2 正确答案:AC |
| 2[多项选择题]以下哪些检查可以反映雌激素的分泌水平 A.子宫内膜呈分泌期改变 B.宫颈黏液呈羊齿状结晶 C.根底体温出现高温象 D.阴道脱落细胞中大局部为角化细胞 E.尿雌三醇 正确答案:BDE | 3[多项选择题]甲状腺素受下丘脑-垂体的调控, 其功能有 A.有抑制卵巢功能的作用 B.有分泌垂体激素的功能 C.维持正常的月经 D.促使性腺发育成熟 E.对抗雌激素的作用 正确答案:CD | 4[多项选择题]脑积水分娩时可导致 A.梗阻必难产 B.弥散性血管内凝血 C.子宫破裂 D.生殖道瘘 E.会阴裂伤 正确答案:ACDE |
| 3[多项选择题]需行预防性化疗的葡萄胎患者有 A.年龄>40 岁 B.卵巢黄素化囊肿>6cm C.随访有困难的患者 D.血 HCG>100000U/L E.子宫体积明显大于相应孕周 正确答案:ABCDE | 4[多项选择题]围绝经期功血是由于卵巢功能减退所致, 表现为 A.雌激素分泌相对过高 B.孕激素分泌相对过高 C.雌激素分泌量锐减 D.促性腺激素水平升高 E.卵泡对垂体促性腺激素的反响性低下 正确答案:CDE | 5[多项选择题]早期妊娠的诊断依据是 A.早孕反响 B.B 型超声检查 C.胎儿心电图 D.停经 E.HegarSign 正确答案:ABDE |
| 4[多项选择题]关于黏液脓性宫颈炎说法正确的选项是 A.主要病症为阴道分泌物增多, 呈黏液脓性, 可有外阴瘙痒、腰酸及腹下区坠痛 | 5[多项选择题]出现人工流产综合反响, 应采取的措施有 A.暂停手术操作 B.加快手术速度, 尽快使妊娠物排出 | 1[多项选择题]对于子宫峡部描述恰当的是 A.在非妊娠期长约 1cm B.是子宫体与子宫颈之间最狭窄的部位 C.峡部的上端称为组织学内口 |

| | | |
|--|---|---|
| <p>B.可不伴有阴道炎</p> <p>C.常见的病原体为葡萄球菌、链球菌、肠球菌</p> <p>D.可出现月经间期出血，性交后出血</p> <p>E.治疗原则主要是针对病原体，及时、足量、规*、彻底，同时治疗性伴侣</p> <p>正确答案:ABDE</p> | <p>C.静脉注射阿托品</p> <p>D.输血输液</p> <p>E.注射宫缩剂</p> <p>正确答案:AC</p> | <p>D.峡部的下端称为解剖学内口</p> <p>E.临产后子宫下段长 7~10cm</p> <p>正确答案:ABE</p> |
| <p>5[多项选择题]初孕妇，妊娠 34 周，突然阴道大量流血，无腹痛。检查：胎位 LOA，胎心率正常，宫壁松软，胎头高浮，应考虑以下哪些可能</p> <p>A.阴道静脉曲张*破裂</p> <p>B.胎盘早期剥离</p> <p>C.前置胎盘</p> <p>D.子宫破裂</p> <p>E.先兆早产</p> <p>正确答案:AC</p> | <p>1[多项选择题]与妊娠期内胆汁淤积症相关的有</p> <p>A.不能预测的胎死宫内</p> <p>B.胎儿宫内窘迫</p> <p>C.胎膜早破</p> <p>D.自发性早产</p> <p>E.巨大胎儿</p> <p>正确答案:ABD</p> | <p>3[多项选择题]关于生殖器官与邻近器官，正确的有</p> <p>A.女性的尿道短而直，易引起泌尿系感染</p> <p>B.增大的子宫常压迫左侧的输尿管</p> <p>C.阴道前穹窿穿刺易引起膀胱损伤</p> <p>D.阑尾炎和右侧的炎可以相互影响</p> <p>E.施行子宫切除结扎子宫动脉时容易损伤输尿管</p> <p>正确答案:ACDE</p> |
| <p>1[多项选择题]过期妊娠患者的围生儿患病率和死亡率增加，最常见的死因是</p> <p>A.低血糖</p> <p>B.低血钙</p> <p>C.胎粪吸入综合征，吸入性肺炎或肺不*</p> <p>D.缺血缺氧性脑病</p> <p>E.产伤</p> <p>正确答案:CD</p> | <p>2[多项选择题]无生育能力的女性生殖器官发育异常的是</p> <p>A.阴道横膈</p> <p>B.幼稚子宫</p> <p>C.双子宫</p> <p>D.残角子宫</p> <p>E.真两性畸形</p> <p>正确答案:BE</p> | <p>3[多项选择题]关于生殖器官与邻近器官，正确的有</p> <p>A.女性的尿道短而直，易引起泌尿系感染</p> <p>B.增大的子宫常压迫左侧的输尿管</p> <p>C.阴道前穹窿穿刺易引起膀胱损伤</p> <p>D.阑尾炎和右侧的炎可以相互影响</p> <p>E.施行子宫切除结扎子宫动脉时容易损伤输尿管</p> <p>正确答案:ACDE</p> |
| <p>5[多项选择题]子宫的功能有</p> <p>A.输送精子的通道</p> <p>B.孕育胎儿的场所</p> <p>C.产生月经</p> <p>D.正常容量为 5ml</p> <p>E.为一空腔肌性器官</p> <p>正确答案:ABC</p> | <p>1[多项选择题]受精卵着床的必备条件有</p> <p>A.定位、黏着和穿透</p> <p>B.透明带必须消失</p> <p>C.囊胚滋养层分出合体滋养层细胞</p> <p>D.囊胚和子宫内膜必须同步发育并相互配合</p> <p>E.必须有足够的孕酮</p> <p>正确答案:BCDE</p> | <p>2[多项选择题]诊断妊娠活胎的方法有</p> <p>A.听到胎心音，在 120~160 次 / 分</p> <p>B.B 超检查可见胎心搏动</p> <p>C.触摸腹部可感觉有胎动</p> <p>D.测量宫高腹围均在正常*围内</p> <p>E.胎儿心电图显示较规律的图形</p> <p>正确答案:ABCE</p> |
| <p>1[多项选择题]关于围绝经期，以下哪些是不恰当的</p> <p>A.从卵巢功能开场衰退到绝经后 1 年内的时期</p> <p>B.同更年期的概念</p> <p>C.可有潮热、出汗、情绪不稳定病症</p> <p>D.不应出现抑郁等神经精神异常的病症</p> <p>E.此期短到 1~2 年，也可长到 10~20 年</p> <p>正确答案:BD</p> | <p>2[多项选择题]以下 HCG 的描述哪些是恰当的</p> <p>A.是一种糖蛋白激素</p> <p>B.是由合体滋养细胞产生</p> <p>C.至妊娠 12~14 周时血清浓度达顶峰</p> <p>D.与黄体生成激素有类似的生物活性</p> <p>E.维持黄体继续发育，成为妊娠黄体</p> <p>正确答案:ABDE</p> | <p>3[多项选择题]以下哪些是早期妊娠的正常表现</p> <p>A.停经</p> <p>B.自觉胎动</p> <p>C.早孕反响</p> <p>D.自觉腹部增大</p> <p>E.阴道流血</p> <p>正确答案:AC</p> |
| <p>2[多项选择题]下述各项哪些是正确的</p> <p>A.当卵泡成熟时，尿中孕酮量增多</p> <p>B.月经期前，黄体生成素分泌值到达顶峰</p> <p>C.月经黄体的持续时间根本上是一定的</p> <p>D.分泌期子宫内膜的功能层比基底层厚</p> | <p>3[多项选择题]由于妊娠期生理的变化，正常孕妇易患以下哪些疾病</p> <p>A.缺铁性贫血</p> <p>B.右侧急性肾盂肾炎</p> <p>C.下肢及外阴静脉曲张*</p> | <p>4[多项选择题]初孕妇，25 岁，以往月经周期规则。现停经 6 月，自觉胎动消失。检查：子宫体 4 月妊娠大小，考虑胎儿宫内死亡。可以做哪些检查进一步确诊</p> <p>A.腹部*线检查</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <p>E.分泌期子宫内膜内糖原增多 正确答案:CDE</p> | <p>D.念珠菌性阴道炎 E.子宫肌瘤 正确答案:ABCD</p> | <p>B.多普勒超声胎心检查 C.B超检查 D.胎儿心电图 E.尿 HCG 测定 正确答案:ABCD</p> |
| <p>3[多项选择题]性激素代谢过程哪些恰当 A.雄烯二酮是孕酮的前身 B.孕酮是雄烯二酮的前身 C.雄烯二酮与睾酮不是雌酮、雌二醇的前身 D.雄烯二酮与睾酮是雌酮、雌二醇的前身 E.雌激素是孕酮及睾酮的前身 正确答案:BD</p> | <p>4[多项选择题]关于胎盘的描述正确的有 A.母体面有 18~20 个胎盘小叶 B.母儿间物质交换时, 胎儿血与母体血并不直接相通 C.底蜕膜是构成胎盘的母体局部 D.叶状绒毛膜是构成胎盘的主要局部 E.羊膜有丰富的血管, 向羊膜腔供应胎儿营养 正确答案:ABCD</p> | <p>5[多项选择题]属纵产的胎方位有 A.LOA B.RMP C.LScA D.RSA E.ROP 正确答案:ABDE</p> |
| <p>4[多项选择题]以下关于雌孕激素的作用的描述, 哪些是错误的 A.雌激素使宫颈黏液分泌增加 B.雌激素抑制输卵管节律性收缩的振幅 C.雌激素使乳腺管增生 D.孕激素使宫颈黏液变稀, 拉丝度增加 E.孕激素促进乳腺腺泡发育 正确答案:BD</p> | <p>5[多项选择题]妊娠期血液系统的变化, 正确的有 A.血容量增加, 呈现生理性贫血 B.白细胞轻度升高 C.易发生缺铁性贫血 D.血液处于高凝状态 E.血沉加快 正确答案:ABCDE</p> | <p>1[多项选择题]成熟新生儿出生后 6 小时测得的临床检验值, 哪些是正常的 A.血红蛋白值约为 120g B.白细胞数 $1.6 \times 10^9/L$ C.网织红细胞 0.03%~0.07% D.血糖值 2.1mmol/L E.血清间接胆红素 13mg/dl 正确答案:BC</p> |
| <p>5[多项选择题]关于妇女围绝经期, 哪些是正确的 A.常出现月经失调 B.45 岁以前绝经称卵巢功能早衰 C.卵泡不能发育成熟及排卵 D.剩余的卵泡对垂体促性腺激素丧失反响 E.大多数妇女出现精神障碍 正确答案:ACD</p> | <p>1[多项选择题]以下哪些方法对诊断早孕有帮助 A.根底体温双相且高温相, 持续 21 天不下降 B.妊娠免疫试验 C.超声检查 D.黄体酮试验 E.尿雌三醇测定 正确答案:ABCD</p> | <p>2[多项选择题]关于正常妊娠, 下述哪些项是正确的 A.会阴皮肤色素沉着, 伸展性增大 B.单胎四步触诊时第一手法触及胎头时胎位为臀位 C.自觉胎动是妊娠确定指征 D.子宫底高度在妊娠 10 个月时为最高 E.脐带杂音是脐带异常而发生的脐带静脉血流音 正确答案:AB</p> |
| <p>3[多项选择题]下述内容, 哪些项不符合实际 A.Down 综合征--常染色体异常 B.猫叫综合征--常染色体异常 C.Tumer 综合征--女性型外阴 D.Klinefelter 综合征--女性型外阴 E.男性两性畸形--男性型外阴 正确答案:DE</p> | <p>1[多项选择题]母乳喂养问题下述哪几项是不恰当的 A.只要新生儿啼哭, 就授乳 B.母乳分泌良好时, 一次授乳时间约为 20 分钟左右 C.母乳喂养, 有时会患维生素 K 缺乏 D.出生 6 个月以后, 应考虑补充铁剂 E.母乳蛋白质含量比牛奶多 正确答案:AE</p> | <p>2[多项选择题]子宫颈内口松弛而致反复晚期流产的特点是 A.在妊娠早期出现 B.流产前阵痛明显 C.破膜后胎儿立即娩出 D.娩出新鲜、无畸形发育的正常胎儿 E.发病前常无病症 正确答案:CDE</p> |
| <p>4[多项选择题]宫底过高的原因 A.双胎妊娠 B.巨大儿 C.羊水过多 D.子宫畸形 E.孕周推算错误 正确答案:ABC</p> | <p>2[多项选择题]关于哺乳目前推荐 A.按需哺乳 B.母乳喂养 C.按时哺乳 D.产后半小时开场哺乳 E.哺乳前应用温开水擦洗乳房及乳头 正确答案:ABDE</p> | <p>3[多项选择题]阴道后穹窿穿刺可用于诊断 A.盆腔肿瘤 B.盆腔包裹性积液 C.异位妊娠 D.子宫内膜异位症 E.盆腔脓肿 正确答案:BCE</p> |
| <p>5[多项选择题]产科检查包括</p> | <p>3[多项选择题]有关产褥, 下述哪些是正确</p> | <p>4[多项选择题]关于异位妊娠的描述正确的选项</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <p>A.腹部检查 B.骨盆测量 C.阴道检查 D.肛门指诊 E.测量体重与血压 正确答案:ABCD</p> | <p>的 A.子宫体部淋巴液,也可以直接沿圆韧带流入腹股沟浅淋巴结 B.阴道动脉为髂内动脉前干分支 C.阴道下段的淋巴液首先流入髂内淋巴结 D.膀胱神经是从闭孔神经分支的 E.侧脐韧带是从髂外动脉分支的 正确答案:AB</p> | <p>是 A.输卵管壶腹部妊娠多以流产为主,一般在妊娠8-12周发病 B.卵巢妊娠少见 C.输卵管峡部妊娠发病较迟,发生率最高 D.输卵管间质部妊娠虽少见但后果严重 E.阴道排出蜕膜管型,镜检时常见到滋养细胞 正确答案:ABD</p> |
| <p>1[多项选择题]对于分娩发动的内分泌控制理论,比拟公认的是哪些项 A.血中缩宫素浓度升高 B.缩宫素受体增多 C.血中PGE和PGF增加 D.羊水中PGE及PGF增多 E.血中孕酮值显著下降 正确答案:BCD</p> | <p>4[多项选择题]有关退奶方法可选择 A.己烯雌酚5mg,每日3次,连服3天 B.甲羟孕酮10mg,每日3次,连服3天 C.溴隐亭口服 D.生麦芽煎服 E.芒硝外敷 正确答案:ACDE</p> | <p>5[多项选择题]稽留流产致严重出血的原因 A.胎盘机化与宫壁严密贴近,致刮宫困难 B.稽留时间过长,致DIC C.子宫肌对催产素不敏感 D.妊娠产物未完全刮净 E.HCG缺乏 正确答案:ABD</p> |
| <p>2[多项选择题]临产4小时,宫缩25~35秒,间隔4~5分钟,胎心140次/分,先露浮,突然破水,羊水清亮,查宫口开大1cm,以下哪些处理是恰当的 A.立即听胎心 B.记录破膜时间 C.鼓励产妇在宫缩时,运用腹压加速产程进展 D.超过12小时尚未分娩,加用抗生素 E.卧床,抬高臀部 正确答案:ABDE</p> | <p>5[多项选择题]以下哪些符合正常产褥期子宫复旧的规律 A.产后2~3天,子宫颈口可通过2指 B.产后4周时子宫颈完全恢复正常形态 C.产后10天时宫颈内口关闭 D.产后1周,宫颈外口关闭 E.产后6周子宫颈完全恢复正常形态 正确答案:ABCD</p> | <p>1[多项选择题]妊娠子痫确诊后,恰当的治疗是 A.硫酸镁解痉 B.用冬眠灵控制抽搐 C.静脉滴注甘露醇 D.静脉滴注低分子右旋糖酐 E.立即终止妊娠 正确答案:ABCD</p> |
| <p>3[多项选择题]子宫收缩力的特点包括 A.节律性 B.随意性 C.对称性 D.极性 E.缩复作用 正确答案:ACDE</p> | <p>1[多项选择题]关于HELLP综合征以下表达恰当的是 A.可根据贫血程度分为3级 B.一般并发肺水肿 C.肝酶中以乳酸脱氢酶升高最早 D.全部发病在产前 E.其发生与自身免疫机制无关 正确答案:BC</p> | <p>2[多项选择题]子痫前期重度时出现高血钾的原因 A.肾功能减退和尿量减少 B.肾上腺皮质功能亢进 C.酸中毒 D.抗利尿激素分泌增加 E.醛固酮分泌增加 正确答案:AC</p> |
| <p>3[多项选择题]重度子痫前期产妇分娩后易发生产后血循环衰竭的原因是 A.大量使用解痉药 B.大量使用降压药 C.血液浓缩 D.腹压突然下降 E.血浆内钠离子增多 正确答案:ABCD</p> | <p>3[多项选择题]先天性弓形虫的三大临床表现 A.淋巴结炎 B.脑内钙化 C.脑积水 D.视网膜脉络膜 E.弓形虫肝病 正确答案:BCD</p> | <p>4[多项选择题]软产道包括以下哪些内容 A.子宫体 B.子宫下段 C.宫颈 D.阴道 E.外阴 正确答案:BCDE</p> |
| <p>4[多项选择题]34岁孕妇,第一胎,心悸,上二楼气急2周,一周前感冒、咳嗽加重,咳白色痰,夜不能平卧。查体:半坐卧位,双颊微红, BP140/90mmHg, T37.2°C, P100次/分, R28次/分。初步应采取的措施是 A.降血压</p> | <p>4[多项选择题]晚期潜伏梅毒的传染性正确的选项是 A.性接触无传染性 B.性接触有传染性 C.感染胎儿的可能性约10% D.感染胎儿的可能性约30%</p> | <p>5[多项选择题]以下哪些情况易发生继发性宫缩乏力 A.中骨盆狭窄 B.骨盆出口平面狭窄 C.羊水过少 D.持续性枕横位</p> |

| | | |
|--|---|---|
| <p>B.吸氧 C.听胎心 D.静滴大量抗生素 E.以上都不是 正确答案:BC</p> | <p>E.不感染胎儿 正确答案:AC</p> | <p>E.持续性枕后位 正确答案:ABDE</p> |
| <p>5[多项选择题]妊娠期急性肾盂肾炎治疗原则是 A.卧床休息 B.保持每日尿量在 1500ml 以上 C.首选对革兰阳性杆菌有效同时对胎儿、新生儿无不良影响的抗生素 D.假设为无病理性菌尿, 药物治疗为 2 周一个疗程 E.假设为病理性肾盂肾炎, 药物治疗为 4 周一个疗程 正确答案:ADE</p> | <p>5[多项选择题]关于梅毒孕妇传染胎儿的可能性正确的选项是 A.早期潜伏梅毒约为 80% B.一、二期约为 100% C.晚期梅毒约为 30% D.晚期潜伏梅毒约为 10% E.晚期潜伏梅毒不会传给胎儿 正确答案:ABCD</p> | <p>1[多项选择题]脐带帆状附着的临床表现, 哪项是恰当的 A.胎心率不规则, 甚至消失 B.胎膜破裂时, 发生无痛性阴道流血 C.血涂片上可以找到有核红细胞或幼红细胞 D.胎膜破裂时, 产妇出现腹痛 E.血涂片上可以找到陈旧性红细胞 正确答案:ABC</p> |
| <p>1[多项选择题]关于孕妇感染 HIV, 下述哪项是错误的 A.可以通过母婴间垂直传播 B.可以哺乳 C.孕母在妊娠期间进展了治疗, 新生儿出生后不用服药干预 D.感染 HIV 的孕妇产前、产时、产后正规治疗可以减少其新生儿的感染率 E.新生儿出生 1 年后查血清 HIV 抗体确定是否被感染 正确答案:BC</p> | <p>1[多项选择题]下述哪些情况一般都考虑剖宫产 A.后不均倾位 B.肩先露 C.颈后位 D.臀先露, 估计胎儿体重>3600g E.完全臀先露 正确答案:BCD</p> | <p>2[多项选择题]第一胎顺产, 胎儿体重 4300g, 胎儿娩出后立即有大量阴道出血并有大量血块, 以下哪些处理是恰当的 A.立即检查有无软产道损伤 B.立即注射止血 C.立即设法娩出胎盘, 并注射宫缩剂 D.立即开放静脉, 输平衡液 E.采血作穿插配血 正确答案:ACDE</p> |
| <p>2[多项选择题]妊娠期合并巨细胞病毒感染对新生儿的影响包括 A.黄疸 B.水疱疹 C.小头症 D.巨大儿 E.听力丧失 正确答案:ACE</p> | <p>2[多项选择题]关于协调性宫缩乏力以下哪些正确 A.具有正常、宫缩的特点 B.多属继发性宫缩乏力 C.宫缩间歇子宫放松 D.胎窘出现晚 E.常见于中部、出口骨盆狭窄 正确答案:ABCDE</p> | <p>3[多项选择题]产后出血的治疗原则包括 A.立即行子宫切除术 B.针对原因迅速止血 C.补充血小板 D.补充血容量, 纠正休克 E.预防感染 正确答案:BDE</p> |
| <p>3[多项选择题]子宫收缩力的特点包括 A.节律性 B.随意性 C.对称性 D.极性 E.缩复作用 正确答案:ACDE</p> | <p>3[多项选择题]关于不协调宫缩乏力, 以下哪些正确 A.多属原发性宫缩乏力 B.宫缩间歇子宫不完全放松 C.易出现胎窘 D.多见潜伏期延长 E.宫腔压力低 正确答案:ABCD</p> | <p>4[多项选择题]以下哪些病症提示已发生子宫破裂 A.突然腹部撕裂样剧痛 B.出现病理性缩复环 C.子宫圆韧带可明显触及并压痛 D.病人发生休克 E.下降中的胎头突然消失 正确答案:ADE</p> |
| <p>1[多项选择题]产后盆腔血栓性静脉炎的临床表现有 A.常在产后 1~2 周发生 B.高热可持续数周不退 C.下腹痛向脊肋角放散 D.盆腔检查可无特殊体征 E.以上都不是 正确答案:ABCD</p> | <p>2[多项选择题]宫腔镜检查适宜哪些病 A.子宫内膜息肉 B.子宫肌瘤 C.宫内节育器嵌顿 D.异位妊娠 E.输卵管病变 正确答案:AC</p> | <p>3[多项选择题]以下符合外阴鳞状上皮增生病理改变的是 A.表皮角化过度和角化不全 B.棘细胞层规则增厚 C.上皮细胞层次排列紊乱, 极性消失 D.上皮细胞大小和核形态正常 E.上皮脚间的真皮乳头有淋巴细胞及少量浆细胞</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>2[多项选择题]李*, 阴道分娩后 15 天, 连续阴道出血伴血块 3 天而入院。入院时血压 120/80mmHg, 心率 100 次 / 分, 血红蛋白 80g/L。以下处理短时间内必要的是</p> <p>A.建立有效的静脉通道, 大量输血 B.应用缩宫素 C.抗生素防治感染 D.清宫术 E.B 超</p> <p>正确答案:BCDE</p> | <p>3[多项选择题]滴虫性阴道炎的白带特征是</p> <p>A.水样白带 B.灰黄色泡状白带 C.黄白色泡状稀薄白带 D.灰色均质腥臭白带 E.脓性白带</p> <p>正确答案:BC</p> | <p>胞浸润正确答案:ADE</p> <p>4[多项选择题]老年性生理外阴萎缩与外阴硬化性苔癣的不同在于</p> <p>A.仅见于老年妇女 B.与身体其他部位皮肤萎缩情况一样 C.外阴各层组织及皮下脂肪层均萎缩 D.大阴唇变平, 小阴唇退化 E.瘙痒病症明显</p> <p>正确答案:ABCD</p> |
| <p>3[多项选择题]产褥期抑郁症描述恰当的是</p> <p>A.产褥期精神综合征的最常见类型 B.分娩后出现的抑郁病症 C.通常在产后 2 周内出现病症 D.通常需要治疗, 包括心理治疗和药物治疗 E.通常预后良好, 多数患者 1 年内治愈, 再次妊娠, 少数复发</p> <p>正确答案:ABCDE</p> | <p>4[多项选择题]病史采集方法正确的有</p> <p>A.耐心启发患者说出真实情况 B.勿遗漏关键性病史内容 C.对危重病人应详细、全面了解病情后再予治疗 D.对外院转院者应索阅病情介绍作为重要资料 E.对不能亲自口述的危重患者可向家属了解病史</p> <p>正确答案:ABDE</p> | <p>5[多项选择题]关于外阴鳞状上皮增生的描述, 错误的选项是</p> <p>A.多见于绝经后妇女 B.瘙痒病症明显 C.主要依靠病检确诊 D.癌变率 20%左右 E.手术为主要治疗手段</p> <p>正确答案:DE</p> |
| <p>4[多项选择题]造成产褥病率的原因有</p> <p>A.乳腺炎 B.上呼吸道感染 C.泌尿系统感染 D.产褥感染 E.血栓性静脉炎</p> <p>正确答案:ABCDE</p> | <p>5[多项选择题]绝经后阴道出血, 应考虑</p> <p>A.宫颈癌 B.老年性阴道炎 C.子宫内膜癌 D.子宫肌瘤 E.输卵管癌</p> <p>正确答案:ABCE</p> | <p>1[多项选择题]临床常用的检测淋病奈瑟菌的方法有</p> <p>A.培养法 B.核酸检测 [PCR 法] C.酶联免疫吸附试验检测抗原 D.分泌物涂片革兰染色 E.血液抗体检测</p> <p>正确答案:ABD</p> |
| <p>5[多项选择题]对于产褥期抑郁症的治疗方法描述恰当的是</p> <p>A.产褥期抑郁症不需要药物治疗 B.产褥期抑郁症必须应用药物治疗 C.产褥期抑郁症可以采用药物治疗 D.产褥期抑郁症可以通过心理治疗 E.产褥期抑郁症可以通过心理治疗和药物治疗</p> <p>正确答案:CDE</p> | <p>1[多项选择题]关于外阴病变哪些是正确的</p> <p>A.外阴发白区域内皮肤光滑润泽, 弹性良好, 可能是外阴白癜风 B.外阴皮肤变白、变薄、弹性差, 可能是外阴硬化性苔癣 C.外阴皮肤苔藓样变化, 局部可见溃疡, 可能是外阴鳞化上皮增生 D.基底层含有不成熟黑色素细胞是外阴白化病 E.以上都不正确</p> <p>正确答案:ABCD</p> | <p>2[多项选择题]下述哪些是慢性盆腔炎疾患</p> <p>A.卵巢非赘生性囊肿 B.输卵管积水 C.盆腔脓肿 D.输卵管卵巢囊肿 E.慢性输卵管炎</p> <p>正确答案:BDE</p> |
| <p>1[多项选择题]宫颈活检的取材部位为</p> <p>A.复方碘不着色区 B.复方碘着色区 C.阴道镜下显示脑网样构造 D.3、6、9、12 等多点取材 E.宫颈鳞柱交界处</p> <p>正确答案:ACDE</p> | <p>2[多项选择题]以下属于外阴皮肤和黏膜上皮内非瘤样病变的是</p> <p>A.外阴硬化性苔癣 B.外阴鳞状上皮增生 C.外阴 VIN D.外阴接触性皮炎 E.外阴白癜风</p> <p>正确答案:ABDE</p> | <p>3[多项选择题]关于慢性盆腔炎, 以下哪些是正确的</p> <p>A.比急性盆腔炎多见 B.可出现急性发作 C.妇科检查见区有压痛, 增厚 D.有时不易和子宫内膜异位症相鉴别 E.常引起不孕</p> <p>正确答案:ABCDE</p> |
| <p>4[多项选择题]女性生殖器结核的临床表现有</p> <p>A.原发性不孕</p> | <p>5[多项选择题]需与卵巢肿瘤相鉴别的疾病有</p> <p>A.子宫内膜异位症 B.结核性腹膜炎</p> | <p>1[多项选择题]关于闭经溢乳综合征, 以下哪些是恰当的</p> <p>A.有垂体微腺瘤</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>B.月经稀少或闭经 C.低热, 盗汗 D.曾患过结核病或有结核病接触史 E.慢性盆腔炎久治无显著疗效 正确答案:ABCDE</p> | <p>C.肝硬化腹水 D.乙状结肠癌 E.浆膜下肌瘤 正确答案:ABCDE</p> | <p>B.PRL>25μg/L C.目前临床上首选药物是溴隐亭 D.目前临床上首选药物是氯米芬 E.目前临床上首选药物是孕激素 正确答案:ABC</p> |
| <p>5[多项选择题]女性生殖道的自然防御功能包括 A.两侧大阴唇自然合拢 B.阴道正常菌群抑制其他细菌生长 C.宫颈分泌黏液形成黏液栓 D.子宫内膜的周期性剥脱 E.输卵管纤毛向宫腔方向摆动 正确答案:ABCDE</p> | <p>1[多项选择题]疑有绒癌脑转移, 可根据哪些确诊 A.脑 CT B.脑缺血的一过性病症: 突然跌倒、头痛、抽搐、偏瘫 C.脑脊液: 血清 HCG>1: 20 D.脑部 MRI E.B 超 正确答案:ABCD</p> | <p>2[多项选择题]闭经患者未承受治疗前确定闭经的最初步骤是 A.脑 CT 检查 B.孕激素试验 C.甲状腺功能检测 D.PRL 检测 E.HCG 检测 正确答案:DE</p> |
| <p>4[多项选择题]妊娠合并卵巢肿瘤的处理哪些正确 A.早孕合并卵巢恶性肿瘤, 等分娩后再手术 B.早孕合并卵巢囊肿, 立即手术治疗 C.妊娠晚期发现卵巢肿瘤等待至足月再手术 D.早孕合并卵巢囊肿, 等待至妊娠 3 个月再进展手术 E.中孕合并卵巢恶性肿瘤等分娩后再手术 正确答案:CD</p> | <p>2[多项选择题]有关妊娠滋养细胞疾病, 以下哪些是正确的 A.侵蚀性葡萄胎具有恶性肿瘤行为, 发生在葡萄胎去除后 6 个月内 B.侵蚀性葡萄胎和绒毛膜癌对化疗均很敏感 C.子宫或子宫外转移标本的切片中, 见到绒毛构造或绒毛退变痕迹, 称绒癌 D.子宫或子宫外转移标本的切片中, 见到变性之水泡样组织为侵蚀性葡萄胎 E.妊娠滋养细胞疾病和妊娠滋养细胞肿瘤不是同一概念 正确答案:ABDE</p> | <p>3[多项选择题]胎盘部位滋养细胞肿瘤的病理特征恰当的是 A.肿瘤呈实性 B.不侵犯肌层 C.主要由中间型滋养细胞组成, 缺乏典型的细胞滋养细胞和合体滋养细胞 D.无绒毛构造 E.多数肿瘤细胞可产生人胎盘生乳素(HPL), 免疫组化可 HPL 阳性 正确答案:CD</p> |
| <p>2[多项选择题]以下哪些是卵巢良恶性肿瘤的鉴别点 A.年龄 B.病史 C.B 超 D.腹水 E.一般情况 正确答案:BCDE</p> | <p>3[多项选择题]以下哪些项是无排卵型功血的病理变化 A.子宫内膜腺囊型增生过长 B.萎缩型子宫内膜 C.极度增生过长 D.子宫内膜腺瘤样增生过长 E.增生期子宫内膜 正确答案:ABDE</p> | <p>4[多项选择题]以下哪些检查结果符合无排卵周期 A.根底体温单相型 B.出血前 1~2 天阴道涂片示雌激素影响 C.出血前 1~2 天宫颈黏液示羊齿状结晶 D.经前诊刮内膜病理切片为分泌期改变 E.月经正常 正确答案:ABC</p> |
| <p>3[多项选择题]卵巢恶性肿瘤的预后与哪些有关 A.临床期别 B.组织学类型 C.有无锁骨上淋巴结转移 D.治疗方式 E.是否生育过 正确答案:ABCDE</p> | <p>4[多项选择题]绒癌化疗以下说法哪些不恰当 A.化疗前应充分了解肝、肾功能, 严重异常者不能化疗 B.脱发常见, 停药后不恢复 C.5-FU 化疗时, 胃肠道病症主要表现为恶心、呕吐, 不出现黏膜溃疡 D.化疗期间每隔 2~3 天检查血常规, 严重的血小板减少可致颅内出血死亡 E.化疗前应常规*线片及心电图检查 正确答案:BC</p> | <p>5[多项选择题]诊断有无排卵的方法有 A.根底体温 B.宫颈黏液涂片 C.激素测定 D.诊断性刮宫 E.阴道脱落细胞涂片 正确答案:ABCDE</p> |
| <p>1[多项选择题]以下哪些属于卵巢的恶性肿瘤 A.皮样囊肿 B.颗粒细胞瘤 C.纤维瘤</p> | <p>5[多项选择题]诊断葡萄胎时应与以下疾病鉴别 A.先兆流产 B.双胎妊娠 C.羊水过多 D.异位妊娠</p> | <p>1[多项选择题]以下哪些指标与子宫内膜异位症密切相关 A.AFP B.CA125 C.CA199</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>D.卵泡膜细胞瘤 E.内胚窦瘤</p> <p>正确答案:BE</p> | <p>E.功能性子宫出血</p> <p>正确答案:ABC</p> | <p>D.HCG E.抗子宫内膜抗体</p> <p>正确答案:BE</p> |
| <p>2[多项选择题]下面哪些疾病易与子宫内膜异位症混淆</p> <p>A.卵巢癌 B.子宫肌瘤 C.子宫腺肌病 D.盆腔炎性包块 E.慢性阑尾炎</p> <p>正确答案:ACD</p> | <p>3[多项选择题]副中肾管融合障碍所致的异常</p> <p>A.单角子宫 B.双子宫 C.始基子宫 D.鞍状子宫 E.纵隔子宫</p> <p>正确答案:BDE</p> | <p>1[多项选择题]女, 31岁, 婚后2年未孕, 男方检查正常, 女方以下哪些检查及治疗是正确的</p> <p>A.立即试验性服用促排卵药 B.首先了解月经史、既往史、家族史等, 然后全面体检 C.检查同时增强体质, 增进安康 D.必须戒烟, 不酗酒, 积极治疗内科疾病 E.夫妻同时治疗</p> <p>正确答案:BCD</p> |
| <p>3[多项选择题]治疗子宫内膜异位症的药物有</p> <p>A.达那唑 B.尼尔雌醇 C.孕三烯酮 D.GnRH-α E.罗红霉素</p> <p>正确答案:ACD</p> | <p>1[多项选择题]预防膀胱与直肠膨出, 正确的选项是</p> <p>A.凡头盆不称者及早行剖宫产 B.宫口未开全时产妇不要用腹压 C.防止第二产程延长, 必要时手术助产 D.发生会阴撕裂应等1个月后修复 E.防止产后过早参加体力劳动</p> <p>正确答案:ABCE</p> | <p>2[多项选择题]哪些药物可用于诱发排卵</p> <p>A.促性腺激素 B.氯米芬 C.促性腺激素释放激素及其类似物 D.甲状腺素 E.溴隐亭</p> <p>正确答案:ABCE</p> |
| <p>4[多项选择题]关于子宫内膜异位症, 以下哪些是错误的</p> <p>A.期待疗法适用于病变轻微的无病症患者 B.短效避孕药可使异位内膜萎缩 C.达那唑疗法即为药物性卵巢切除 D.GnRH-a 为假绝经疗法 E.MT*可于术前减轻病灶的粘连</p> <p>正确答案:CDE</p> | <p>2[多项选择题]应与子宫脱垂相鉴别的疾病是</p> <p>A.膀胱膨出, 阴道壁囊肿 B.子宫内翻, 子宫黏膜下肌瘤 C.宫颈延长及宫颈肌瘤 D.尿潴留, 尿道肉阜 E.巴氏腺囊肿</p> <p>正确答案:ABC</p> | <p>3[多项选择题]输卵管通畅性的检查包括哪些手段</p> <p>A.输卵管通液试验 B.输卵管通气试验 C.*线子宫输卵管造影 D.盆腔超声检查 E.腹腔镜检查</p> <p>正确答案:ABCE</p> |
| <p>5[多项选择题]关于子宫腺肌病以下哪些项是正确的</p> <p>A.常发生于未育已婚妇女 B.进展性痛经 C.属于子宫内膜异位症的一类 D.常有经量增多, 经期延长 E.很可能恶变</p> <p>正确答案:BD</p> | <p>3[多项选择题]子宫脱垂常伴有的是</p> <p>A.阴道前后壁膨出 B.*力性尿失禁 C.阴道不规则出血 D.宫颈延长 E.子宫前移</p> <p>正确答案:ABCD</p> | <p>4[多项选择题]输卵管性不孕症的处理手段是</p> <p>A.经宫腔通液术 B.明确阻塞部位 C.经宫颈输卵管导管疏通术 D.输卵管阻塞手术复通术 E.诊断性刮宫</p> <p>正确答案:ABCD</p> |
| <p>1[多项选择题]副中肾管衍化物发育不全致生殖器畸形包括</p> <p>A.先天性无子宫 B.无阴道 C.子宫发育不良 D.输卵管发育异常 E.处女膜闭锁</p> <p>正确答案:ABCD</p> | <p>4[多项选择题]关于子宫脱垂的临床表现是</p> <p>A.Ⅰ度患者多数无病症 B.Ⅱ度患者有程度不等的腰骶痛 C.Ⅲ度患者多伴有重度前壁膨出 D.Ⅱ度患者不会有阴道壁膨出 E.绝经后子宫萎缩, 可自然回至盆腔内</p> <p>正确答案:ABC</p> | <p>1[多项选择题]依沙吖啶引产的适应证</p> <p>A.妊娠13~24周, 要求中止妊娠者 B.无急性传染性疾病及生殖器炎症者 C.子宫无瘢痕者 D.近期曾有同类引产手术史 E.有心脏病史, 但可耐受手术者</p> <p>正确答案:ABCE</p> |
| <p>2[多项选择题]正常管道形成受阻所致生殖器畸形包括</p> <p>A.阴道横膈 B.双子宫 C.宫颈闭锁</p> | <p>5[多项选择题]关于*力性尿失禁</p> <p>A.压力性尿失禁病因与阴道膨出病因不同 B.伴有重度子宫及前壁膨出时压力性失禁可以无表现 C.诊断压力性尿失禁主要依据病史和体征</p> | <p>2[多项选择题]口服避孕药的禁忌证是</p> <p>A.月经稀少 B.急、慢性肝炎 C.哺乳期 D.宫颈炎</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>D.输卵管发育异常 E.双角子宫 正确答案:AC</p> | <p>D.检查时患者取前平卧位 E.盆底肌锻炼是重要的非手术治疗手段 正确答案:BCE</p> | <p>E.血栓性疾病患者 正确答案:ABCE</p> |
| <p>3[多项选择题]放置宫内节育器的并发症正确的选项是 A.子宫穿孔, 宫内节育器异位 B.月经过多 C.宫内节育器嵌顿 D.宫颈糜烂 E.盆腔炎 正确答案:ABCE</p> | <p>4[多项选择题]以下属于孕产妇保健工作统计指标的是 A.围生儿死亡率 B.产前检查率 C.产褥感染率 D.人口出生率 E.住院率 正确答案:BE</p> | <p>4[多项选择题]腹式呼吸减弱见于 A.胸腔积液 B.男性及小儿 C.腹膜炎 D.腹水 E.腹腔内巨大肿物 正确答案:CDE</p> |
| <p>4[多项选择题]为确保输卵管结扎平安有效, 以下正确的选项是 A.神经官能症或对手术有极大顾虑者暂缓手术 B.非孕结扎在月经后 15~20 天进展 C.白带增多, 压痛, 暂缓手术 D.结扎前确认输卵管并追踪至伞端 E.人流后可立即行结扎输卵管术 正确答案:ACDE</p> | <p>1[多项选择题]下述哪些疾病可用孕激素治疗 A.闭经 B.功血 C.先兆流产 D.子宫内膜异位症 E.子宫内膜腺癌 正确答案:ABCDE</p> | <p>5[多项选择题]肾脏较易触到的是 A.游走肾 B.肾下垂 C.身材矮胖者 D.肾结石 E.身材瘦长者 正确答案:ABE</p> |
| <p>5[多项选择题]宫内节育器放置的时间可选择在 A.月经干净 3~7 天 B.药物流产不全清宫术后立即放置 C.正常产后 3 个月以上 D.剖宫产术中 E.剖宫产后半年 正确答案:AE</p> | <p>2[多项选择题]关于氯米芬的描述哪些是正确的 A.具有较强的抗雌激素作用和较弱的雌激素活性 B.低剂量氯米芬作用下丘脑, 抑制 Gn-RH 释放 C.可作用于卵巢, 增加卵泡对促性腺激素的反应 D.可治疗体内有一定雌激素水平的闭经, 无排卵型功血 E.可治疗 PCOS 及黄体功能不全所致的不孕症 正确答案:ACDE</p> | <p>1[多项选择题]可增加冠心病的危险性的物质有 A.脂蛋白 a B.总胆固醇 C.乳糜微粒 D.甘油三酯 E.低密度脂蛋白 正确答案:ABCDE</p> |
| <p>1[多项选择题]下面哪些是妇女保健工作的任务 A.做好方案生育技术指导 B.做好妇女各期保健 C.做好家庭保健 D.做好劳动保护 E.女性心理保健 正确答案:ABDE</p> | <p>1[多项选择题]可引起局限性肝肿大的是 A.脂肪肝 B.肝脓肿 C.肝囊肿 D.肝肿瘤 E.白血病 正确答案:BCD</p> | <p>2[多项选择题]高钙血症, 见于 A.肾癌 B.骨肉瘤 C.转移性骨癌 D.多发性骨髓瘤 E.原发性甲状旁腺亢 正确答案:ABCDE</p> |
| <p>2[多项选择题]关于围婚期保健, 正确的选项是 A.围绕结婚前后, 为保障双方及下一代安康即进展的保健效劳 B.主要内容为婚前医学检查, 婚前卫生指导和婚前卫生咨询 C.目的是保证安康的婚配, 防止近亲问题或遗传病患者之间的婚配或生育 D.主要是维护生殖功能的正常, 降低新生儿死亡率</p> | <p>2[多项选择题]消化性溃疡患者疼痛的特点有 A.周期性 B.节律性 C.昼重夜轻 D.长期性 E.持续性 正确答案:ABD</p> | <p>3[多项选择题]能引起血糖增高的疾病有 A.心肌梗死 B.嗜铬细胞瘤 C.糖尿病 D.甲状腺功能亢进 E.颅脑损伤 正确答案:ABCDE</p> |

| | | |
|--|--|--|
| E.有利于预防遗传性疾病的延续 正确答案:ABCE | | |
| 3[多项选择题]妇女保健工作的目的包括 A.降低孕产妇死亡率 B.促进妇女身心安康 C.降低围生儿死亡率 D.减少传染病的发生 E.控制 STD 的传播 正确答案:ABCE | 3[多项选择题]全腹膨隆见于 A.腹内积气 B.巨大卵巢囊肿 C.大量腹水 D.足月妊娠 E.肥胖 正确答案:ABCDE | 4[多项选择题]对功能性低血糖描述,正确的选项是 A.服糖后血糖峰值在正常*围内 B.空腹血糖正常 C.服糖后 2~3h 可发生低血糖 D.空腹血糖低于正常 E.尿糖出现阳性 正确答案:ABC |

单项选择题

| | | |
|--|---|---|
| 1 成功妊娠所必备的根本条件是 A、输卵管通畅,使精子和卵子能够结合 B、安康的精子 C、成熟的卵子 D、子宫内膜与受精卵发育同步 E、以上都是正确答案: E | 6、对于受精卵不恰当的是 A、经桑葚胚发育为晚期囊胚 B、在输卵管运送期间分裂成桑葚胚 C、依靠输卵管蠕动和纤毛推动被送到宫腔 D、最外层是滋养层 E、着床在子宫内膜海绵层 正确答案: E | 11、对于孕妇体内代谢改变,以下哪项恰当 A、血中胰岛素值偏低 B、根底代谢率于孕晚期增加 15%~20% C、蛋白质代谢呈负氮平衡状态 D、血脂降低 E、妊娠全过程体重约增加 10kg 正确答案: B |
| 2 对于人胎盘生乳素不恰当的是 A、由细胞滋养细胞分泌 B、至妊娠 34~36 周分泌达顶峰 C、分子量约 2.2×10 ⁴ D、为不含糖分子的单链多肽激素 E、产后迅速下降,产后 7 小时即测不出 正确答案: A | 7、对于受精卵发育与植入,恰当的是 A、精子到达输卵管与卵子相遇,顶体外膜破裂释放出顶体酶,称为精子获能 B、获能的精子穿透初级卵母细胞的透明带,为受精的开场 C、孕卵植入后蜕膜产生"早孕因子",抑制母体淋巴细胞活性 D、妊娠期的子宫内膜称为蜕膜 E、囊胚与子宫肌层间的蜕膜为真蜕膜 正确答案: D | 12、根据胎儿身长判定妊娠周数恰当的是 A、妊娠 20 周末,胎儿身长为 25cm B、妊娠 24 周末,胎儿身长为 32cm C、妊娠 28 周末,胎儿身长为 31cm D、妊娠 32 周末,胎儿身长为 33cm E、妊娠 40 周末,胎儿身长为 45cm 正确答案: A |
| 3、对于妊娠期钙、铁代谢,不恰当的是 A、妊娠期约需铁 1g,孕妇铁储藏缺乏,易发生缺铁性贫血 | 8、对于胎盘分泌的酶不恰当的是 A、缩宫素酶由合体滋养细胞产生 B、缩宫素酶为糖蛋白 | 13、宫颈黏液出现羊齿状结晶,相当于月经周期的 A、第 6~7 天 |

| | | |
|--|--|--|
| <p>B、胎儿发育需大量的钙、铁</p> <p>C、近足月胎儿体内含钙约 25g</p> <p>D、胎儿钙主要在孕末期 2 个月内积累</p> <p>E、母体缺铁时，通过胎盘运输的铁会相应减少 正确答案：E</p> | <p>C、缩宫素酶至妊娠末期达顶峰</p> <p>D、耐热性碱性磷酸酶由合体滋养细胞产生</p> <p>E、耐热性碱性磷酸酶随妊娠进展而逐渐减少</p> <p>正确答案：E</p> | <p>B、第 9~10 天</p> <p>C、第 12~13 天</p> <p>D、第 15~16 天</p> <p>E、第 18~19 天 正确答案：A</p> |
| <p>4、对于妊娠期母体的变化，哪项是恰当的</p> <p>A、垂体前叶增多，故促性腺激素分泌增多</p> <p>B、妊娠初期动脉血压增加，脉压减小</p> <p>C、孕妇心搏量随妊娠的进展而不断增加，到妊娠末期达峰值</p> <p>D、妊娠后肺活量减小，动脉血 PO 降低</p> <p>E、因受孕激素影响，输尿管增粗，蠕动减弱，尿流缓慢，加上子宫压迫，易发生肾盂肾炎 正确答案：E</p> | <p>9、对于胎盘生乳素(HPL)以下哪项是恰当的</p> <p>A、可用于促排卵</p> <p>B、是一种甾体激素</p> <p>C、随妊娠进展而增加，直至孕末期</p> <p>D、主要由朗格汉斯细胞分泌</p> <p>E、葡萄胎时 HPL 升高</p> <p>正确答案：C</p> | <p>14、构成胎盘胎儿局部是</p> <p>A、底蜕膜</p> <p>B、包蜕膜</p> <p>C、真蜕膜</p> <p>D、叶状绒毛膜</p> <p>E、滑泽绒毛膜</p> <p>正确答案：D</p> |
| <p>5、对于受精，以下哪项恰当</p> <p>A、精原核与卵原核融合，标志受精过程即将完成</p> <p>B、卵子停留在输卵管峡部等待受精</p> <p>C、精子与卵子相遇时发生顶体反响</p> <p>D、精子与卵子相遇，标志受精过程已开场</p> <p>E、精子获能的主要部位是阴道</p> <p>正确答案：C</p> | <p>10、对于胎盘生乳素，以下哪项恰当</p> <p>A、分子量约为 3.5×10</p> <p>B、是糖蛋白激素</p> <p>C、由细胞滋养细胞产生</p> <p>D、可以在孕妇血中测出</p> <p>E、母血胎盘生乳素值与胎盘大小成反比</p> <p>正确答案：D</p> | <p>15、关于雌激素的描述以下哪项是不正确的</p> <p>A、雌激素为十八碳固醇类激素</p> <p>B、雌激素来自胎盘及卵巢</p> <p>C、妊娠早期由黄体产生雌二醇和雌酮</p> <p>D、妊娠 10 周后由胎盘产生</p> <p>E、由合体滋养细胞产生</p> <p>正确答案：E</p> |

单项选择题

| | | |
|--|------------------------------------|---|
| <p>16、关于脐带，哪项是不正确的</p> <p>A、妊娠足月〔40 周末〕脐带长度一般为</p> | <p>21、关于妊娠期妇女心血管系统生理变化，不正确的选项是</p> | <p>2、对于人胎盘生乳素不恰当的是</p> <p>A、由细胞滋养细胞分泌</p> |
|--|------------------------------------|---|

| | | |
|--|---|---|
| <p>50cm</p> <p>B、脐带有两根脐动脉和一根脐静脉</p> <p>C、脐带外表由羊膜包围</p> <p>D、脐静脉的氧分压低于脐动脉</p> <p>E、脐带杂音的速率与胎心率同</p> <p>正确答案：D</p> | <p>A、心率稍增快，上楼时呼吸增快，气促</p> <p>B、叩诊心浊音界向左稍扩大</p> <p>C、心尖区肺动脉瓣区可闻及柔和吹风样收缩期杂音</p> <p>D、下肢水肿，卧床休息后不消退</p> <p>E、妊娠期收缩压无变化，舒*压轻度下降，故脉压稍增大</p> <p>正确答案：D</p> | <p>B、至妊娠 34~36 周分泌达顶峰</p> <p>C、分子量约 2.2×10</p> <p>D、为不含糖分子的单链多肽激素</p> <p>E、产后迅速下降，产后 7 小时即测不出</p> <p>正确答案：A</p> |
| <p>17、关于脐带的特征正确的选项是</p> <p>A、直径 1.5~2.5cm</p> <p>B、外表有羊膜覆盖呈灰白色</p> <p>C、有 2 条脐静脉，1 条脐动脉</p> <p>D、妊娠足月脐带长 20~40cm，平均约 30cm</p> <p>E、华通胶为含水量少，来自外胚层的胶样胚胎结缔组织</p> <p>正确答案：B</p> | <p>22、关于妊娠期母体生殖系统的变化，哪项是不正确的</p> <p>A、子宫于妊娠 12-14 周出现不规则无痛性收缩称 Bra*ton Hicks 收缩</p> <p>B、阴道黏膜增厚变软、皱褶增多伸展性增加</p> <p>C、妊娠早期可见妊娠黄体，约在孕 10 周或后其功能由胎盘取代</p> <p>D、妊娠早期乳房增大、乳头变黑易勃起</p> <p>E、近预产期时，宫颈变短，鳞柱状上皮交界处内移出现糜烂面 正确答案：E</p> | <p>3、对于妊娠期钙、铁代谢，不恰当的是</p> <p>A、妊娠期约需铁 1g，孕妇铁储藏缺乏，易发生缺铁性贫血</p> <p>B、胎儿发育需大量的钙、铁</p> <p>C、近足月胎儿体内含钙约 25g</p> <p>D、胎儿钙主要在孕末期 2 个月内积累</p> <p>E、母体缺铁时，通过胎盘运输的铁会相应减少</p> <p>正确答案：E</p> |
| <p>18、关于人绒毛膜促性腺激素(HCG)，哪项是不恰当的</p> <p>A、由绒毛膜滋养细胞分泌</p> <p>B、为一种糖蛋白激素</p> <p>C、妊娠早期分泌量增加很快，妊娠中晚期达顶峰</p> <p>D、是诊断早孕最敏感的方法之一</p> <p>E、HCG 是滋养细胞性肿瘤的标记物</p> <p>正确答案：C</p> | <p>23、关于妊娠期母体血液的变化，正确的选项是</p> <p>A、血液处于高凝状态</p> <p>B、红细胞增加多于血浆增加</p> <p>C、血浆脂质减小</p> <p>D、白细胞稍减小</p> <p>E、血浆蛋白增多</p> <p>正确答案：A</p> | <p>4、对于妊娠期母体的变化，哪项是恰当的</p> <p>A、垂体前叶增多，故促性腺激素分泌增多</p> <p>B、妊娠初期动脉血压增加，脉压减小</p> <p>C、孕妇心搏量随妊娠的进展而不断增加，到妊娠末期达峰值</p> <p>D、妊娠后肺活量减小，动脉血 PO 降低</p> <p>E、因受孕激素影响，输尿管增粗，蠕动减弱，尿流缓慢，加上子宫压迫，易发生肾盂肾炎</p> <p>正确答案：E</p> |
| <p>19、关于妊娠的生理变化，正确的选项</p> | <p>24、关于妊娠期母体循环系统的变化，以下</p> | <p>5、对于受精，以下哪项恰当</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>是</p> <p>A、血容量增加，在足月时达顶峰</p> <p>B、白细胞增加，在妊娠 30 周达顶峰</p> <p>C、由于血液稀释使纤溶酶原降低</p> <p>D、血液稀释，红细胞沉降率降低</p> <p>E、血浆白蛋白降低，主要是球蛋白减少</p> <p>为主</p> <p>正确答案：B</p> | <p>哪项是不正确的</p> <p>A、血容量至妊娠末期增加 30%~40%</p> <p>B、心率从孕早期至末期每分钟增加 10~15 次</p> <p>C、心搏出量至妊娠 32~34 周达顶峰</p> <p>D、妊娠后期心脏向左、向上、向前移位</p> <p>E、第二产程期间，心搏出量略减少</p> <p>正确答案：E</p> | <p>A、精原核与卵原核融合，标志受精过程即将完成</p> <p>B、卵子停留在输卵管峡部等待受精</p> <p>C、精子与卵子相遇时发生顶体反响</p> <p>D、精子与卵子相遇，标志受精过程已开场</p> <p>E、精子获能的主要部位是阴道</p> <p>正确答案：C</p> |
| <p>20、关于妊娠后乳房的变化，正确的选项是</p> <p>A、胎盘分泌雌激素刺激乳腺腺泡发育</p> <p>B、胎盘分泌孕激素刺激乳腺腺管发育</p> <p>C、乳腺发育只需要泌乳素的作用</p> <p>D、妊娠期直到胎儿娩出前，挤压乳房不应有乳汁流出</p> <p>E、妊娠晚期无乳汁分泌与母体雌激素、孕激素水平高有关</p> <p>正确答案：E</p> | <p>1、成功妊娠所必备的根本条件是</p> <p>A、输卵管通畅，使精子和卵子能够结合</p> <p>B、安康的精子</p> <p>C、成熟的卵子</p> <p>D、子宫内膜与受精卵发育同步</p> <p>E、以上都是</p> <p>正确答案：E</p> | <p>6、对于受精卵不恰当的是</p> <p>A、经桑葚胚发育为晚期囊胚</p> <p>B、在输卵管运送期间分裂成桑葚胚</p> <p>C、依靠输卵管蠕动和纤毛推动被送到宫腔</p> <p>D、最外层是滋养层</p> <p>E、着床在子宫内膜海绵层</p> <p>正确答案：E</p> |

单项选择题

| | | |
|---|---|--|
| <p>7、对于受精卵发育与植入，恰当的是</p> <p>A、精子到达输卵管与卵子相遇，顶体外膜破裂释放出顶体酶，称为精子获能</p> <p>B、获能的精子穿透初级卵母细胞的透明带，为受精的开场</p> <p>C、孕卵植入后蜕膜产生“早孕因子”，抑制母体淋巴细胞活性</p> <p>D、妊娠期的子宫内膜称为蜕膜</p> <p>E、囊胚与子宫肌层间的蜕膜为真蜕膜</p> <p>正确答案：D</p> | <p>12、根据胎儿身长判定妊娠周数恰当的是</p> <p>A、妊娠 20 周末，胎儿身长为 25cm</p> <p>B、妊娠 24 周末，胎儿身长为 32cm</p> <p>C、妊娠 28 周末，胎儿身长为 31cm</p> <p>D、妊娠 32 周末，胎儿身长为 33cm</p> <p>E、妊娠 40 周末，胎儿身长为 45cm</p> <p>正确答案：A</p> | <p>17、关于脐带的特征正确的选项是</p> <p>A、直径 1.5~2.5cm</p> <p>B、外表有羊膜覆盖呈灰白色</p> <p>C、有 2 条脐静脉，1 条脐动脉</p> <p>D、妊娠足月脐带长 20~40cm，平均约 30cm</p> <p>E、华通胶为含水量少，来自外胚层的胶样胚胎结缔组织</p> <p>正确答案：B</p> |
|---|---|--|

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/445111044111011212>