

肿瘤科护理 2061

考试时间：1分钟 总分：4721分

一. 单选题（共34题，每题1分）

- 1.乳腺癌多发生于()
A. 乳房内上象限 B. 乳房外上象限
C. 乳房内下象限 D. 乳房外下象限
- 2.对疑有直肠癌的病人首先应作()
A. 血常规 B. 内窥镜检查
C. 钡剂灌肠造影 D. 直肠指诊检查
- 3.对于绝望的护理对象，护士所采取下述行为中哪一项不正确()
A. 鼓励其表达自己的情感 B. 评估其是否有自杀的危险
C. 调动其自信，配合治疗 D. 谢绝家属及朋友的心理支持
- 4.诊断肿瘤最可靠和起决定作用的检查方法是()
A. X线检查 B. 内窥镜检查
C. 放射性核素检查 D. 病理检查
- 5.食管癌的典型症状()
A. 进食时梗噎 B. 进行性吞咽困难
C. 持续性胸背疼痛 D. 呛咳吸入性肺炎
- 6.宫颈癌放疗后，下面哪条为放疗晚期并发症()
A. 放射性直肠反应 B. 放射性直肠炎
C. 宫腔积脓 D. 阴道白膜反应
- 7.食管癌放疗后主要失败原因()
A. 胸内淋巴结复发 B. 局部复发
C. 血行转移 D. 胸内外淋巴结转移
- 8.恶性肿瘤特点()
A. 生长速度慢 B. 有坏死出血
C. 呈膨胀性生长 D. 不转移
- 9.病人出现愤怒和绝望的情绪反应时，下面哪项护理工作是错误的()
A. 多予关心 B. 加强观察
C. 加强护理，专人守护，防止发生意外 D. 通知家属，说服病人
- 10.软组织肉瘤最常见转移的器官为()
A. 肺 B. 肝
C. 脑 D. 骨
- 11.乳腺癌最常见的首发症状是()
A. 乳房内无痛性肿块 B. 乳房皮肤“酒窝征”
C. 局部皮肤呈“桔皮样” D. 患侧乳头红肿
- 12.支气管的播散多见于()
A. 细支气管肺泡癌 B. 食管癌
C. 肝癌 D. 乳腺癌
- 13.焦虑是心身疾病常见的哪种反应()
A. 生理 B. 情感
C. 意志 D. 行为
- 14.恶性肿瘤病人在治疗阶段遭受着哪方面的精神压力()
A. 家人的压力 B. 社会的压力

-
- C. 工作的压力 D. 诊断和治疗的压力
- 15.下列哪个不是原始情绪()
- A. 快乐 B. 恐惧
C. 悲伤 D. 应激
- 16.食管癌多数为()
- A. 腺癌 B. 未分化癌
C. 鳞状细胞癌 D. 高分化癌
- 17.以下颈部肿块中易恶变的是()
- A. 单纯性甲状腺肿 B. 甲状腺腺瘤
C. 甲状舌管囊肿 D. 慢性淋巴结炎
- 18.符合恶性肿瘤局部一般表现的是()
- A. 表面光滑 B. 界限清楚
C. 易活动 D. 晚期剧痛
- 19.气管肿瘤最早的症状()
- A. 呼吸困难 B. 哮喘
C. 嘶哑 D. 咳嗽
- 20.心理咨询的形式主要有()
- A. 门诊咨询 B. 电话咨询
C. 现场咨询 D. 专题咨询
- 21.急性放射性肺炎的早期病理改变是()
- A. 血管硬化 B. 急性渗出性炎症
C. 纤维化 D. 炎症+纤维化
- 22.口咽部的恶性淋巴瘤的好发部位()
- A. 软腭 B. 咽壁
C. 舌根 D. 扁桃体区
- 23.肿瘤定性诊断的检查是()
- A. 病理检查 B. 内镜检查
C. 磁共振 D. 放射性同位素
- 24.下列哪项不属于 A 行为类型()
- A. 行为急促 B. 易激动
C. 较强的竞争意识 D. 缺乏自信
- 25.鼻咽癌好发于哪个壁或部位()
- A. 顶壁 B. 后壁
C. 隐窝 D. 前壁
- 26.确诊胃癌最有效的检查方法是()
- A. 大便潜血试验 B. X 线钡餐检查
C. 胃脱落细胞学检查 D. 纤维内窥镜检查
- 27.胃癌的好发部位在()
- A. 胃窦部 B. 贲门部
C. 胃小弯 D. 胃体部
- 28.骨转移瘤的好发部位()
- A. 肱骨 B. 骨盆
C. 锁骨 D. 股骨
- 29.膀胱癌术后放疗中最易产生放射损伤的器官是()

-
- A. 残存膀胱 B. 直肠
C. 小肠 D. 大肠

30.大肠癌最多发生于()

- A. 直肠 B. 乙状结肠
C. 直肠乙状结肠 D. 回盲部

31.晚期恶性肿瘤病人的恐惧可表现为()

- A. 衰弱、疼痛、厌食 B. 厌食、烦躁、失眠
C. 抑制、愤怒、绝望 D. 依赖、说笑、痛苦

32.女性生殖系统最常见的恶性肿瘤是()

- A. 卵巢癌 B. 子宫肌瘤
C. 乳腺癌 D. 宫颈癌

33.下列哪项表述是独立型性格的特点()

- A. 善于交际 B. 善于思考, 即遇紧急情况也能沉着冷静地自主解决问题
C. 言语受到情绪的控制和支配 D. 存有明确的行动目标和较强的自制力

34.脑胶质瘤中最常见的类型是()

- A. 星形细胞瘤 B. 少枝胶质瘤
C. 室管膜瘤 D. 髓母细胞瘤

二. 多选题 (共 39 题, 每题 2 分)

1.晚期恶性肿瘤病人的恐惧表现为()

- A. 衰弱 B. 疼痛
C. 厌食 D. 自卑 E. 恶心

2.晚期肿瘤治疗失效, 病情恶化时病人会出现()

- A. 愤怒 B. 绝望
C. 轻生 D. 依赖 E. 乏力

3.指出哪些是具有临床意义的肾脏()

- A. 马蹄肾 B. 驼峰肾
C. 异位肾 D. 多囊肾 E. 海绵肾

4.食管癌术后并发症吻合口瘘的相关因素有()

- A. 缝合技术不佳 B. 吻合口张力过大
C. 吻合口不严密 D. 营养不良 E. 过早进食

5.护士与病人会谈时需要()

- A. 对病人有同情心、责任感 B. 尊重病人人格, 称呼得当
C. 尊重事实, 实事求是 D. 尽量少用专业词汇 E. 注意会谈内容保密

6.对患绝症的病人, 护理人员应用护理技巧支持病人()

- A. 强化依恋关系 B. 帮助个体在逆境中生长
C. 增强病人及其家属的应对能力 D. 重新制定可行的生活目标 E. 努力充实自我

7.放疗期间饮食应注意哪些()

- A. 没有饮食禁忌 B. 食高蛋白、高维生素、低脂易消化类食物
C. 食高脂食物好 D. 禁辛辣食物 E. 以上都是

8.下面哪些是食管癌中、晚期分型()

- A. 炎症型 B. 髓质型
C. 硬化型 D. 缩窄型 E. 单纯型

9.治疗性会谈过程()

- A. 计划与准备会谈阶段 B. 开始会谈

-
- C. 正式会谈 D. 结束会谈 E. 暗示会谈
10. 晚期癌症病人易感染的原因有()
- A. 血色素减少 B. 粒细胞总数减少
C. 饮食少 D. 药物治疗的影响 E. 体重减轻
11. 化疗有哪些常见并发症()
- A. 出血 B. 头痛
C. 穿孔 D. 呕吐 E. 食欲减退
12. 哪些病人不宜进行放疗()
- A. 晚期肿瘤病人并有贫血和恶液质者 B. 中期肺癌病人
C. 白细胞低于 3000/mm³ D. 鼻咽癌病人 E. 宫颈癌病人
13. 对疑病患者护士应采用()
- A. 暗示 B. 疏导
C. 解释 D. 同情 E. 友好
14. 哪项是喉癌的致病因素()
- A. 与遗传有关 B. 与讲话多有关
C. 与饮食有关 D. 与吸烟有关 E. 以上都是
15. 肿瘤病人常见的心理表现()
- A. 焦虑 B. 抑郁
C. 疑病 D. 愤怒 E. 依赖
16. 哪项是 X 刀的适应证()
- A. 不能手术或不适合手术者 B. 术后复发、残存、未控的颅内病变
C. 患者拒绝开颅手术者 D. 将 X-刀做为与手术、放疗、化疗结合的一种综合治疗手段 E. 对
心功能不全、严重高血压病人也能治疗
17. 大肠癌饮食禁忌是()
- A. 烈性酒、辛辣、刺激性食物 B. 高脂肪饮食
C. 低纤维食物 D. 腌制食物 E. 高纤维食物
18. 癌症病人心理护理的目的在于解除病人对疾病的()
- A. 紧张 B. 焦虑
C. 悲伤 D. 抑郁 E. 多疑
19. 护士在帮助病人角色适应中指导内容是()
- A. 常规指导 B. 随时指导
C. 情感性指导 D. 治疗指导 E. 生活指导
20. 以下哪项不是晚期乳癌的特征()
- A. 乳头溢液 B. 酒窝征
C. 腋窝淋巴结融合固定 D. 肿块 3cm E. 肿块表面高低不平
21. 恶性骨转移瘤的临床表现有()
- A. 无明显疼痛 B. 局部压痛
C. 血沉增快 D. 碱性磷酸酶升高 E. 一般无骨膜反应
22. 晚期癌症病人止痛药物的使用原则()
- A. 按时给药 B. 按量给药
C. 按阶梯用药 D. 联合用药 E. 交替用药
23. 支气管肺癌压迫症状为()
- A. 声音嘶哑 B. 吞咽困难
C. 膈肌麻痹 D. 上腔静脉综合征 E. 呼吸困难

-
- 24.化疗药物的副作用有()
- A. 多数化疗药物对肝脏、造血系统有损害 B. 多数病人有胃肠反应
C. 长春新碱可产生神经毒性反应 D. 更生霉素可引起口腔溃疡及脱发 E. 对泌尿系统无影响
- 25.悲哀所表现的行为有()
- A. 情感方面 B. 生理方面
C. 认识方面 D. 行为方面 E. 心理方面
- 26.肺癌主要分类()
- A. 单纯型 B. 乳头型
C. 未分化小细胞癌 D. 未分化大细胞癌 E. 腺癌
- 27.食管癌术后并发症表现有()
- A. 呼吸困难 B. 高热
C. 黄疸 D. 白细胞计数正常或减少 E. 病人上胸部叩诊鼓音
- 28.X刀的禁忌证是()
- A. 频繁发作癫痫病人 B. 对意识不清、不能配合的病人不宜进行治疗
C. 并发心功能不全的病人不宜进行治疗 D. 严重的高血压病人不宜进行治疗 E. 以上都是
- 29.放化疗患者白细胞减少时饮食怎样搭配()
- A. 高蛋白饮食 B. 高维生素饮食
C. 高纤维饮食 D. 高脂肪饮食 E. 严格消毒
- 30.食管癌晚期症状有()
- A. 持续胸背部疼痛 B. 声音嘶哑
C. 呛咳 D. 呕血 E. 恶液质
- 31.子宫颈癌的临床表现有()
- A. 阴道出血 B. 阴道排液
C. 早期即可出现疼痛 D. 多数有痛经史 E. 晚期可因宫旁组织明显浸润而出现严重持续性疼痛
- 32.对不合作病人沟通时应注意()
- A. 主动与病人沟通 B. 了解病人不合作原因
C. 使病人更好地面对现实 D. 积极配合治疗与护理 E. 强制治疗
- 33.临终关怀的宗旨()
- A. 以照护为主 B. 尊重病人的权利与尊严
C. 重视病人生存质量 D. 减少陪人 E. 以治疗为主
- 34.食管癌放疗的并发症是()
- A. 穿孔或出血 B. 放射性肺炎
C. 放射性脊髓炎 D. 放射性食管瘢痕狭窄 E. 放射性脊柱炎
- 35.乳腺癌根治术后并发症()
- A. 皮下积液 B. 皮瓣坏死
C. 患侧上肢水肿 D. 患侧上肢不能上举 E. 胸背神经损伤
- 36.抗癌蔬菜有()
- A. 包心菜 B. 菜花
C. 胡萝卜 D. 西红柿 E. 大白菜
- 37.放疗后复查的时间为()
- A. 放疗结束后1个月复查1次 B. 第1年每隔2个月复查1次
C. 第2年每隔3个月复查1次 D. 以后每隔半年复查1次 E. 放疗效果较好者,1年后可

不复查

38.宫颈癌放疗后应注意哪些()

A. 坚持阴道冲洗 B. 定期复诊

C. 复诊时根据情况决定是否补充治疗 D. 如果治疗结束后效果很好,可1年后复查 E. 外地患者可在附近医院按要求随诊,将结果寄回原来治疗单位存档

39.食管癌的早期主要临床表现()

A. 咽下梗噎感 B. 咽下困难

C. 异物感 D. 食物反流 E. 恶液质

三.是非题(共37题,每题37分)

1.在肿瘤病房中要防止愉快气氛,易刺激病人。()

A. 正确 B. 错误

2.对于焦虑的病人、护士应主动关心病人以药物治疗为主。()

A. 正确 B. 错误

3.放疗期间照射野皮肤如果出现水泡、破溃、渗出等症状,应暂停放疗。()

A. 正确 B. 错误

4.甲状腺癌晚期常因肿块增大,压迫交感神经,出现声音嘶哑。()

A. 正确 B. 错误

5.早期肿瘤的放射敏感性明显高于晚期肿瘤。()

A. 正确 B. 错误

6.食管癌病人在放疗期间可给普通饮食。()

A. 正确 B. 错误

7.肿瘤发生复发,应重点做好适当表现,疏导有方,乐观开朗的心理社会因素。()

A. 正确 B. 错误

8.放疗期间应吃高蛋白、高维生素、低脂肪易消化类食物为宜,禁辛辣食物。()

A. 正确 B. 错误

9.肿瘤病人化疗时,如白细胞低于 $3.0 \times 10^9/L$,应停止化疗。()

A. 正确 B. 错误

10.早期食管癌主要表现为进固体食物时,有轻微梗噎感,吞咽后食管内有异物感。()

A. 正确 B. 错误

11.饮食因素和心理社会因素是胃癌的多发因素。()

A. 正确 B. 错误

12.早期鼻咽癌的治疗应先采用根治性手术治疗。()

A. 正确 B. 错误

13.良性肿瘤的特点是瘤组织分化成熟。()

A. 正确 B. 错误

14.食管癌手术后最严重的并发症是吻合口狭窄。()

A. 正确 B. 错误

15.放疗期间应每周查血象一次,随时观察白细胞下降情况。()

A. 正确 B. 错误

16.食管癌病人在放疗期间如果出现胸骨后疼痛或不适、精神不振、食欲下降等反应,应立即停止放疗。()

A. 正确 B. 错误

17.社会心理肿瘤学是一个全新的学科,在肿瘤I级预防和III级预防中发挥应有的作用。

()

A. 正确 B. 错误

18.超分割放疗每天照射 2 次，其间隔时间为小于 4h。()

A. 正确 B. 错误

19.头颈部放疗病人，放疗前拔牙者，需拔牙后 10~14d 才能放疗，放疗后 1 年内不宜拔牙。()

A. 正确 B. 错误

20.对治疗缺乏信心是癌症术后病人最大的危险。()

A. 正确 B. 错误

21.肿瘤异型性反映了肿瘤组织的成熟程度。()

A. 正确 B. 错误

22.胃癌的好发部位是胃窦部。()

A. 正确 B. 错误

23.医用直线加速器的输出剂量相对较高，电子能谱好、体积小。()

A. 正确 B. 错误

24.肾母细胞瘤突出症状是腹部疼痛。()

A. 正确 B. 错误

25.患病后易产生依赖心理表现为主观症状与客观症状相符。()

A. 正确 B. 错误

26.诊断肿瘤最可靠和起决定作用的检查方法是病理检查。()

A. 正确 B. 错误

27.食管癌的好发部位在中段食管，进展期症状为进行性吞咽困难。()

A. 正确 B. 错误

28.肿瘤异型性小，说明肿瘤组织的分化程度低。()

A. 正确 B. 错误

29.肿瘤病人化疗时，如白细胞低于 $3.0 \times 10^9/L$ 时应行保护性隔离。()

A. 正确 B. 错误

30.医护与家属默契配合是做好心理护理的基础。()

A. 正确 B. 错误

31.做好心理护理，首先保证良好的护患关系。()

A. 正确 B. 错误

32.家庭外源性因素对肿瘤病人的心理支持甚至超过了家庭内源性因素。()

A. 正确 B. 错误

33.早期胃癌是指局限于黏膜和黏膜下层的胃癌。()

A. 正确 B. 错误

34.对患有抑郁的病人护理以疏导为主，控制过度激动，指出配合治疗的意义。()

A. 正确 B. 错误

35.肾母细胞瘤的突出症状是腹部肿块。()

A. 正确 B. 错误

36.食管癌多数为腺癌，主要经血行转移。()

A. 正确 B. 错误

37.对恶性肿瘤病人的心理康复方法是由单纯的言语疏导转变为言语治疗，非言语治疗及行为疗法等多种疗法。()

A. 正确 B. 错误

四. 填空题 (共 40 题, 每题 40 分)

-
- 1.医务人员应认识抑郁病人的绝望心理失调反应，及时进行_____和精神上的支持。
 - 2.胸部常见的放疗反应是_____反应和_____反应。
 - 3.食管癌的好发部位在_____，进展期症状为_____。
 - 4.冷疗的目的是：_____、_____、_____。
 - 5.病人体温在_____以上者暂停放疗。
 - 6.肿瘤是在某些_____、_____、_____等各种致癌因素的长期作用下形成的一种细胞异常增生。
 - 7.大多数抗癌药物对_____、_____、_____、_____和_____等均有不同程度的毒性。
 - 8.颈外静脉输液，最佳穿刺点在_____。
 - 9.多数病人得知患癌时会有有一个震惊时期称为_____。
 - 10.放疗期间，病人白细胞计数低于_____，应停止放疗。
 - 11.肿瘤病人化疗时，如白细胞低于_____，血小板低于_____×10⁹/L，应停止治疗，给补血药物，如白细胞低于_____，应行保护性隔离，积极预防感染。
 - 12.癌症病人在疾病的各个阶段中，以_____时的焦虑最大。
 - 13._____病人常出现倒退和信赖，需要依赖更多的照顾。
 - 14.肝癌的转移方式有_____和_____。肝外转移包括血道转移、淋巴转移和种植转移。
 - 15._____病人会产生一种脱离社会的孤寂感。
 - 16.对于癌症的早期诊断病人往往怀疑诊断报告有误，这是一种_____。
 - 17.恶性肿瘤病人负性情绪对机体的免疫系统有_____，影响对肿瘤细胞的_____，致使瘤细胞活跃，肿瘤发生和发展。
 - 18.恶性肿瘤病人化疗期间，白细胞降至 3×10⁹/L_____，处理首先应：_____。
 - 19.脊髓_____的放射耐受量为_____cGy。
 - 20.抗癌药物分_____和_____。
 - 21._____和手术、化疗称为肿瘤治疗的三大主要手段。
 - 22.肝癌的组织分型_____、_____、_____。
 - 23._____成为晚期肿瘤病人必须解决的人道主义措施。
 - 24.对恶性肿瘤本身引起的剧痛，使用止痛药难以奏效时，应采取_____止痛。
 - 25.对于终末期病人应尽可能满足其心理、生理、社会需要是对病人最好的_____。
 - 26.癌症病人止痛标准要求达到夜间_____，白天生活、活动不痛。
 - 27.肿瘤的_____是影响放疗效果的因素之一。
 - 28.食管癌术后最严重的并发症是_____。
 - 29.肿瘤的 TNM 分期法中：T 表示_____、N 表示_____、M 表示_____。
 - 30.为了防止癌细胞扩散，而在术前和术中所采取的措施称为_____。
 - 31.晚期肿瘤病人护理包括姑息性治疗、_____和对症处理。
 - 32.医务人员应教会抑郁病人监测自己的_____，树立斗争精神。
 - 33.甲状腺癌晚期常因肿块增大，压迫_____、产生声音嘶哑，如果颈交感神经受压，可出现_____。
 - 34.放疗过程中应注意保护_____的标记清晰。
 - 35.肿瘤的转移途径：_____、_____、_____。
 - 36._____是恶性肿瘤普遍存在的心理反应。
 - 37._____是对恐惧的自然反应，是多数恶性肿瘤病人在疾病过程中的体验。
 - 38.放疗反应包括全身反应、_____、_____。

39.肝癌的并发症：肝癌结节破裂出血、_____、_____、继发感染、血性胸腹水。

40.社会-心理因素是一大类疾病的危险因素，包括_____和_____两大部分。

五. 名词解释（共 34 题，每题 34 分）

- 1.靶区
- 2.否定
- 3.管内放疗
- 4.转移
- 5.根治性放疗
- 6.放射治疗
- 7.姑息性放疗
- 8.纤维肉瘤
- 9.愤怒
- 10.源皮距
- 11.肿瘤放射敏感性
- 12.化疗
- 13.心理护理
- 14.根治性化疗
- 15.完全缓解
- 16.血道转移
- 17.恐惧
- 18.诊断休克
- 19.周期特异性药物
- 20.半身阻断
- 21.种植性转
- 22.联合用药
- 23.术后放疗
- 24.照射野
- 25.抑郁
- 26.细胞增殖周期
- 27.护患关系
- 28.失望
- 29.红斑反应
- 30.肿瘤免疫治疗
- 31.姑息性化疗
- 32.淋巴道转移
- 33.紧张期
- 34.心理适应

六. 简答题（共 22 题，每题 22 分）

- 1.肿瘤化疗治疗停药指征是什么？
- 2.危重病人放疗护理有哪些？
- 3.放疗后应注意什么？
- 4.DDP 的毒性有哪些？
- 5.化疗引起血小板减少的护理？
- 6.化疗副作用有哪些？

-
- 7.食管癌一般放射反应及护理是什么?
 - 8.对癌症病人如何进行心理康复?
 - 9.何谓 X-刀?
 - 10.什么是心理治疗?
 - 11.X-刀的禁忌证?
 - 12.癌症患者的心理特征?
 - 13.化疗时药液外漏的紧急处理?
 - 14.化疗所致白细胞减少病人的护理是什么?
 - 15.化疗护理常规是什么?
 - 16.照射野皮肤应注意什么?
 - 17.癌症协会于 1973 年明确四个癌症康复目标是什么?
 - 18.食管癌放射治疗的并发症有哪些?
 - 19.X-刀的适应证?
 - 20.哪些病人不宜进行放疗?
 - 21.放疗期间的注意事项有哪些?
 - 22.晚期癌症患者的心理障碍表现在哪些方面?

正确答案:

一. 单选题

- 1.B
- 2.D
- 3.D
- 4.D
- 5.B
- 6.B
- 7.B
- 8.B
- 9.D
- 10.A
- 11.A
- 12.A
- 13.B
- 14.D
- 15.D
- 16.C
- 17.B
- 18.D
- 19.D
- 20.D
- 21.B
- 22.D
- 23.A
- 24.D
- 25.C
- 26.D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/445204010342011102>