

一、选择题

【A1 型题】

1.短暂脑缺血发作的临床表现是

- A.血压突然升高，短暂意识不清，抽搐 B.眩晕、呕吐、耳鸣，持续一至数日
C.发作性神经系统功能障碍，24 小时内完全恢复 D.昏迷、清醒、再昏迷 E.一侧轻偏瘫，历时数日渐恢复

2.椎一基底动脉系统短暂性脑缺血发作不可能出现的临床表现是

- A.失语 B.眩晕、呕吐 C.平衡障碍 D.眼震、复视 E.交叉瘫

3.颈内动脉系统短暂性脑缺血发作最常见的临床表现为

- A.对侧上肢或下肢一过性无力或轻偏瘫 B.对侧偏身感觉障碍 C.失语 D.同侧单眼失明 E.对侧偏瘫

4.椎-基底动脉系统短暂性脑缺血发作最常见的临床表现为

- A.眩晕、恶心和呕吐 B.耳鸣和耳聋 C.跌倒发作 D.吞咽困难 E.复视

5.对于脑梗死，最早能显示缺血病灶的检查是

- A. CT B. TCD C. MRA D. MRI E. 血管彩超

6.下列哪支血管闭塞最容易导致偏瘫

- A.小脑后下动脉 B.大脑中动脉 C.脊髓前动脉 D.小脑下前动脉 E.大脑前动脉

7.最易发生脑血栓形成的动脉为

- A.大脑前动脉 B.颈内动脉及大脑中动脉 C.基底动脉 D.大脑后动脉 E.椎一基底动脉

8.一侧颈内动脉闭塞可以不出现临床症状，是由于

- A.同侧颈外动脉未闭塞 B.对侧颈内动脉未闭塞 C.正常的脑底动脉环可迅速建立侧支循环 D.双侧椎动脉末端闭塞

E.颅内血管变异

9.脑血栓形成的最常见病因是

- A.高血压 B.脑动脉粥样硬化 C.各种脑动脉炎 D.血压偏低 E.红细胞增多症

10.脑血栓形成不应出现的临床表现是

- A.意识不清 B.肢体瘫痪 C 头痛 D. 癫痫发作 E.脑膜刺激征

11.大脑前动脉闭塞时出现尿失禁，是由于损害了

- A.额极 B.旁中央小叶 C.腓力氏体前 4/5 D.扣带回 E.额叶底部

12.血管闭塞后患者出现偏瘫、偏身感觉障碍及偏盲的动脉为

A.大脑前动脉主干 B.大脑中动脉主干 C.大脑后动脉主干 D.内听动脉 E.格基底动脉

13.大脑中动脉皮质支闭塞的临床特点是

A.对侧偏瘫，不伴脑神经瘫 B.以下肢为重的对侧偏瘫 C.对侧均等性轻偏瘫 D.以上肢为重的对侧偏瘫
E.对侧偏瘫，上下肢均为0级

14.可引起延髓背外侧综合征病变的血管为

A.大脑前动脉 B.大脑中动脉 C.大脑后动脉 D.椎动脉或小脑后下动脉 E.后交通动脉

15.在椎一基底动脉血栓形成的病例中，下列临床表现不正确的是

A.眩晕 B.眼球运动障碍 C.吞咽困难 D.失语 E.交叉性瘫痪

16.脑血栓形成的患者，下列哪种情况不适合溶栓治疗

A.发病3小时内 B.头颅CT证实无出血灶 C.患者无出血素质 D.出凝血时间正常 E.头颅CT出现低密度灶

17.颈内动脉系统和椎一基底动脉系统脑梗死不可能都出现的症状是

A.交叉瘫 B.脑神经瘫痪 C.瞳孔改变 D.意识障碍 E.病理反射

18.心源性脑栓塞多发生在

A.大脑前动脉 B.大脑中动脉 C.大脑后动脉 D.椎动脉 E.基底动脉

19.关于脑栓塞的临床表现不正确的是

A.起病急骤 B.多数患者年龄较轻 C.常见脑膜刺激征 D.常发生局灶性癫痫发作、偏瘫和失语 E.多患有风湿性心脏病

20.脑栓塞的治疗原则为

A.改善循环、减轻脑水肿和预防脑疝 B.预防脑栓塞再发 C.改善循环、减轻脑水肿，并治疗原发病
D.外科手术摘除栓子 E.应用抗生素，防止并发症

21.脑叶出血最常见的部位在.

A.额叶 B.叶 C.岛叶 D.枕叶 E.顶叶

22.脑出血最常见的病因为

A.脑动脉炎 B.高血压合并小动脉硬化 C.血液病 D.脑动脉瘤 E.脑血管畸形

23.脑出血的好发部位在

A.皮质下白质 B.脑桥 C.小脑 D.基底节区 E.脑室

24.关于脑出血临床表现的表述正确的是

A.多在65岁以上发病 B.均出现偏瘫 C.脑脊液为均匀一致血性 D.头颅CT显示基底节区高密度影 E.均有脑膜刺激征

25.脑出血最常见的动脉是

A.小脑齿状核动脉 B.基底动脉旁正中动脉 C.大脑中动脉豆纹动脉 D.脉络膜前动脉 E.前交通动脉

26.做头颅 CT 检查诊断脑梗死阳性率，较高的时间是

A.发病 6 小时以后 B.发病 12 小时以后 C.发病 48 小时以后 D.发病 18 小时以后 E.发病 1 周以后

27.关于脑出血最确切的诊断依据

A. 60 岁以上发病 B.均有偏瘫 C.脑脊液血性 D.头颅 CT 检查发现脑实质内有高密度影 E.均有脑膜刺激征

28.脑出血与蛛网膜下腔出血的主要区别在于

A.年龄大小 B.有否高血压 C.脑脊液改变 D.有无头痛 E.有无偏瘫

29.脑出血的内科治疗最重要的是

A.降低颅内压，减轻脑水肿 B.给止血剂 C.降低血压 D.抗生素治疗 E.给氧

30.与脑出血预后的关系最密切的因素是

A.出血量 B.并发症严重程度 C.出血部位 D.出血量和部位 E.出血量、部位及并发症严重程度

31.下列哪种情况的脑出血不适合手术治疗

A.重症脑室出血(脑室铸型) B.小脑出血血肿>10ml C.壳核出血血肿<30ml D.丘脑出血血肿>15ml

E.生命体征和心肾功能正常，有脑疝形成可能

32.老年人蛛网膜下腔出血的临床特点是

A.头痛、呕吐严重 B.常有抽搐发作 C.脑膜刺激征明显 D.意识障碍多见，头痛不明显 E.常伴眼底视网膜出血

33.脑出血与蛛网膜下腔出血最重要的鉴别点为

A.活动中发病 B.头痛、呕吐 C.脑脊液含血量多少 D.头颅 CT 检查发现脑实质内高密度影 E.脑膜刺激征

34.对多数蛛网膜下腔出血，防止再出血的最有效方法是

A.卧床休息 4-6 周 B.保持大便通畅 C.不再从事剧烈运动或重劳动 D.保持血压稳定

E.对先天性动脉瘤或脑血管畸形者行手术治疗

35.关于急性脑血管疾病的病因表述不正确的是

A.脑出血最常见的病因是高血压和动脉硬化 B.脑栓塞最常见的病因是风心病合并房颤的心源性栓子脱落

C.脑血栓形成最常见病因是动脉炎 D.蛛网膜下腔出血最常见病因是先天性颅内动脉瘤

E.短暂性脑缺血发作最常见病因是动脉粥样硬化

36.关于急性脑血管疾病的病变部位的表述不正确的是

A.脑血栓形成最易发生在大脑中动脉 B.脑栓塞以大脑中动脉阻塞最常见 C.脑出血的血管最多在豆纹动脉

D.脑桥出血多由基底动脉的旁正中动脉破裂所致 E.蛛网膜下腔出血以大脑凸面畸形血管破裂最多见

37.脑部病变的患者出现运动性失语是病变损害了

A.优势半球额中回后部 B.优势半球中央前回下部 C.优势半球角回 D.优势半球额下回后部 E.颞上回后部

38.蛛网膜下腔出血最常见的病因是

A.高血压 B.血液病 C.脑动脉粥样硬化 D.颅内动脉瘤 E.脑血管畸形

39.蛛网膜下腔出血最可靠的诊断依据

A.头痛、呕吐 B.脑膜刺激征 C.腰椎穿刺时发现均匀一致的血性脑脊液 D.一侧动眼神经麻痹 E.偏瘫

40.蛛网膜下腔出血的患者出现一侧眼睑下垂时，其动脉瘤的部位可能在

A.大脑中动脉 B.前交通动脉 C.后交通动脉 D.基底动脉 E.眼动脉.

41.病灶侧单眼一过性黑朦、失明见于

A.椎一基底动脉系统短暂性脑缺血发作 B.颈内动脉系统短暂性脑缺血发作 C.大脑中动脉血栓形成

D.大脑前动脉血栓形成 E.大脑后动脉血栓形成

42.病灶对侧下肢中枢性瘫痪多见于

A.椎一基底动脉系统短暂性脑缺血发作 B.颈内动脉血栓形成 C.大脑前动脉血栓形成 D.大脑中动脉血栓形成

E.大脑后动脉血栓形成

43.眩晕、平衡障碍多见于

A.椎一基底动脉系统短暂性脑缺血发作 B.颈内动脉血栓形成 C.大脑前动脉血栓形成 D.大脑中动脉血栓形成

E.大脑后动脉血栓形成

44.跌倒发作是下列哪种疾病的表现

A.椎一基底动脉系统短暂性脑缺血发作 B.颈内动脉血栓形成 C.大脑前动脉血栓形成 D.大脑中动脉血栓形成

E.大脑后动脉血栓形成

45.脑出血首选的治疗原则

A.预防休克 B.应用脱水剂 C.控制血肿感染 D.立即输血 E.给予苏醒剂

46.对蛛网膜下腔出血诊断具有提示作用的体征为

A.乳头水肿 B.感觉障碍 C.脑神经麻痹 D.脑膜刺激征 E.玻璃体下出血

47.脑出血急性期处理的最重要环节是

A.立即使血压下降至正常以下，防止再出血 B.立即使使用止血药 C.立即使使用脱水药控制脑水肿，降低颅内压

D.用镇静药，防止癫痫发作 E.用抗生素，防止继发感染

48.脑桥病变的最特征性临床表现为

A.受损范围广泛 B.常有剧烈面痛 C.瞳孔常散大 D.上下肢瘫痪在面瘫的对侧 E.多有昏迷或抽搐

49.下列哪一项有助于诊断蛛网膜下腔出血

A.明显的意识障碍 B.脑膜刺激征 C.均匀一致血性脑脊液 D.突然发生剧烈头痛 E.起病急骤,情绪激动等因素为其诱因

50.关于短暂性脑缺血发作的表述不正确的是

A.发作突然 B.持续时间通常在几分钟至 1 小时 C.常反复发作 D.每次发作常涉及相同的某一动脉供血的脑功能区

E.症状、体征持续超过 24 小时,但在 2[~]3 周内完全恢复,不留后遗症

51.蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛出现在

A.病后 1—2 天开始发生,10-14 天为迟发性血管痉挛高峰期

B.病后 3—5 天开始发生,5—14 天为迟发性血管痉挛高峰期

C.病后 12-24 小时开始发生,15[~]-21 天为迟发性血管痉挛高峰期

D.病后 12[~]24 小时开始发生,5—10 天为迟发性血管痉挛高峰期

E.病后 5—7 天开始发生,21—28 天为迟发性血管痉挛高峰期

52.关于脑淀粉样血管病的表述错误的是

A.是由淀粉样物质在软脑膜和大脑皮质小动脉中层沉积导致的脑血管疾病 B.以反复发生的多发性脑叶出血最为多见

C. MRI 梯度回波发现陈旧的点状出血灶可能提示 CAA D.好发部位是基底节区

E.脑活检可见动脉壁内淀粉样物质广泛沉积

53.有关上矢状窦血栓形成的病因表述正确的是

A.多见于眶部、鼻窦及上面部化脓性感染或全身性感染 B.最常见于脱水和衰弱的婴儿

C.常由化脓性乳突炎或中耳炎引起 D.由脑底异常血管网病引起 E.高血压和动脉粥样硬化

54.关于海绵窦血栓形成临床表现正确的是

A. IX、X、XI 脑神经受累 B.耳后乳突红肿热痛、发热、寒战及外周血白细胞增高 C.、N, VI, V 卜 z 脑神经受累

D.头皮及乳突周围静脉怒张 E.腰穿时压颈试验患侧压力不升,健侧压力迅速升高

55.有关多梗死性痴呆临床表现的表述正确的是

A.大脑前动脉影响了额叶内侧部,表现为淡漠和执行功能障碍

B.进行性、隐匿性病程,表现为伴有反复发作的局限性神经功能缺损的痴呆

C.属于低灌注性血管性痴呆 D.常表现为反复多次突然发病的脑卒中,阶梯式加重、波动病程的认知功能障碍

E.是一种遗传性血管病，晚期发展为血管性痴呆

【A2 型题】

1.男患,67岁,以“讲话不清,右侧肢体无力5天,逐渐加重2天”为主诉来诊。查体:血压148/80mmHg,神清, Broca失语,右侧肢体偏瘫。可

2.女患,65岁,以“突然不能说话,左侧肢体无力,约5[^]-6分钟恢复,反复发作3天”为主要表现来诊。查体:神清语利,脑神经检查未见明显异常,四肢活动自如,双侧 Babinski 征(一)。首先应考虑的诊断是

A.局灶性癫痫发作 B.脑栓塞 C. 10 症发作 D.颈内动脉系统短暂性脑缺血发作 E.椎一基底动脉系统短暂性脑缺血发作

3.男患,61岁,以“左眼失明,右上肢无力2天”为主诉入院。查体:血压140/90mmHg,神清,不完全运动性失语。右侧中枢性面、舌瘫,肢体肌力2级,右侧偏身感觉障碍。病变损害的血管是

A.左侧大脑中动脉皮质支 B.左侧大脑中动脉深穿支 C.左侧大脑中动脉主干 D.左侧大脑前动脉深穿支 E.左侧颈内动脉

4.女患,66岁,以“晨起发现复视,左侧肢体活动不灵3天”来诊。既往高血压病史8年。查体:血压150/95mmHg,右眼睑下垂,眼球向上、下和内活动受限,左侧肢体肌力1级,住院3日无明显好转。诊断考虑为

A.基底节区脑出血 B.短暂性脑缺血发作 C.脑栓塞 D.椎一基底动脉系统血栓形成 E.颈内动脉系统血栓形成

5.男患,70岁,以“眩晕、呕吐、言语不清20小时”为主诉来诊。既往脑动脉硬化症病史6年,查体:声音嘶哑、吞咽困难、构音障碍,右眼裂小、瞳孔小、水平眼震,右侧面部及左半身痛觉减退,右侧指鼻试验不准。诊断考虑为

A.右侧大脑前动脉血栓形成 B.左侧小脑上动脉血栓形成 C.右侧小脑上动脉血栓形成 D.左侧小脑下后动脉血栓形成

E.右侧小脑下后动脉血栓形成

6.女患,55岁,脑梗死后第3日出现意识不清。查体:血压190/100mmHg,右侧偏瘫,腰椎穿刺检查脑脊液压力为280mmH₂O。首选的治疗药物是

A.降压药 B.扩张血管药 C.尿激酶静脉点滴 D. 20%甘露醇静脉滴注 E.低分子肝素腹部皮下注射

7.男患,47岁,以“洗衣时出现右侧肢体活动不灵、言语不清1小时”为主诉来诊。查体:神清,不完全混合性失语,二尖瓣区可闻及双期杂音,心房纤颤,右侧偏瘫,上肢重于下肢,右偏身痛觉减退。

诊断考虑为

A.脑血栓形成 B.脑栓塞 C.脑出血 D.蛛网膜下腔出血 E.短暂性脑缺血发作

8.女患，75岁，以“头痛、呕吐3小时，昏迷1小时”。查体：血压200/120mmHg，浅昏迷，四肢均无自主活动，双侧Babinski征(+)。做头颅CT检查确诊为脑出血。应迅速采取的治疗是

A.止血 B.降血压 C.降颅压 D.维持生命体征 E.防治血管痉挛

9.男患，68岁，3天前睡眠醒后发现视野范围缩小。查体：血压正常，心脏正常，神清，语利，右侧同向性偏盲，肢体肌力5级，感觉正常。诊断考虑为

A.脑血栓形成 B.脑出血 C.蛛网膜下腔出血 D.脑栓塞 E.脑膜炎

10.女患，69岁，以“突然出现右侧上下肢无力，言语不流利，逐渐加重2天”为主诉来诊。既往高血压10年，糖尿病10年。查体：血压正常，神清，混合性失语，右侧鼻唇沟浅，伸舌右偏，右上、下肢肌力0级，肌张力减低，腿反射减弱，右侧Babinski征(+)。头颅CT检查未见异常。诊断考虑为

A.脑血栓形成 B.脑出血 C.蛛网膜下腔出血 D.脑栓塞 E.脑膜炎

11.男患，63岁，以“生气后头痛、呕吐，右侧肢体不能动5小时，意识不清2小时”为主诉来诊。既往高血压8年。查体：血压180/120mmHg，中度昏迷，双瞳孔直径2mm，对光反射(+)，右侧鼻唇沟浅。右上、下肢肌力2级，右侧膝反射(+)，右侧Babinski征(+)。诊断考虑为

A.脑血栓形成 B.脑出血 C.蛛网膜下腔出血 D.脑栓塞 E.脑膜炎

12.女患，38岁，心脏病15年，房颤1年。1天前突发意识丧失，四肢抽搐3分钟左右，10分钟后清醒，发现右侧上下肢不能活动。查体：神清，血压正常，心房纤颤。左眼无光感，右上下肢肌力0级，右侧偏身痛觉丧失，右侧Babinski征(+)。诊断考虑为

A.脑血栓形成 B.脑出血 C.蛛网膜下腔出血 D.脑栓塞 E.脑膜炎

13.男患，64岁，6个月内出现3次突然不能言语，每次持续30分钟左右，第3次伴右侧肢体麻木，既往有房颤病史，神经系统检查正常。诊断考虑为

A.癫痫小发作 B.偏头痛 C.颈椎病 D.短暂性脑缺血发作 E.顶叶肿瘤

14.女患，72岁，以“意识不清1小时为主诉来急诊入院，头颅CT显示右侧大脑半球3cmX3cmX6cm高密度影。诊断考虑为

A.昏厥 B.脑出血 C.脑栓塞 D.脑血栓形成 E.高血压脑病

15.男患，33岁，以“意识不清、四肢不能活动1小时”为主诉入院。查体：深昏迷，双侧瞳孔“针尖样”缩小，四肢瘫痪。其最可能的疾病是

A.额叶出血 B.脑桥出血 C.小脑出血 D.基底节出血 E.蛛网膜下腔出血

16.女患，70岁，突然出现不能说话，右上下肢无力，约20分钟恢复，反复发作，发作后进行神经系统检查未见异常。诊断首先考虑为

A.局限性癫痫 B.脑栓塞 C.症发作 D.颈内动脉系统短暂性脑缺血发作 E.椎-基底动脉系统短暂性脑缺血发作

17.男患，56岁，以“讲课时突然出现头痛、呕吐、右侧肢体活动不便2小时”为主诉来急诊。既往高血压病史12年。查体：中度昏迷，左侧瞳孔大，光反射(一)，右侧肢体无自主活动，右侧 Babinski 征(十)。诊断考虑为

- A.脑出血，左侧小脑幕切迹疝 B.脑出血，右侧小脑幕切迹疝 C.脑出血，小脑扁桃体疝 D.蛛网膜下腔出血
E.颈内动脉血栓形成

18.女患，63岁，以“言语不清，呕吐1小时，昏迷20分钟”为主诉入院。查体：血压200/120mmHg，双眼球向右凝视，左侧鼻唇沟浅，左侧肢体坠落试验(+)，对针刺无反应。诊断脑出血，其部位是

- A.右侧基底节 B.左侧基底节 C.右侧脑桥 D.左侧脑桥 E.右侧顶叶

19.男患，62岁，以“劳动中突然出现头晕，随后出现右半身活动不灵，左眼闭合不全，10余分钟后昏迷”为主要表现入院。查体：高热，深昏迷，双眼向右侧凝视，双侧瞳孔等大正圆、直径约为1.0mm，四肢肌力0级，肌张力减低，腱反射(一)。首先考虑的诊断是

- A.小脑出血 B.脑桥出血 C.基底节脑出血 D.中脑出血 E.脑叶出血

20.女患，62岁，以“活动中突然出现眩晕，枕部疼痛、呕吐、步行不稳1小时，昏迷20分钟”为主诉入院。查体：深昏迷，呼吸节律不整。诊断脑出血，其部位可能是

- A.颞叶 B.基底节 C.脑室 D.脑桥 E.小脑

21.男患，80岁，以“头痛、呕吐、意识不清1小时”为主诉入院。查体：血压210/120mmHg，浅昏迷，右侧瞳孔大，左侧偏瘫。此时最主要的治疗为

- A.外科手术 B.降压治疗 C.应用激素 D.应用脱水剂 E.应用止血剂

22.男患，30岁，以“劳动中出现剧烈头痛、呕吐1小时”为主诉来诊，伴一过性意识不清，醒后颈枕部痛。查体：左侧眼睑下垂、左侧瞳孔大，颈强直(+)、双 Kernig 征(+)。诊断考虑为

- A.急性脑膜炎 B.脑出血、脑疝 C.小脑出血 D.脑干出血 E.蛛网膜下腔出血

23.女患，28岁，以“跳舞时出现剧烈头痛、呕吐2小时”为主诉入院。查体：神清语利，肢体无瘫痪，颈强直(+)、双 Kernig 征(+)。应首先作何种辅助检查来确定诊断

- A.脑电图 B.脑超声血流 C.脑动脉造影 D.腰穿 E.头颅CT

24.男患，46岁，以“头痛、恶心、呕吐30分钟”为主诉来诊。查体：神清语利，肢体无明显瘫痪，颈强直(+)、双 Kernig 征(+)。辅助检查：脑脊液呈均匀一致血性。最不可能的诊断是

- A.蛛网膜下腔出血 B.脑叶出血 C.壳核出血 D.尾状核头出血 E.小脑出血

25.男患，41岁，以“突然剧烈头痛、呕吐2小时”为主诉来诊。查体：体温正常，神清语利，四肢肌力5级，双 Kernig 征(+)。诊断考虑为

- A.脑血栓形成 B.脑出血 C.蛛网膜下腔出血 D.脑栓塞 E.脑膜炎

26.男患，58岁，晨起出现右侧偏瘫、言语不清，持续20分钟许，神经系统检查无阳性体征，头颅CT检查正常。诊断考虑为

A.腔隙性脑梗死 B.短暂性脑缺血发作 C.高血压脑病 D.壳核出血 E.脑栓塞

27.男患，58岁，高血压病史10年，左偏身痛觉减退1周来诊，头颅CT示右基底节区小低密度灶(0.5cm)。诊断考虑为

A.腔隙性脑梗死 B.短暂性脑缺血发作 C.高血压脑病 D.壳核出血 E.脑栓塞

28.女患，64岁，以“右侧肢体活动不灵2天”为主诉来诊。查体：血压180/120mmHg，神清语利，右侧肢体肌力4级，肌张力正常。头颅CT示左基底区小低密度灶。诊断考虑为

A.腔隙性脑梗死 B.短暂性脑缺血发作 C.高血压脑病 D.壳核出血 E.脑栓塞

29.男患，60岁，突然出现右肢体无力，不能讲话。查体：神清，不完全运动性失语，右侧同向性偏盲，右侧偏身感觉缺失、右侧偏瘫。最可能累及的血管是

A.左侧椎动脉 B.基底动脉 C.右侧大脑中动脉 D.左侧大脑前动脉 E.左侧大脑中动脉

30.一个中年女性，晨起突然出现嘴歪、视物双影来诊。查体：神清语利，右侧眼球外展不能，露齿时口角左偏，右侧额纹、鼻唇沟消失，伸舌左偏、舌肌无萎缩，左侧上、下肢中枢性偏瘫，左侧偏身深、浅感觉障碍。其病变部位可能是

A.左侧脑桥 B.右侧脑桥 C.右侧内囊 D.左侧延髓 E.右侧脑桥及左侧延髓

31.男患，69岁，发现左侧肢体活动不便3天，今晨嗜睡。查体：昏睡，左侧肢体偏瘫。辅助检查：头颅CT扫描发现右侧基底节区、额叶和颞叶大片楔形低密度灶。应首选哪种治疗措施

A.甘露醇 B.低分子右旋糖酐 C.脑血管扩张药 D.抗凝剂 E.脑细胞活化剂

32.男患，65岁，以“早起时右侧肢体不能活动、说话不清2天，昏迷30分钟”为主诉来诊。查体：浅昏迷，瞳孔左0.5cm，右0.3cm，右侧肢体偏瘫。辅助检查：头颅CT示左额顶叶大片低密度改变。最重要的治疗是

A.外科治疗 B.抗凝剂 C.溶血栓剂 D.脱水剂 E.低分子右旋糖酐

33.一中年患者，以“头痛、呕吐12小时”为主诉来诊，既往健康。查体：体温37°C，血压120/80mmHg，无偏瘫，颈强(+)，Kernig征(+)。辅助检查：腰椎穿刺均匀一致血性脑脊液，心电图示心肌缺血，DSA提示后交通动脉瘤。重要的措施是

A.脑代谢活化剂 B.止血剂 C.手术治疗 D.抗生素 E.改善心肌缺血

34.女患，55岁，以“头痛，说话不清楚，右侧肢体无力4小时”为主诉来诊，随即昏迷。查体：血压180/120mmHg，中昏迷，右侧肢体偏瘫。辅助检查：血糖7.5mmol/L，头颅CT示左侧丘脑高密度影。根据其病因应首先考虑为

A.糖尿病 B.血液病 C.脑动脉瘤破裂 D.脑血管畸形 E.高血压和动脉硬化

35.男患，75岁，高血压病史15年，5天前出现视物不清。查体:左侧同向偏盲，两侧额纹对称，眼睑闭合有力，左侧鼻唇沟浅，伸舌左偏无肌萎缩，左上、下肢中枢性瘫痪，左侧偏身感觉障碍。病变部位是

A.右枕叶皮质 B.左侧内囊 C.右侧内囊 D.左侧脑桥 E.右侧脑桥

36.女患，70岁，高血压病史5年。2天前进早餐时发现右手无力，拿不住筷子，中午则说话不清，不能下地行走。查体:血压160/90mmHg，右侧上肢肌力2级，下肢肌力3级，右侧Babinski征(+)。诊断考虑为

A.脑出血 B.高血压脑病 C.脑栓塞 D.短暂性脑缺血发作 E.脑血栓形成

37.脑血管疾病的患者神经系统检查时发现右侧动眼神经麻痹，左侧鼻唇沟变浅，伸舌偏左、舌肌无萎缩，左侧肢体呈中枢性瘫痪。其病变部位应在

A.左侧中脑 B.右侧中脑 C.左侧中脑、脑桥 D.右侧中脑、脑桥 E.右侧中脑，左侧脑桥、延髓

38.男患，56岁，病史:高血压病、动脉粥样硬化5年，2天前在劳动时突然出现说不出话及右侧无力，约10分钟后恢复正常，在送往医院的途中又类似发作2次。查体:血压150/95mmHg，神经系统检查正常。选用下列哪一种防治措施最合适

A.降压药物 B.血管扩张剂 C.脱水剂 D.血小板聚集抑制剂 E.脑代谢活化剂

39.女患，48岁，以“晚饭后聊天时突然出现头昏、头痛、呕吐1次”为主要表现来急诊。查体:血压170/105mmHg，神清语利，左侧鼻唇沟浅，伸舌偏左、无舌肌萎缩，左侧肢体肌力2级、左侧偏身痛觉消失，颈强直(+)。诊断考虑为

A.蛛网膜下腔出血 B.脑出血 C.脑梗死 D.高血压脑病 E.短暂性脑缺血发作

40.女患，62岁，以“左侧肢体活动不便2天”为主诉来诊。查体:神清语利，双眼左侧同向偏盲，左侧面、舌中枢性瘫，左侧肢体偏瘫、偏身感觉障碍。最有可能受累的血管是

A.大脑前动脉 B.大脑中动脉 C.小脑后下动脉 D.大脑后动脉 E.椎-基底动脉

41.女患，45岁，平素健康。因“突然头痛、呕吐1天”来诊。查体:神清语利，脑神经未见异常，四肢肌力、肌张力正常，颈强直(+)。辅助检查:头颅CT扫描大脑外侧裂可见高密度影。经用20%甘露醇、止痛镇静药等对症治疗半个月后症状明显好转，此时还应进行的检查是

A.腰穿 B. CT增强造影 C. MR[D.脑血管造影 E.经颅多普勒

42.女患，29岁，以“突然抽搐、昏迷2小时”来就急诊。查体:浅昏迷，心率105次/分，律不齐，心尖111级收缩期杂音和舒张中晚期杂音。瞳孔左>右，右侧上肢对疼痛刺激无反应，左侧肢体有躲避动作。应立即给予最适宜的药物是

A.毛花昔丙 B.甘露醇 C.奥扎格雷 D.苯巴比妥 E.丁咯地尔

43.女患，38岁，以“视物双影3天”为主诉来诊，既往健康。查体:神清语利，右眼睑下垂，眼球外

展正常，向内、上及下方向均受限;瞳孔右侧 4mm>左侧 2.5mm。为明确诊断最应进行的检查是

A.头颅 CT 扫描 B.局部脑血流量检查 C.脑电图 D.脑血管造影 E.腰穿检查脑脊液

44.男患，62 岁，以“晨醒时感右上肢无力，中午病情加重致右上肢不能活动”为主要表现来诊，既往有高血压史。查体:右侧轻度中枢性面、舌瘫，右上肢肌力 1 级，下肢 3 级。受累血管及病理改变最可能是

A.大脑中动脉深穿支闭塞 B.大脑前动脉皮质支闭塞 C.大脑前动脉深穿支闭塞
D.大脑中动脉皮质支闭塞 E.大脑中动脉主干闭塞

45.女患，67 岁，以“右眼一过性黑朦、左侧肢体无力 3 天，伴头痛、呕吐 2 次”来诊，既往有高血压史。查体:昏睡，右瞳孔 D=1.0mm，左瞳孔 D= 2.5mm，右颈动脉搏动减弱，左侧面舌下神经核上瘫，左侧肢体偏瘫。最可能的疾病是

A.右内囊出血 B.脑干出血 C.右大脑中动脉主干闭塞 D.右颈内动脉闭塞 E.椎一基底动脉闭塞

46.男患，63 岁，以“生气后突然头痛、呕吐，右侧肢体无力 1 小时，昏迷 10 分钟”为主诉来急诊。查体:血压 220/130mmHg，中度昏迷，右鼻唇沟浅，右侧肢体肌力。级，右侧 Babinski 征(+).头颅 CT 示左基底节区有一个直径为 5 cm 左右的高密度影。入院 2 小时后左瞳孔 D=5mm，对光反应消失，右瞳孔 D=2mm，光反应存在。诊断为

A.脑血栓形成合并脑疝 B.脑栓塞合并脑疝 C.脑出血合并脑疝 D.蛛网膜下腔出血 E.脑出血

47.女患，60 岁，以“做饭时突然剧烈头痛、呕吐 1 小时”为主诉来诊。查体:神清语利，四肢活动自如，颈强直(+), Kernig 征(+).辅助检查:腰椎穿刺脑脊液压力 290mmH₂O，呈均匀一致血性。最重要的检查是

A.脑电图 B.头颅磁共振 C.头颅 CT D.全脑血管造影 E.复查腰椎穿刺

48.男患，56 岁，以“右侧肢体无力伴头痛、呕吐 3 小时，意识不清 1 小时”来急诊。查体:血压 192/100mmHg，左侧瞳孔散大，右侧肢体瘫痪，双侧 Babinski(+).首要的治疗措施为

A.补充血容量 B.立即给降压药 C.给血管扩张药 D.迅速给脱水药、降低颅压 E.胞磷胆碱静脉滴注

49.男患，56 岁，以“口齿不清、口角歪斜，左侧肢体活动障碍 3 天”来诊，高血压病史 3 年。查体:神清，不完全运动性失语，左侧面、舌中枢性瘫，左侧肢体肌力 1 级，左侧 Babinski(+).应进行的检查是

A.腰穿脑脊液 B.脑血管造影 C.脑电图 D.头颅 CT E.脑超声波

50.男患，32 岁，情绪激动后突然剧烈头痛、呕吐 4 小时后来诊。查体:血压 170/100mmHg，浅昏迷，肢体无瘫痪，颈强直(+)、双侧 Kernig 征(+).辅助检查:头颅 CT 可见右大脑外侧裂高密度影。应立即给予的紧急治疗是

A.6-氨基己酸 B.降血压药物 C:甘露醇 D.尼莫的平 E.青霉素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/446001220200010043>