

公共卫生与预防医学考试题库

第一部分 单选题(300题)

- 1、根据我国卫生标准回答:使用中的消毒剂【单选题】——
- A. 必须无菌
 - B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{Cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
 - C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
 - D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

【答案】: D

- 2、属于低水平消毒剂的是【单选题】——

- A. 戊二醛
- B. 过氧乙酸
- C. 碘伏
- D. 氯己定 异丙醇

【答案】: D

- 3、每日 I 级手术间开始前,提前开启净化空调系统时间【单选题】——

- A. 10 分钟
- B. 30 分钟
- C. 15 分钟
- D. 20 分钟 40 分钟

【答案】: B

- 4、婴儿室【单选题】——

- A. $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
- B.

$\leq 200 \leq 5 \leq 5$

C. $\leq 500 \leq 10 \leq 10$

D. $= - \leq 15 \leq 15$

【答案】：B

5、对传染性非典型肺炎无效的公众预防措施是【单选题】——

A. 讲究个人卫生

B. 不接触传染性非典型患者或临床诊断患者

C. 在通风不好或人群密集的场所戴口鼻罩

D. 勤洗手 注射丙种球蛋白

【答案】：E

6、目前引起输血后肝炎的主要的肝炎病毒为【单选题】——

A. 乙型肝炎病毒

B. 甲型肝炎病毒

C. 戊型肝炎病毒

D. 丙型肝炎病毒 庚型肝炎病毒

【答案】：D

7、根据我国卫生标准回答:接触黏膜的医疗用品【单选题】——

A. 必须无菌

B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{Cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出

C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出

D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

【答案】：B

8、关于消毒灭菌方法的选择,错误的是【单选题】——

A. 耐热耐湿的物品首选压力蒸气灭菌法灭菌

B. 手术器具与物品首选压力蒸气灭菌法灭菌

C.

消毒首选物理方法,不能用物理方法消毒时选择化学消毒方法消毒

D. 不耐热的物品如各种导管、精密仪器、人工移植物可以选择化学灭菌方法,如环氧乙烷灭菌 化学灭菌剂浸泡灭菌方便实用,应加以推广

【答案】: E

9、预防免疫功能低下病人发生医院内感染,下述哪项是不正确的【单选题】——

- A. 注射相关疫苗
- B. 全身使用广谱抗生素预防感染
- C. 治疗局部感染病灶
- D. 保护性隔离 保护皮肤黏膜的完整性

【答案】: B

10、下列概念中不正确的是:【单选题】——

- A. 医院感染散发是指医院感染在某医院或某地区住院患者中历年的一般发病率水平
- B. 医院感染的流行趋势是指医院感染持续流行
- C. 医院感染发病率是指一定时间内住院患者中发生医院感染新发病例的频率
- D. 医院感染流行是指某医院. 某科室医院感染发病率显著超过历年散发发病率水平 医院感染暴发是指在某医院、某科室的住院患者中,短时间内、突然发生许多医院感染病例的现象

【答案】: B

11、手术中切开空腔脏器前用纱垫保护的目的是【单选题】——

- A. 防止内脏器官暴露过久
- B. 防止细菌污染
- C. 防止出血
- D. 防止损伤 防止术后腹胀

【答案】: B

12、损伤性废物【单选题】——

A.

使用过的注射针头

- B. 带血的敷料
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：A

13、目前医院内感染的研究对象主要是【单选题】——

- A. 住院患者
- B. 工作人员
- C. 陪护人员
- D. 探视人员 门诊患者

【答案】：A

14、黏膜消毒可使用下列哪一种药液【单选题】——

- A. 苯扎溴铵(新洁尔灭)
- B. 聚维酮碘(碘伏)
- C. 乙醇
- D. 碘酊 氯己定

【答案】：B

15、III类区域工作人员卫生手及物体表面的合格标准为【单选题】——

- A. 细菌总数 $\leq 20\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌
- B. 细菌总数 $\leq 25\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌
- C. 细菌总数 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌
- D. 细菌总数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌 细菌总数 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$, 未检出致病菌

【答案】：C

16、某霍乱患者在行严密隔离时,其具体措施不包括【单选题】——

- A. 只能在休息日探视
- B. 病人住单人病室,门窗关闭,病人不外出
- C.

接触病人需戴口罩、帽子,穿隔离衣、裤、鞋

D. 病室每天消毒1次 病人的一切用物应严格消毒处理

【答案】：A

17、对特殊感染而无保留价值的物品,最彻底的灭菌方法是【单选题】——

A. 煮沸消毒灭菌法

B. 过氧乙酸浸泡法

C. 燃烧灭菌法

D. 高压蒸汽灭菌法 日光曝晒法

【答案】：C

18、下列细菌是目前医院感染常见的细菌,但除外【单选题】——

A. 葡萄球菌特别是金黄色葡萄球菌和凝固酶阴性葡萄球菌

B. 大肠埃希菌

C. 沙门菌

D. 铜绿假单胞菌 克雷伯肺炎杆菌

【答案】：C

19、医院感染的传播途径一般不包括【单选题】——

A. 经土壤传播

B. 经共同媒介物传播

C. 经空气传播

D. 经生物媒介传播 经接触传播

【答案】：A

20、下列消毒剂中属高水平消毒剂的是【单选题】——

A. 戊二醛

B. 聚维酮(络合碘)

C. 苯扎溴铵(新洁尔灭)

D. 乙醇 碘酊

【答案】：A

21、注射室属于【单选题】——

- A. I类地区
- B. II类地区
- C. III类地区
- D. IV类地区 非分类地区

【答案】：C

22、目前胃镜消毒首选的消毒剂是【单选题】——

- A. 乙醇
- B. 84消毒液
- C. 2%戊二醛
- D. 洗必泰 新洁尔灭

【答案】：C

23、ICU【单选题】——

- A. 空气 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$, 物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$, 医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- B. 空气 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$, 物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$, 医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- C. 空气 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$, 物体表面 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^3$, 医护人员手 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$
- D. -, 物体表面 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^3$, 医护人员手 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$ 空气 $\leq 1000\text{cfu}/\text{m}^3$, 物体表面 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^3$, 医护人员手 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^2$?下列各医疗区的细菌学指标是

【答案】：B

24、无菌盘铺好后有效期不超过多长时间【单选题】——

- A. 2h
- B. 12h
- C. 16h
- D. 4h 8h

【答案】：D

25、为节省时间,护士给传染病患者发药时所使用的下述哪一项方法是错误的【单选题】——

- A. 用过的药杯放在消毒液内浸泡
- B. 车下层放盆,内盛消毒液
- C. 按床号依次给患者服药
- D. 全病区发药完毕,按常规消毒药杯 将备好的药及水壶放在治疗车上

【答案】：C

26、手术部位感染的常见诱因是【单选题】——

- A. 留置导尿管
- B. 气管切开
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：D

27、重症监护病房【单选题】——

- A. $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
- B. $\leq 200 \leq 5 \leq 5$
- C. $\leq 500 \leq 10 \leq 10$
- D. $=- \leq 15 \leq 15$

【答案】：B

28、医院感染区别于其他感染的不同点错误的是【单选题】——

- A. 医院感染的菌株大多为多重耐药性
- B. 易感人群抵抗力低,病死率高
- C. 在医院内一旦发生医院感染很容易引发群发性感染
- D. 在医院感染治疗效果好,一般不会出现死亡 医院感染病原体来源广泛

【答案】：D

29、下列关于禽流感的描述不对的是【单选题】——

- A. 是禽流行性感冒的简称

- B. 由 A 型禽流感病毒引起的一种禽类传染病
- C.

由 H5N1 血清型引起的禽流感称高致病性禽流感

D. 属甲类传染病之一 人感染高致病性禽流感可以在人与人之间传播

【答案】：D

30、对门诊胃镜室使用过的纤维胃镜进行消毒,应该选择的消毒溶液是

【单选题】——

A. 1%氯胺溶液

B. 5%碘伏

C. 0.1%苯扎溴铵溶液

D. 2%碱性戊二醛溶液 0.2%过氧乙酸溶液

【答案】：D

31、根据我国卫生标准回答:根据《综合医院建筑标准》有关的卫生学标准及预防医院内感染的要求,对医院的改建、扩建和新建提出建设性意见的应是【单选题】——

A. 国家医院感染管理咨询专家委员会

B. 省医院感染管理专家咨询委员会

C. 各级医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：C

32、关于地面和拖洗工具的消毒,下列哪项是正确的【单选题】——

A. 地面应经常用含氯消毒剂拖洗,既能消毒,又能增白

B. 因为 2%戊二醛是高水平消毒剂,有条件时最好用戊二醛拖地,消毒效果好

C. 地面应湿式清扫,保持清洁,局部有血迹等污染时,应局部用消毒剂处理

D. 拖洗工具使用后先洗净,再消毒,然后晾干 检验科的地面每天均需用消毒剂拖洗

【答案】：C

33、三级综合医院的医院感染管理机构每月发布发生率最高的医院感染性疾病是【单选题】——

- A. 泌尿道感染
- B. 表皮传染病
- C. 呼吸道传染病
- D. 外伤感染 肠道传染病

【答案】： C

34、III类区域空气消毒合格的标准是【单选题】——

- A. 细菌总数 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$, 未检出致病菌
- B. 细菌总数 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$, 未检出致病菌
- C. 细菌总数 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$, 未检出致病菌
- D. 细菌总数 $\leq 400\text{cfu}/\text{m}^3$, 未检出致病菌 细菌总数 $\leq 300\text{cfu}/\text{m}^3$, 未检出致病菌

【答案】： C

35、用平车护送伤寒患者摄片,正确的方法是【单选题】——

- A. 协助患者直接卧于平车上
- B. 铺清洁大单于平车上,协助其卧上
- C. 协助患者卧于平车上后,再盖上一条清洁大单
- D. 患者更换清洁衣裤后,卧于平车上 将患者床单铺在平车上,协助其卧上

【答案】： B

36、后勤人员在治疗室要安置新的紫外线灯做空气消毒,护理人员指导安装其灯管离地面的距离为【单选题】——

- A. $<4\text{m}$
- B. $<2\text{m}$
- C. $<2.5\text{m}$
- D. $<3\text{m}$ $<3.5\text{m}$

【答案】： B

37、肾移植患者应采取哪种隔离措施【单选题】——

A. 严密隔离

B.

接触隔离

- C. 呼吸道隔离
- D. 消化道隔离 保护性隔离

【答案】：E

38、穿过皮肤或黏膜进入无菌组织或器官内部的器材应采用的消毒方式【单选题】——

- A. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中、低效消毒剂
- B. 杀灭细菌繁殖体的消毒剂
- C. 应用灭菌剂或高效消毒剂
- D. 灭菌剂或物理、化学灭菌方法 应用物理灭菌方法

【答案】：D

39、对于医院感染控制指标描述错误的是【单选题】——

- A. 100~500张病床的医院,一类切口手术部位感染率应低于0.5%
 - B. 100~500张病床的医院,医院感染发病率应低于8%
 - C. 500张病床以上的医院,医院感染发病率应低于10%
 - D. 100张病床以下的医院,一类切口手术部位感染率应低于2%
- 100张病床以下的医院,医院感染发病率应低于7%

【答案】：D

40、无需执行昆虫隔离的疾病是【单选题】——

- A. 疟疾
- B. 气性坏疽
- C. 斑疹伤寒
- D. 流行性出血热 流行性乙型脑炎

【答案】：B

41、医院感染的病原特点不对的是【单选题】——

- A. 90%为条件致病微生物,少数为致病微生物
- B. 一种病原引起多部位感染或一个部位有多种细菌感染
- C. 近年来G-杆菌中非发酵菌和G+球菌中的表皮葡萄球菌以及真菌

下降趋势

D. 多为耐药菌或多重耐药菌

免疫功能低下患者的病原谱广,病原随抗生素应用或免疫功能缺损程度而有变迁

【答案】: C

42、下列带入感染描述正确的是【单选题】——

- A. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人
- B. 病原体来源于病人本身的感染
- C. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染
- D. 病人在家中已发生的感染 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染

【答案】: A

43、取无菌溶液时下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 倒溶液时瓶签向下
- B. 用前核对瓶签
- C. 检查药液有无沉淀
- D. 保持瓶盖内面无菌 用后立即盖上

【答案】: A

44、一般病室、办公室、治疗室、换药室、走廊等使用的拖把【单选题】——

- A. 拖把应有明显的标记,严格分区使用
- B. 拖把用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min 后,再洗干净,晾干备用
- C. 应先消毒,用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,再用水洗干净,然后用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,悬挂晾干备用
- D. 先用 1000mg/L 有效氯消毒剂适量倒在污染地面 30min 后,用拖把拖干净 每次使用后清水冲洗,悬挂晾干备用

【答案】: E

45、除灭菌速度快、灭菌效果好、经济、环境污染小的压力蒸气灭菌法外,目前最常用的低温灭菌方法是【单选题】——

A. 环氧乙烷灭菌法

B.

戊二醛浸泡灭菌法

- C. 辐射灭菌法
- D. 过氧乙酸浸泡灭菌法 微波灭菌法

【答案】：A

46、下列消毒剂中属中效消毒剂的是【单选题】——

- A. 戊二醛
- B. 过氧乙酸
- C. 氯己定
- D. 臭氧 碘伏

【答案】：E

47、发生医院内尿路感染最常见的诱因是【单选题】——

- A. 长期卧床
- B. 留置导尿管
- C. 膀胱冲洗
- D. 膀胱内注药 膀胱镜检查

【答案】：B

48、治疗室的管理中下列哪项错误【单选题】——

- A. 注射、治疗时,应辅无菌盘,抽出的药液存放不能超过 2 小时
- B. 治疗室中开启的各种溶媒不得超过 24 小时
- C. 治疗室中开启的无菌溶液需要 4 小时内使用
- D. 碘酊、乙醇瓶应保持密闭,每周更换及灭菌 1~2 次 经消毒后的棉球、纱布包,一经打开,保存时间不得超过 48 小时

【答案】：E

49、取无菌溶液时,下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 倒溶液时可不顾及瓶签的朝向
- B. 用前核对瓶签
- C. 保持瓶盖内侧面无菌
- D. 用后立即盖上 检查药液是否有沉淀

【答案】：A

50、外科刷手时间每次【单选题】——

- A. 3 分钟以上
- B. 1 分钟以上
- C. 2 分钟以上
- D. 5 分钟以上 4 分钟以上

【答案】：A

51、支气管镜采用 2%碱性戊二醛消毒时间应不少于【单选题】——

- A. 120min
- B. 60min
- C. 30min
- D. 20min 10min

【答案】：D

52、无菌区的定义是【单选题】——

- A. 经过灭菌处理的区域
- B. 不使已灭菌的物品再污染并保持灭菌
- C. 未经灭菌处理的区域
- D. 经过灭菌未被污染的区域 灭菌处理后被污染的区域

【答案】：D

53、潜伏病毒的激活感染是【单选题】——

- A. 麻疹恢复期
- B. 隐性乙型脑炎病毒感染
- C. 乙型肝炎病毒携带者
- D. 单纯疱疹反复发作 慢性活动性肝炎

【答案】：D

54、传染病院应设置在下列哪个地方【单选题】——

- A. 远离公共场所
- B. 交通便利的地方
- C.

城市中心

D. 靠近综合性医院 水源充足的地方

【答案】：A

55、对到传染病室探视的亲友应注意的事项哪些不对【单选题】——

A. 对于有感染指征的来访者,一律谢绝探视

B. 探视者在进入隔离室前要先报告值班护士

C. 对于有感染指征的患者,应尽量控制和减少探视

D. 医务人员应指导和监督探视者按规定进行隔离 积极向探视者进行卫生知识宣传教育,保护探视者不受感染

【答案】：C

56、医院污物的处理原则,下述哪项是错误的【单选题】——

A. 防止污染扩散

B. 分类收集

C. 分别处理

D. 少量医疗垃圾可与生活垃圾一同处理 尽可能采用焚烧处理

【答案】：D

57、不属于高度危险物品的是【单选题】——

A. 腹腔镜

B. 导尿管

C. 体温表

D. 穿刺针 手术器材

【答案】：C

58、临床科室医院感染管理小组的职责下列哪项错误【单选题】——

A. 制定本科室医院感染管理规章制度

B. 监督检查本科室有关医院感染管理的各项工作,对医院感染可疑病例,可能存在感染的环节进行监测,并采取有效防治措施

C. 对医院感染散发病例按要求登记报告,并立即向当地卫生行政机构报告

D.

按要求对疑似或确诊病例留取临床标本,进行细菌学检查和药敏试验
监督检查本科室抗生素使用情况

【答案】：C

59、根据我国下列卫生标准回答:对本地区的医院内感染管理进行技术指导的是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：B

60、发生医院感染时,停止收容新病人的时间是【单选题】——

- A. 该病最长潜伏期过去
- B. 该病平均潜伏期过去
- C. 该病常见潜伏期过去
- D. 该病最短潜伏期过去 观察一段时间没有新病人发生

【答案】：A

61、根据我国卫生标准回答以下问题:根据《综合医院建筑标准》有关的卫生学标准及预防医院内感染的要求,对医院的改建、扩建和新建提出建设性意见的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：C

62、治疗室的管理中,下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 注射治疗时要铺无菌盘,抽出的药液存放不能超过2小时
- B. 治疗室中开启的各种溶酶超过24个小时不能使用,最好采用小包装

- C. 治疗室中开启的无菌溶液需在 2 小时内使用
- D. 碘酊、乙醇瓶应保持密闭,每周更换并对容器灭菌 1~2 次

经灭菌后的棉球、纱布包一经打开,使用时间不能超过 48 小时

【答案】： E

63、冲手时应取姿势为【单选题】——

- A. 指尖朝下,手肘朝上
- B. 手指及前臂前伸
- C. 双手互相搓洗手臂
- D. 指尖朝上,手肘朝下 手指及前臂平伸

【答案】： D

64、洗手的指征中哪一项不合理【单选题】——

- A. 新生儿室入室常规规定应彻底洗手
- B. 接触污物前、后应洗手
- C. 侵入性操作前、后应洗手
- D. 接触病人后应洗手 脱手套后需洗手

【答案】： B

65、高效消毒剂【单选题】——

- A. 0.5%碘伏
- B. 2%戊二醛
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】： B

66、煮沸消毒灭菌时,错误的操作是【单选题】——

- A. 大小相同的盆应重叠
- B. 玻璃类用纱布包好
- C. 物品完全浸没在水中
- D. 煮沸过程中再加物品,应在第二次水沸后重新计时 有轴节的器械宜打开

【答案】： A

67、目前国内医院感染最常发生的部位是【单选题】——

- A. 泌尿道
- B. 外科切口
- C. 血液
- D. 下呼吸道 胃肠道

【答案】：D

68、属于低效消毒剂的是【单选题】——

- A. 醋酸氯己定
- B. 新洁尔灭
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：C

69、为阳离子表面活性剂,对阴离子表面活性剂有拮抗作用的是【单选题】——

- A. 乙醇
- B. 甲醛
- C. 苯扎溴铵
- D. 过氧乙酸 纯乳酸

【答案】：C

70、关于医院感染的概念错误的是【单选题】——

- A. 医院感染是指在医院内获得的感染
- B. 与上次住院有关的感染是医院感染
- C. 入院时处于潜伏期的感染一定不是医院感染
- D. 出院之后发生的感染可能不是医院感染 婴幼儿经胎盘获得的感染是医院感染

【答案】：E

71、医院必须对消毒、灭菌效果定期进行监测,灭菌合格率必须达到【单选题】——

- A.

0.8

B. 1

C. 0.85

D. 0.95 0.9

【答案】： B

72、医务人员发生艾滋病职业暴露后预防性用药最好在几小时内实施

【单选题】——

A. 24h

B. 12h

C. 8h

D. 4h 2h

【答案】： D

73、目前引起下呼吸道医院感染最主要的病原体是【单选题】——

A. 铜绿假单胞菌

B. 链球菌

C. 表皮葡萄球菌

D. 卡他球菌 金黄色葡萄球菌

【答案】： A

74、关于医院感染知识培训错误的是【单选题】——

A. 培训内容包括管理知识和专业知识

B. 非专职人员每年不少于2小时培训

C. 培训对象包括管理. 医务. 工勤人员

D. 实习医师必须培训 进修医师必须培训

【答案】： B

75、手术间通常保持的湿度【单选题】——

A. 40~60%

B. 30~50%

C. 30~40%

D. 50~60% 40~50%

【答案】：D

76、穿脱隔离衣时要避免污染【单选题】——

- A. 袖子后面
- B. 胸前、背后
- C. 腰带以下部分
- D. 衣领 腰带以上部分

【答案】：D

77、对医院新建设施提出卫生学标准的审定意见【单选题】——

- A. 卫生部医政司医院感染管理委员会
- B. 省市卫生行政部门医院感染管理委员会
- C. 医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室以下各项工作是哪个部门的职责

【答案】：C

78、关于刷手的注意事项,其中正确的是【单选题】——

- A. 手刷 48 小时高压消毒 1 次
- B. 刷手的时间为 4 分钟
- C. 手刷放在刷手盆中
- D. 肥皂液每日更换 1 次 刷洗的范围限于被污染的部位

【答案】：D

79、根据我国卫生标准回答:接触皮肤的医疗用品【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{Cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

【答案】：C

80、SARS 传播最重要的途径是【单选题】——

- A. 接触传播
- B. 飞沫传播
- C. 气溶胶传播
- D. 血液-体液传播 空气传播

【答案】： B

81、下列哪种是最重要的医院感染的传播媒介【单选题】——

- A. 手
- B. 饮水
- C. 食品
- D. 医疗器械 衣物

【答案】： A

82、怀疑医院感染病例取标本进行病原体检查时不正确的是【单选题】——

- A. 采集标本后及时送检
- B. 收到标本后及时检查
- C. 尽可能做到涂片检查与病原体培养相结合
- D. 为节约经费,在抗感染治疗效果不佳时取标本做病原体检查
在使用抗菌药物前送标本

【答案】： D

83、严密隔离的标志是【单选题】——

- A. 红色标志
- B. 棕色标志
- C. 黄色标志
- D. 绿色标志 灰色标志

【答案】： C

84、医院感染的含义是【单选题】——

- A. 所有发生在医院内的细菌感染
- B.

因医疗器械消毒不严造成的感染

- C. 病人在住院期间发生的感染
- D. 病人在住院期间或医院职工在护理或治疗患者过程中发生的感染
医院内病人直接或间接传播引起的感染

【答案】：D

85、巴氏消毒常用消毒指标是【单选题】——

- A. 消毒温度为 65~75℃,作用时间 10~15min
- B. 消毒温度为 70~80℃,作用时间 5~8min
- C. 消毒温度为 45~55℃,作用时间 20~25min
- D. 消毒温度为 85~95℃,作用时间 10~15min 消毒温度为 62℃,作用时间 30min

【答案】：E

86、医疗废物为【单选题】——

- A. 使用过的注射针头
- B. 带血的敷料
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：C

87、消毒药械管理中下列哪项错误【单选题】——

- A. 根据消毒的目的选用消毒药械
- B. 同一消毒剂消毒不同物品应有同一浓度
- C. 加强消毒效能监测
- D. 防止使用中的消毒剂再污染 注意影响消毒效果的因素

【答案】：B

88、下列抗菌药物中哪一种为窄谱抗菌药【单选题】——

- A. 万古霉素
- B. 阿米卡星
- C. 阿奇霉素

D. 磷霉素 环丙沙星

【答案】：A

89、下列哪种情况属于医院感染：【单选题】——

- A. 皮肤、粘膜的开放性伤口只有细菌定植而无临床症状或体征者
- B. 由损伤而产生的炎症或由非生物因子刺激产生的炎症
- C. 婴儿经胎盘获得的感染,如 CMV、弓形虫病发生在出生后 48 小时以内者
- D. 住院中由于治疗措施而激活的感染 由于输注苏打外渗引起的局部炎症

【答案】：D

90、关于血液净化室的医院内感染管理,下列哪项不正确【单选题】——

- A. 应对病人常规进行血液净化前肝功能、肝炎病原体等检查
- B. 工作人员定期体格检查,加强个人防护
- C. 透析器、管路应一次性使用
- D. 传染病病人在隔离净化室进行血液净化,专机透析 急诊病人不需固定透析机

【答案】：E

91、普通手术室医护人员手表面细菌菌落总数卫生标准应【单选题】——

- A. $\leq 5\text{cfu/cm}^2$
- B. $\leq 10\text{cfu/cm}^2$
- C. $\leq 15\text{cfu/cm}^2$
- D. $\leq 200\text{cfu/cm}^2$ $\leq 500\text{cfu/cm}^2$

【答案】：A

92、压力蒸汽灭菌时器械包的重量【单选题】——

- A. 8kg
- B. 7kg
- C. 5kg
- D. 6kg 10kg

【答案】：B

93、以 15%过氧乙酸原液配制 0.3%过氧乙酸 100mL,下列方法中正确的是【单选题】——

- A. 原液稀释 200 倍
- B. 原液 30mL 加水 70mL
- C. 原液 20mL 加水 80mL
- D. 原液 15mL 加水 85mL 原液 2mL 加水 98mL

【答案】： E

94、术前皮肤消毒应由【单选题】——

- A. 巡回护士完成
- B. 未洗手的手术医生完成
- C. 手术护士完成
- D. 已洗手的手术医生完成 麻醉医生完成

【答案】： D

95、传染病院应设置在【单选题】——

- A. 靠近综合性医院
- B. 城市中心
- C. 远离公共场所
- D. 交通便利的地方 水源充足的地方

【答案】： C

96、标准预防针对体内物质的隔离预防不包括【单选题】——

- A. 血液
- B. 体液
- C. 汗液
- D. 排泄物 分泌物

【答案】： C

97、对一次性卫生用品、消毒药械的购置查检许可证,对其抽检进行细菌学检查【单选题】——

- A. 卫生部医政司医院感染管理委员会
- B.

省市卫生行政部门医院感染管理委员会

C. 医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科 临床科室以下各项工作是哪个部门的职责

【答案】：D

98、铺好的无菌盘,在无污染情况下的有效时间是【单选题】——

A. 6h

B. 24h

C. 4h

D. 12h 2h

【答案】：C

99、手术区皮肤消毒的正确方法是【单选题】——

A. 消毒范围超过手术切口 15cm

B. 会阴部用碘酊消毒

C. 消毒范围与备皮范围一致

D. 用 2.5~3%的碘酊消毒 3 遍 用 95%乙醇脱碘

【答案】：A

100、下列概念中不正确的是【单选题】——

A. 医院感染发病率是指一定时间内住院病人中发生医院感染新发病例的频率

B. 医院感染暴发是指在某医院、某科室的住院病人中,短时间内、突然发生 3 例以上同源感染病例的现象

C. 医院感染流行是指某医院、某科室医院感染发病率显著超过历年散发发病率水平

D. 医院感染散发是指医院感染在某医院、或某地区住院病人中历年的一般发病率水平 医院感染的流行趋势是指医院、某科室的医院感染持续流行,长时间不能控制

【答案】：E

101、使用紫外线照射消毒,关灯后至再使用前须间隔【单选题】——
A.

3~4min

B. 5~6min

C. 1~2min

D. 7~8min 9~10min

【答案】：A

102、儿科病房【单选题】——

A. $\leq 10 \leq 5 \leq 5$

B. $\leq 200 \leq 5 \leq 5$

C. $\leq 500 \leq 10 \leq 10$

D. $=- \leq 15 \leq 15$

【答案】：C

103、传染性非典型肺炎的最主要传播途径是【单选题】——

A. 经消化道传播

B. 接触传播

C. 经呼吸道飞沫传播

D. 虫媒传播 经粪一口途径传播

【答案】：C

104、乙型脑炎主要传播媒介是【单选题】——

A. 蚊

B. 虱

C. 螨

D. 鼠 蚤

【答案】：A

105、I、II级手术室空气采样的时间【单选题】——

A. 手术开始前 30 分钟

B. 彻底清扫后 30 分钟

C. 手术结束后 30 分钟

D. 采样前提前开启空气消毒机 30 分钟后 手术开始前 1 小时

【答案】：D

106、使用无菌容器正确操作的是【单选题】——

- A. 容器内无菌物取出后,未污染物品可放回
- B. 开盖 30 分钟内盖好,以防污染
- C. 手指不可触及容器内面及边缘,盖的内面朝上
- D. 手抓边缘,以便持物牢靠 盖的内面朝下,以便放置稳妥

【答案】： C

107、根据我国卫生标准回答以下问题:进入组织、器官或接触破损皮肤、黏膜的医疗用品【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$,致病性微生物不得检出

【答案】： A

108、医院感染最重要的传染来源是【单选题】——

- A. 病原携带者
- B. 血液制品
- C. 食品
- D. 动物 各种病人

【答案】： E

109、根据我国卫生标准回答以下问题:对医院发生的医院内感染流行、暴发流行进行调查分析,提出控制措施,并组织实施的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C.

各级医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：D

110、MRSA 感染的最佳选药【单选题】——

A. 去甲万古霉素、万古霉素

B. 头孢唑林

C. 氧氟沙星

D. 磷霉素 阿米卡星

【答案】：A

111、预防免疫功能低下病人发生医院内感染不正确的是【单选题】——

A. 注射相关疫苗

B. 全身使用广谱抗生素预防感染

C. 治疗局部感染病灶

D. 保护性隔离 保护皮肤黏膜的完整性

【答案】：B

112、医院感染控制措施中血管内装置感染,已证实有效的措施错误的是【单选题】——

A. 所有导管均应为密闭系统并限制插管的持续时间

B. 局部皮肤准备,插管时的无菌技术,疑有感染应立即拔除导管

C. 中心血管导管插管时外科灭菌

D. 限制敷料更换的频率,短期使用抗生素包裹的导管,限制插管时间
抗微生物药膏用于皮肤准备

【答案】：E

113、母婴室的医院感染管理错误的是【单选题】——

A. 每名婴儿床位的占地面积不应少于 0.5-1m²

B. 每张产妇床位的使用面积不应少于 5.5-6.5m²

C. 严格探视制度,探视者应着清洁服装,洗手后方可接触婴儿

D.

婴儿有感染性疾病时,应及时与其他婴儿隔离,但患儿母亲不需隔离
产妇在传染病急性期,应暂停哺乳

【答案】：D

114、新生儿重症监护室对每张床位占地面积的要求是不少于一般新生儿床位的【单选题】——

- A. 1 倍
- B. 2 倍
- C. 3 倍
- D. 4 倍 5 倍

【答案】：B

115、下列有关医院感染的管理人员培训要求描述错误的是【单选题】——

- A. 300 张床位以上的医院设医院感染管理科
- B. 1000 张床位以上的大型医院,医院感染管理专职人员的配备不得少于 10 人
- C. 300 张床位以下的医院,医院感染管理专职人员的配备不少于 1 人
- D. 300 张床位以下的医院应配备医院感染管理专职人员
300-500 张床位的医院,医院感染管理专职人员的配备不得少于 2 人

【答案】：B

116、下列哪项是正确的【单选题】——

- A. 无菌器械保存液应该是无菌的,最多允许检出少量微球菌
- B. 使用中消毒剂细菌总数应 ≤ 200 cfu/mL,不得检出致病性微生物
- C. 无菌器械保存液细菌总数应 ≤ 5 cfu/mL,不得检出致病性微生物
- D. 使用中消毒剂细菌总数应 ≤ 10 cfu/mL,允许检出金黄色葡萄球菌
使用中消毒剂细菌总数应 ≤ 100 cfu/mL,不得检出致病性微生物

【答案】：E

117、为预防医院感染的发生新生儿病房每张床位占地面积不应少于【
单选题】——

A.

5m²

B. 4m²

C. 3m²

D. 2m² 1m²

【答案】：C

118、调查医院感染的最佳方法【单选题】——

A. 从医院微生物室获得病例来源

B. 临床医师填报病例

C. 专职护士到病室前瞻性发现病例

D. 病室监控护士报告病例 专职护士到病案室从出院病历中
找查病例

【答案】：C

119、从医疗护理角度讲戴手套的作用不正确的是【单选题】——

A. 手套可减少患者身上的微生物传播给医务人员的可能性

B. 手套可以防止医务人员把自身手上的菌群转移给患者的可能性

C. 手套可以防止医务人员成为传播微生物的媒介

D. 手套可以防止医务人员将从患者或环境中污染的病原在人群中
传播 戴手套后可以不必洗手

【答案】：E

120、下列哪种情况属于医院感染【单选题】——

A. 烧伤创面培养出金黄色葡萄球菌

B. 经产道感染的乙型肝炎

C. 红霉素静脉滴注后发生静脉炎;拔出的导管在血平皿上滚动培
养,细菌菌落数8个

D. 羊肠线吸收不佳的炎症反应 入院后5天发生的甲型肝炎

【答案】：B

121、带入感染【单选题】——

- A. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染
- B.

在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染

C. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人

D. 病人在家中已发生的感染 病原体来源于病人本身的感染

【答案】: C

122、保管无菌物品哪项是错误的【单选题】——

A. 无菌物品应放在清洁干燥、固定的地方

B. 取出的无菌物品不得放回无菌容器内

C. 无菌包必须注明灭菌日期

D. 无菌物与非无菌物应分别放置 已启用的无菌包,48h 后必须重新灭菌

【答案】: E

123、下列哪项不属于灭菌剂【单选题】——

A. 过氧乙酸

B. 戊二醛

C. 碘伏

D. 环氧乙烷 甲醛

【答案】: C

124、避污纸的正确使用方法为【单选题】——

A. 污染的手取避污纸可掀页撕取

B. 从页面抓取

C. 随便撕取

D. 掀开页面抓取第一页 清洁手取避污纸需他人传递

【答案】: B

125、下列哪项不属医院感染【单选题】——

A. 阑尾穿孔引起的腹膜炎

B. 入院 72 小时后发生的肺炎

C. 无症状导管菌尿症

D. 烧伤 6 小时入院的创面感染

产道分娩吸入阴道分泌物的新生儿肺炎

【答案】：A

126、关于普通 30W 直管型紫外线灯消毒效果监测正确的是【单选题】——

- A. 新灯辐照强度 $\geq 100\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 为合格
- B. 新灯辐照强度 $\geq 90\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 为合格
- C. 灯辐照强度 $\geq 80\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 为合格
- D. 灯辐照强度 $\geq 70\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 为合格 使用中紫外线灯辐照强度 $\geq 60\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 为合格

【答案】：B

127、浸泡无菌持物钳的容器应是【单选题】——

- A. 大口容器,盛用消毒液
- B. 大口容器,底部垫纱布
- C. 大口容器,盛用消毒液,底部垫无菌纱布
- D. 盛用消毒液,底部垫无菌纱布 大口容器,盛用消毒液,底部垫纱布

【答案】：A

128、肝炎肠道门诊的管理中下列哪项错误【单选题】——

- A. 诊室、人员、器械、用具固定
- B. 挂号、候诊与普通门诊分开
- C. 肝炎按黄疸和无黄疸进行隔离
- D. 取药、注射、采血、化验与普通病人分开 接触病人后洗手

【答案】：C

129、根据《综合医院建筑标准》有关的卫生学标准及预防医院感染的要求,对医院的改建、扩建和新建,提出建设性意见【单选题】——

- A. 卫生部医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C.

各级医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：C

130、病房的医院内感染管理措施中错误的是【单选题】——

A. 感染病人与非感染病人分开

B. 同类感染病人相对集中

C. 特殊感染病人单独安置

D. 室内应定时通风换气,必要时进行空气消毒 地面应常规使用含氯消毒剂消毒

【答案】：E

131、关于医院感染的概念正确的是【单选题】——

A. 与上次住院有关的感染不是医院感染

B. 医院感染是指在医院内获得的感染

C. 诊疗措施激活的潜在性感染不是医院感染

D. 婴幼儿经胎盘获得的感染是医院感染 出院之后发生的感染一定不是医院感染

【答案】：B

132、普通病房物体表面细菌菌落总数卫生标准应【单选题】——

A. $\leq 500\text{cfu}/\text{cm}^2$

B. $\leq 200\text{cfu}/\text{cm}^2$

C. $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$

D. $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$ $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

【答案】：D

133、WHO认为医院监测的最终目标是【单选题】——

A. 为了减少医院感染和由此所造成的损失

B. 降低医院感染率,减少获得医院感染的危险因素

C. 建立医院的医院感染发病率基线

D. 利用调查资料说服医务人员遵守感染控制规范与指南 评价效果,调整和修改感染控制规范

【答案】： A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/446203240232010130>