

呼吸与危重症医学科规培护士理论考试题

您的姓名： [填空题] *

1. 50 岁以上男性易患的肺癌类型是 [单选题] *

腺癌

鳞癌(正确答案)

髓样癌

小细胞癌

大细胞癌

2. 书写病室报告时，应先书写的患者是 [单选题] *

出院患者(正确答案)

危重患者

新入院患者

当日手术患者

行特殊治疗的患者

3. 被动体位见于 [单选题] *

哮喘患者

瘫痪患者(正确答案)

肺气肿患者

下肢水肿患者

肺淤血患者

4. 患者，男，70 岁，诊断为肺心病，其发病机制为 [单选题] *

右心前负荷加重

左心前负荷加重

右心后负荷加重(正确答案)

左心后负荷加重

心肌收缩能力减弱

5. 做血气分析的血标本，采集后应密封放置于 [单选题] *

清洁试管中

草酸钾抗凝试管

无菌试管中

枸橼酸钠试管中

肝素抗凝注射器试管中(正确答案)

6. 某女士，孕 38 周，初产妇，骨盆外测量正常，胎头双顶径 8.5cm，规律宫缩 4 小时，宫口开大 1cm，未破膜，头先露 “0” 平，此时较合适的处理是 [单选题] *

鼓励卧床歇息

每 3 小时做一次肛门检查

滴注催产素

灌肠刺激宫缩(正确答案)

采取侧卧位

7. 患者，女性，50 岁，右示指被木刺扎伤 2 天后浮现右示指红、肿、热、痛，今日开始浮现跳痛，并伴发热，目前主要的处理措施是 [单选题] *

中药外敷

应用抗生素

切开引流(正确答案)

充分歇息

理疗

8. 患儿男， 15 个月，发热、咳嗽 4 天以肺炎收住院，入院当晚浮现呼吸加快，口唇发绀，医嘱予鼻导管给氧，其氧流量和氧浓度的选择是 [单选题] *

氧流量 1L/min，氧浓度<40%(正确答案)

氧流量 2 ~ 4L/min，氧浓度<50%

氧流量 5 ~ 6L/min，氧浓度<60%

氧流量 7 ~ 8L/min，氧浓度<70%

氧流量 9 ~ 10L/min，氧浓度<80%

9. 做尿蛋白定量检查时应 [单选题] *

饭前半小时留

留晨起第一次

饭后半小时留尿

留 24 小时尿(正确答案)

留中段尿

10. 患者，女性， 28 岁。因外出春游去植物园后，浮现咳嗽、咳痰伴喘息 1 天入院。体检：体温 36.5℃，脉搏 90 次/分，呼吸 28 次/分，血压 110/80mmHg，喘息貌，口唇发绀，在肺部可闻及广泛哮鸣音，该患者发病最可能的诱因是 [单选题] *

花粉(正确答案)

尘螨

动物毛屑

病毒感染

精神因素

11. 患儿， 6 岁，风湿热经治疗痊愈，医嘱预防应用长效青霉素 120 万单位/月，肌注。该药使用时间至少 [单选题] *

1年

2年

5年

10年

12年(正确答案)

12. 患者，女，43岁。有风湿性心脏瓣膜病史。患者于户外运动时，蓦地浮现右侧肢体无力，站立不稳，并有口角歪斜。该患者最可能是并发了 [单选题] *

脑栓塞(正确答案)

短暂性脑缺血发作

颅内肿瘤

蛛网膜下腔出血

颅内动静脉瘤破裂

13. 盆腔器官手术前留置导尿的目的是 [单选题] *

便于引流和冲洗

避免术中误伤膀胱(正确答案)

保持会阴部清洁干燥

便于术中正确记录尿量

可减轻手术切口的张力

14. 患者，女性，34岁，胸外伤后呼吸艰难，发绀，脉快，体检时见左胸壁有一个约3cm长开放性伤口，呼吸时伤口处出发嘶嘶声音，左侧呼吸音消失，叩诊呈鼓音。对该患者的紧急处理方法是 [单选题] *

充分给氧

胸膜腔闭式引流

迅速封闭胸壁伤口(正确答案)

气管插管辅助呼吸

注射呼吸中枢兴奋药

15. 某哮喘患者，呼吸极度艰难，一口气不能说完一句话，伴发绀、大汗淋漓。对该患者首要的护理措施是 [单选题] *

专人护理，准备抢救用品(正确答案)

加强巡视，防止情绪激动

匡助口服平喘药物

避免进食可能诱发哮喘的食物

采血做血气分析

16. 患者，男性，68岁，诊断为慢性阻塞性肺疾病5年，曾经因呼吸衰竭2次住院，目前处于稳定期，遵医嘱进行呼吸训练，患者呼吸训练的方法需要纠正的是 [单选题] *

立位，上半身略前倾

用鼻吸气，经口呼气

吸气时腹壁下陷，呼气时腹壁鼓起(正确答案)

吸气与呼气的比例为1:2~1:3

每日2~3次，每次10~20分钟，每分钟呼吸保持在7~8次

17. 患儿，男，4岁。诊断为原发性肺结核。服用利福平治疗1月后浮现食欲下降，疲惫无力，巩膜黄染。此时应 [单选题] *

输新鲜全血

加用利尿药

加用升白细胞的药物

利福平的正常治疗反应，不必处理

加用保肝药物，并改用其他抗结核药物(正确答案)

18. 对于需要静脉输液的成年人，使用头皮针进行静脉穿刺时优先选择的血管是

[单选题] *

贵要静脉

头静脉

绕静脉

手背静脉网(正确答案)

肘正中静脉

19. 关于静脉输液注意事项的描述，错误的是 [单选题] *

根据病情安排输液顺序

输液过程中加强巡视

注意药物配伍禁忌

输液前必须排尽输液管及针头内空气

需 24 小时连续输液者，应 2 天更换 1 次输液器(正确答案)

20. 早产儿缺乏肺泡表面活性物质可以引起 [单选题] *

肺气肿

肺水肿

呼吸暂停

坠积性肺炎

肺透明膜病(正确答案)

21. (5-7 题共用题干)患者在静脉输液的过程中浮现了胸闷、呼吸艰难、咳嗽、咳粉红色泡沫痰，可能是发生了 [单选题] *

发热反应

急性肺水肿(正确答案)

静脉炎

空气栓塞

过敏反应

22. 此时，病人应采取的卧位是 [单选题] *

去枕仰卧位

左侧卧位

端坐位，两腿下垂

休克卧位(正确答案)

头低足高位

23. 给氧时，护士应选择的吸氧流量为 [单选题] *

1-2L/min

3-4L/min

5-6L/min

6-8L/min(正确答案)

9-10L/min

24. 肺炎链球菌肺炎患者的热型为 [单选题] *

稽留热(正确答案)

弛张热

间歇热

波状热

不规则热

25. 属于肿瘤二级预防的措施是 [单选题] *

环境保护

积极治疗癌前病变(正确答案)

手术

放疗

化疗

26. 支气管哮喘反复发作的关键因素是 [单选题] *

缺氧

感染

免疫缺陷

精神紧张

气道变应性炎症(正确答案)

27. 患者，男，29岁。一年来排尿次数增多，伴尿急、尿痛。夜间有低热、盗汗。实验室检查：酸性尿，镜下见大量红细胞及白细胞，尿抗酸杆菌培养阳性。最可能的致病菌是 [单选题] *

大肠埃希菌

破伤风杆菌

真菌

结核杆菌(正确答案)

铜绿假单胞菌

28. 患者，男，30岁。胸部损伤，多处多根肋骨骨折，浮现反常呼吸，其原因是 [单选题] *

疼痛

胸壁软化(正确答案)

肋间神经损伤

气胸

血胸

29. 经鼻高流量氧疗的生理学效应不包括 [单选题] *

减少鼻咽部死腔

产生气道正压，提高呼气末肺容积

提高机体代谢(正确答案)

保护气道黏膜，增强黏膜纤毛的清理能力

降低上呼吸道的阻力及减少患者的呼吸功

30. 支气管扩张发生大咯血首要的护理措施是 [单选题] *

静脉输液

应用止血药

保持气道通畅(正确答案)

抗休克治疗

持续吸氧

31. 患者，男，64岁。患慢性支气管炎8年，高血压3年。今晨排便时，突感右胸刀割样疼痛，随即呼吸艰难。最可能的原因是 [单选题] *

低血压

急性胸膜炎

急性心包炎

自发性气胸(正确答案)

心脏神经官能症

32. 内生肌酐清除率下降提示 [单选题] *

肾功能衰竭(正确答案)

心力衰竭

肝昏迷

呼吸衰竭

脑出血

33. 按组织学分型，支气管肺癌最常见的类型为 [单选题]*

鳞状上皮细胞癌(正确答案)

小细胞未分化癌

大细胞未分化癌

腺癌

细支气管—肺泡细胞癌

34. 胸腔镜术后清醒患者的卧位为 [单选题]*

中凹卧位

仰卧位

端坐位

半坐卧位(正确答案)

端坐位，双腿下垂

35. 患者，男，74岁。因肺部感染浮现咳嗽、咳痰入院。既往有慢性阻塞性肺疾病史6年。血气分析：PaO₂50mmHg。最可能的入院诊断是 [单选题]*

支气管肺炎

支气管哮喘

支气管扩张

I型呼吸衰竭

II型呼吸衰竭(正确答案)

36. 支气管扩张病人体位引流合理的体位是 [单选题]*

任何体位均可

采取患者感觉舒适的体位

患侧位于低处，引流支气管开口向上

患侧位于水平位，引流支气管开口水平位

患侧位于高处，引流支气管开口朝下(正确答案)

37. 刺激性呛咳或者带有金属音的咳嗽应首先考虑 [单选题]*

上呼吸道感染

肺部病变早期

支气管肺癌(正确答案)

支气管扩张

左心功能不全

38. 支气管扩张的临床特点 [单选题] *

黄痰

大量浓痰且久置分三层(正确答案)

铁锈色痰

粉红色泡沫痰

绿痰

39. 慢性呼吸衰竭患者浮现最早、最突出的症状是 [单选题]*

发绀

呼吸艰难(正确答案)

精神神经官能症

其他器官伤害

心血管系统症状

40. 患者男性，60岁。连续3天测血压为140/95 mm Hg.此患者属于 [单选题] *

正常血压

正常高限

高血压(正确答案)

收缩压正常,舒张压升高

收缩压升高,舒张压正常

41. 患者女, 30岁。体温持续升高达39~40℃,持续数日, 24小时波动不超过1℃,属于 [单选题] *

弛张热

稽留热(正确答案)

间歇热

不规则热

超高热

42. 患者,男性, 62岁。因心房纤颤收入院,心率114次/分,心音强弱不等,心律不规则,心率快慢不一,测脉搏时脉细弱,且极不规则,此时护士观察脉搏的方法是 [单选题] *

先测心率,后测脉率

先测脉率,后测心率

两人分别测心率和脉率

两人同时分别测心率和脉率(正确答案)

两人一人测心率一人测脉率

43. 我国普筛食管癌的方法是 [单选题] *

CT

超声内镜检查

纤维食管镜检查

脱落细胞学检查(正确答案)

是官屯碑 X 线双重对照造影

44. 治疗洋地黄中毒引起的室性期前收缩宜首选的药物是 [单选题] *

普罗帕酮

普萘洛尔

苯妥英钠(正确答案)

维拉帕米

利多卡因

45. 下列关于结核菌的描述错误的是 [单选题]*

染色具有抗酸性

在阴湿处能生存 5 个月以上

烈日下暴晒 1 小时可被杀死(正确答案)

70%乙醇接触 2 分钟可杀菌

煮沸 5 分钟能被杀死

46. 迁延性肺炎的病程为 [单选题] *

<1 个月

1 个月

1~3 个月

>3 个月(正确答案)

3~5 个月

47. 患者，女性，45 岁。护士在腹部手术前为患者行导尿术时，发现手套破裂，正确的处理方法是 [单选题] *

用无菌纱布将破裂处包裹好

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/447116132151006042>