

产科异常分娩,产褥感染诊疗及护理考核

一、选择题

1 .关于协调性子宫收缩乏力正确的是 () [单选题] *

A.子宫收缩极性倒置

8 .容易发生胎儿窘迫

C.不宜静脉滴注缩宫素

D.不易发生胎盘残留

E.产程常延长 ✓

2. 关于不协调性子宫收缩乏力正确的是 () [单选题] *

A.比协调性子宫收缩乏力多见

B.子宫收缩弱而无力

C.产妇多无不适感觉

D.强镇静药疗效显著,

E.较少发生胎儿窘迫

3.处理不协调性子宫收缩乏力的首选措施是 () [单选题] *

A.海巴皂水灌肠

B.肌注哌替啶 100mgV

C.行人工破膜

D.静脉滴注缩宫素加强宫缩

E.静脉补充能量

4. 妊娠足月产妇拟增强宫缩，在 5%葡萄糖注射液 500ml 中应加入缩宫素（） [单选题] *

A.10U

B.5U

C.2.5U ✓

D.15U

E.20U

5 初产妇第一产程活跃期延长，是指活跃期超过（） [单选题] *

A.8 小时

B.6 小时

C.4 小时

D.10 小时

E.<0.5cm/小时 ✓

6.初产妇第一产程潜伏期延长，是指潜伏期超过（） [单选题] *

A.10 小时

B.12 小时

C.14 小时

D.20 小时 ✓

E.16 小时

7.初产妇第二产程延长，是指第二产程超过（） [单选题] *

A.1 小时

B.1 小时 30 分钟

C.2 小时 ✓

D.2 小时 30 分钟

E.3 小时

8 .胎头下降延缓，是指初产妇第二产程胎头下降速度每小时小于（） [单选题] *

A.0.4cm

B.0.8cm

C.1.0cm ✓

D.1.2cm

E.1.3cm

9 .胎头下降停滞，是指第二产程胎头停留在原处不下降达（） [单选题] *

A.1 小时以上 ✓

B.2 小时

C.2 小时 30 分以上

D.3 小时以上

E.3 小时 30 分以上

10. 不属于子宫收缩乏力原因的是（） [单选题] *

A.产妇精神过度紧张

B.胎位异常

C.临产后应用大剂量镇静剂

D.膀胱充盈

E.临产后产妇体内前列腺素过多 ✓

11. 一初产妇，其分娩过程为时间宫口开大胎先露部位置 10:004cm-2,12:005cm-1,14:006cm0,16:306cm+1 [单邮]

A.活跃期延长 ✓

B.潜伏期延长

C.活跃期停滞

D.胎头下降延缓

E.胎头下降停滞

12.26 岁初产妇，妊娠 40 周，来院时规律宫缩 22 小时，已破膜。检查：宫底剑突下 3 指，胎心'在脐下左下方 140 次/分。肛查宫口开全，胎头 S+4。本例正确处理应是（） [单选题] *

A.等待自然分娩 ✓

B.行胎头吸引器助娩

C.会阴侧切后自然分娩

D.会阴侧切后产钳助娩

E.行剖宫产术

13.28 岁初产妇，妊娠 40 周，规律宫缩 12 小时。近 2 小时产程无进展，产妇呼喊疼痛，腹部拒按，子宫呈痉挛性收缩，胎位触不清，胎心 152 次/分。肛查宫口开大 3cm，胎头 S+1。本例正确处理应是（） [单选题] *

A.阴道检查后再决定分娩方式

B.静脉滴注缩宫素

C.肌注哌替啶 100mgV

D.人工破膜后静滴缩宫素

E.立即行剖宫产术

25 岁初产妇，妊娠 39 周，不规则宫缩 2 日，阴道少许血性黏液，查血压 136/86mmHg,子宫长度 38cm,腹围 106cm,胎心 158 次/分，宫缩持续 32 秒，间隔 6 分钟，肛查宫口未开，缩宫素激惹试验出现早期减速。临产 20

小时再查宫缩减弱变稀，胎心 150 次/分，肛查宫口开大 2cm，先露为 0，血压 120/90mmHg，尿蛋白（±），无自觉症状。

14. 本例的正确诊断应是（） [单选题] *

- A. 第一产程活跃期延长
- B. 第一产程潜伏期延长 ✓
- C. 原发性子宫收缩乏力
- D. 胎儿窘迫
- E. 妊娠期高血压

15. 此时不恰当的处理应是（） [单选题] *

- A. 查胎盘功能
- B. 左侧卧位
- C. 静滴阴屈嗪 V
- D. 阴道检查了解头盆关系
- E. 间断吸氧

23 岁初产妇，妊娠 39 周，规律宫缩 3 小时，枕右前位，胎心 136 次/分，骨盆外测量未见异常，胎儿头 S-I，宫口未开，B 型超声测胎头双顶径值为 9.6cm，羊水平段 3cm。

16. 本例应诊断为（） [单选题] *

- A. 胎儿生长受限
- B. 头盆相对不称

C.正常分娩经过 ✓

D.子宫收缩乏力

E.第一产程延长

17. 此时最恰当的处置应是 () [单选题] *

A.行剖宫产术

B.静脉滴注缩宫素

C.严密观察产程情况 ✓

D.肌注维生素 K1

E.缓慢静注能量合剂

18. 当胎头下降 S+3,宫口开大 5cm,此时最恰当的处理应是 () [单选题] *

A.行剖宫产术

B.静脉滴注缩宫素

C.让产妇用腹压

D.泄肥皂水灌肠

E.人工破膜 ✓

26 岁初产妇，妊娠 38 周，规律宫缩 7 小时，枕右前位，估计胎儿体重 2800g, 胎心 146 次/分。阴道检查：

宫口开大 3cm,已破膜，S+1,骨盆外测量未见异常。

19.本例应诊断为 () [单选题] *

A.第一产程延长

B.头盆相对不称

C.胎儿生长受限

D.子宫收缩乏力

E.正常分娩过 **V**

20 . 此时恰当处理应是 () [单选题] *

A.等待自然分娩 **V**

B.静脉滴注麦角新碱

C.静脉滴注缩宫素

D.抑制宫缩, 使其维持至妊娠 40 周

E.行剖宫产术

21 . 此后宫缩逐渐减弱, 产程已 17 小时, 胎膜已破, 宫口开大 7cm, 此时恰当处理应是 () [单选题] *

A.静脉滴注缩宫素 **✓**

22 肌内注射缩宫素

c.静 a^{1/2}西洋加速产程

D.静脉注射麦角新碱

E.立即行剖宫产术'

26 岁初产妇, 妊娠 38 周, 枕左前位。阵发性腹痛, 宫缩 10 分钟一次, 持续 40 秒, 宫口开大 2cm₀

22 . 出现上述临床表现的原因可能是 () [单选题] *

A.子宫收缩极性异常

B.子宫收缩对称性异常

C.子宫收缩节律性异常 **V**

D.子宫收缩缩复作用异常

E.腹肌?口膈肌收缩力异常

23 .此时的处理原则应是（） [单选题] *

A.静脉滴注缩宫素 ✓

B.肌注哌替啶 100mg

C.人工破膜

D.肌注麦角新碱

E.立即行剖宫产术

24 .若已进入第二产程，胎先露 S+3,胎心良好，此时处理应是（） [单选题] *

A.等待自然分娩 ✓

25 产钳助产

C.胎头吸引器助产

D.继续加强宫缩等待分娩

E.立即行剖宫产术

25.若胎头 S+5,胎心 98 次/分，此时处理应是（） [单选题] *

A.立即行剖宫产术

B.等待自然分娩

C.静脉滴注缩宫素加速产程进展

D.静注地西洋加速产程进展

E 行胎头吸引术 ✓

25. 何项是最常见的产力异常：（） [单选题] *

A. 不协调性宫缩乏力

B. 协调性宫缩乏力 ✓

C.协调性宫缩过强

D. 不协调性宫缩过强

E. 不规则子宫收缩

27 .在加强子宫收缩的方法中, 下列何项应专人监护: () [单选题] *

A. 灌肠

B. AI 破膜

C. 针刺

D. 缩宫素静脉滴注 ✓

E. 排空膀胱

28 . 骨盆径线小于正常可诊断为单纯扁平骨盆的是 () [单选题] *

A. 髂棘间径

B. t | 崎间径

C. 坐骨棘间径 ✓

D. 耻耻外径

E. 坐骨结节间径

29 . 孕妇坐骨结节间径为 7cm, 还应测量的骨盆径线是 () [单选题] *

A. 耻骨弓角度

30 出口前矢状径

C. 坐骨棘间径

D. 出口后矢状径 ✓

E. 对角径

30. 临产后胎头迟迟不入盆, 测量最有价值的骨盆径线是 () [单选题] *

A. 对角径

B. 耻外径 V

C. 髂棘间径

D. 髂嵴间径

E. 坐骨棘间径

31 . 关于骨盆狭窄的诊断正确的是 () [单选题] *

A. 骨盆各径线比正常值小 10cm 为均小骨盆

B. 胎头跨耻征阳性提示骨盆入口狭窄

C. 真结合径 $< 13\text{cm}$ 为骨盆入口狭窄

D. 坐骨结节间径与后矢状径之和 $< 18\text{cm}$ 为骨盆出口狭窄

E. 坐骨棘间径 $< 10\text{cm}$

32 . 分娩时允许进行"试产"的条件是 () [单选题] *

A. 枕先露, 中骨盆轻度狭窄

B. 枕先露, 骨盆出口轻度狭窄

C. 枕先露, 骨盆入口轻度狭窄 V

D. 臀先露, 骨盆入口轻度狭窄

E. 臀先露, 中骨盆轻度狭窄

33. 胎头跨耻征阳性的初产妇, 临产后检查不可能出现 () [单选题] *

A. 子宫收缩力异常

B. 胎位异常

C. 病理缩复环

D. 胎膜早破

E. 胎头衔接 ✓

34.30岁初产妇，妊娠40周，宫缩规律，枕左前位，胎心好，肛查宫口开大2cm，胎头未衔接，符合

本产妇实际情况的骨盆测量数值应是（） [单选题] *

- A. 器渣间径 27Cm
- B. 髂棘间径 24Cm
- C. 舂耻外径 17cm√
- D. 坐骨棘间径 10cm
- E. 坐骨结节间径 5cm

35.26岁初产妇，妊娠42+1周，规律宫缩10小时。检查胎儿较大估计体重3000g，枕左前位，胎头高浮，胎心率166次/分。骨盆不小，宫口开大2cm，尿雌激索/肌酐比值为7。本例恰当的分娩方式应是（） [单选题] *

- A. 尽快行剖宫产术 V
- B. 等待宫口开全行产钳助娩
- C. 等待宫口开全行胎头吸引术助娩
- D. 左侧卧位，吸氧，静注10%葡萄糖液
- E. 静脉滴注缩宫素加速产程

36.27岁初孕妇，妊娠38周。骨盆外测量，舂耻外径19.5cm，髂棘间径25Cm，器崎间径28cm，坐骨棘间径9cm，坐骨结节间径7.0cm。该孕妇的骨盆类型为（） [单选题] *

- A. 扁平形骨盆
- B. 均小骨盆
- C. 漏斗型骨盆 ✓
- D. 佝偻病性扁平骨盆
- E. 类人猿型骨盆

37.25岁初孕妇，妊娠38周，胎头双顶径9.2cm，男型骨盆。预计临产后本例不易发生的项目是（） [单选题]

*

- A.持续性枕横位
- B.持续性枕后位
- C.第一产程活跃期停滞
- D.第一产程潜伏期延长
- E.第二产程延长 ✓

26岁初产妇，妊娠40周，规律宫缩8小时入院。查：髂棘间径25cm，髂耻外径20cm，坐骨结节间径7.5cm，枕右前位，胎心134次/分。月1宫口开大4cm，胎先露S=O₀3小时后产妇呼叫腹痛难忍，检查宫缩1~2分钟一次，持续45秒，胎心102次/分，子宫下段压痛明显。出现病理缩复环及血尿。肛查宫口开大5cm。

38 .此时产程受阻的原因主要是25岁初孕妇，妊娠38周，胎头双顶径9.2cm，男型骨盆。（） [单选题]

*

- A.骨盆入口狭窄
- B.骨盆出口狭窄
- C.中骨盆狭窄
- D.扁平骨盆
- E.漏斗骨盆 ✓

39 .此时最可能的诊断是（） [单选题] *

- A.协调性子宫收缩过强
- 40 先兆子宫破裂 ✓
- C.不协调性子宫收缩乏力
- D.不协调性子宫收缩过强
- E.DI度胎盘早剥

40 应立即采取的措施是 () [单选题] *

- A. 立即行剖宫产 ✓
- B. 停止静滴缩宫素
- C. 立即肌注哌替啶或地西洋
- D. 即刻作宫缩应激试验, 若异常行剖宫产术
- E. 等待宫口开全行产钳术

41 34 岁已婚妇女, 孕 39 周, 规律宫缩 10 小时, 破膜 3 小时入院。检查宫缩持续 20—25 秒, 间歇 7-8 分钟, 宫口开大 8cm, 胎心率 160 次/分, 阴道检查坐骨棘稍突, 测量坐骨结节间径 7.5cm, 胎先露 S=O₂。可能的诊断是 ()

[单选题] *

- A. 高龄初产
- B. 骨盆入口狭窄
- C. 中骨盆和出口狭窄 ✓
- D. 骨盆出口狭窄
- E. 骨盆入口和出口狭窄

42 . 头盆不称引起的子宫破裂属下列何项原因: () [单选题] *

- A. 子宫本身病变
- B. 手术损伤
- C. 子宫收缩剂使用不当
- D. 先露下降受阻 ✓
- E. 尿潴留

43 . 持续性枕后位的特点是 () [单选题] *

- A. 产妇过早感觉肛门坠胀而使用腹压 ✓

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/448137117056006034>