

儿科护理测试题与答案

1、一男性新生儿经产钳助产娩出。出生后心率90次/分,呼吸浅慢,四肢青紫,四肢稍屈,喉反射消失,Apgar评分为

- A、4分
- B、5分
- C、6分
- D、7分
- E、8分

答案: A

2、患儿,男,1岁2个月,人工喂养,平时多汗、烦躁易惊。查体有枕秃、方颅、鸡胸,血钙磷乘积 <30 ,碱性磷酸酶增高。X线检查:临时钙化带消失。临床诊断为维生素D缺乏性佝偻病。该患儿的临床分期为

- A、初期
- B、激期
- C、恢复期
- D、后遗症期
- E、缓解期

答案: B

3、患儿女,生后7天,诊断为新生儿黄疸收入院行蓝光照射治疗。光疗时护士应该特别注意的是【解析】

- A、保护眼睛
- B、及时喂养
- C、监测血压
- D、保持安静
- E、皮肤干净

答案: A

4、小亮,男,4岁。因患肺部感染,按医嘱青霉素G钠治疗。已知青霉素G钠(粉剂)每瓶80万U(单位),小儿用量为每次10万U/kg,每日2次静脉点滴。该小儿体重为

- A、10kg
- B、12kg
- C、14kg
- D、16kg
- E、18kg

答案: D

5、婴儿能独坐的年龄一般为

- A、1~3个月
- B、3~5个月
- C、5~7个月
- D、7~9个月
- E、9~11个月

答案：C

6、患儿女,11个月。腹泻3天,大便为蛋花汤样带黏液,无腥臭味;无尿8小时,眼窝凹陷极明显;血钠125mmol/L诊断为小儿秋季腹泻。如发生休克,首要的处理措施是

- A、利尿
- B、记出入量
- C、静脉补液
- D、限制饮食
- E、应用抗生素

答案：C

7、麻疹的主要传播途径是

- A、呼吸道传播
- B、虫媒传播
- C、消化道传播
- D、血液传播
- E、接触传播

答案：A

8、提示8个月小儿有神经系统异常的表现为

- A、吞咽反射阳性
- B、颈肢反射阳性
- C、角膜反射阳性
- D、腹壁反射阴性
- E、双侧巴宾斯基征阳性

答案：B

9、患儿女,7岁,3周前曾患“感冒”,3天前出现眼睑颜面水肿伴肉眼血尿,测血压140/110mmHg,应初步考虑为

- A、急性肾小球肾炎
- B、慢性肾小球肾炎
- C、急性肾衰竭

- D、心力衰竭
- E、肾病综合征

答案：A

10、患儿,女,4岁。腹泻、呕吐4~5天,10小时无尿。体检:神志模糊,面色苍白,口唇樱桃红,呼吸深快,前囟、眼窝深凹,无泪,皮肤弹性差,四肢冷,脉搏细弱。护士应协助医生给予的紧急治疗是

- A、1:1含钠液,20ml/kg,静脉推注
- B、2:1等张含钠液,20ml/kg,静脉推注
- C、3:1含钠液,150ml/kg,静脉滴注
- D、3:2:1含钠液,180ml/kg,静脉滴注
- E、5%NaHCO₃,50ml/kg,静脉推注

答案：B

11、9月龄患儿,单纯牛乳喂养,为添加辅食,因抽搐2次入院,血清Ca²⁺0.8mmol/L。诊断维生素D缺乏性手足搐溺症,对该患儿护理措施不正确的是

- A、惊厥时及时清除口鼻分泌物
- B、遵医嘱应用镇静剂和钙剂
- C、补充钙剂时应快速静脉推注
- D、惊厥发作时保护患儿安全
- E、保持安静,减少刺激

答案：C

12、不属于青春期保健重点的是

- A、合理营养
- B、健康教育
- C、预防意外
- D、计划免疫
- E、法制教育

答案：D

13、患儿,男,6岁,反复咳嗽伴低热4个月,近2个月来家长感觉小儿较前明显消瘦前来就诊,诊断为结核病原发综合征。家长询问本病最常见的传播方式,护士应向其解释为

- A、皮肤黏膜
- B、呼吸道
- C、消化道
- D、血型播散

E、母婴垂直传播

答案：B

14、婴儿前囟闭合的时间为

A、0.5~1岁

B、1~1.5岁

C、1.5~2岁

D、2~2.5岁

E、2.5~3岁

答案：B

15、10岁男孩,因误吸笔帽入院。术前患儿活动时突然剧烈咳嗽,口唇及颜面紫绀明显。护士应立即采取的措施是

A、通知医生

B、吸氧

C、将患儿扶回病床

D、用力叩击患儿背部

E、进行心电监测

答案：D

16、某4个月患儿,人工喂养。近日反复出现发作性吸气困难,伴有吸气时喉鸣音,急诊入院,查血钙 1.7mmol/L ,其余正常,首先考虑该患儿出现了

A、中毒性肺炎

B、喉痉挛

C、气管异物

D、惊厥

E、支气管哮喘

答案：B

17、患儿,男,6天。皮肤及巩膜明显黄染,血清总胆红素 $295\mu\text{mol/L}$ 。遵医嘱给予光照疗法。关于光疗过程中的护理,下列描述错误的是

A、使小儿皮肤均匀受光,单面光疗箱一般2小时更换体位1次

B、每2~4小时测体温1次,维持小儿体温稳定

C、光疗期间应佩戴遮光眼罩

D、出箱前将小儿衣物预热,再给小儿穿好

E、灯管与小儿距离越近,光疗效果越好

答案：E

18、患儿,男,1岁,因“肺炎”入院治疗,在住院期间患儿突然口吐粉红色泡沫痰,医嘱给予吸氧。吸入氧气的乙醇湿化液浓度是

- A、10%~20%
- B、20%~30%
- C、30%~40%
- D、40%~50%
- E、50%~60%

答案：B

19、患儿女, 生后7天, 诊断为新生儿黄疸收入院行蓝光照射治疗。光疗时, 护士应该特别注意的是

- A、保护眼睛
- B、及时喂养
- C、监测血压
- D、保持安静
- E、皮肤干净

答案：A

20、患儿, 男, 6岁, 因触电导致呼吸心搏骤停。护士见状后立即进行心肺复苏。该患儿胸外按压的部位是

- A、胸骨上段
- B、胸骨中段
- C、胸骨下段
- D、胸骨中下1/3处
- E、胸骨中点

答案：D

21、患儿, 女, 3岁。因患急性支气管炎, 按医嘱需用头孢拉定治疗。已知头孢拉定针剂(粉剂)的规格是0.5g/瓶, 小儿用量为每日50mg/kg, 每日2次, 肌肉注射。该小儿体重为

- A、10kg
- B、12kg
- C、14kg
- D、16kg
- E、18kg
- F、：C

答案：E

22、关于上呼吸道感染患儿发热的护理措施, 不正确的是

- A、保持室内温度适宜, 空气清新
- B、保证营养和水分的摄入

- C、松解衣被,及时更换汗湿的衣物
- D、体温升至 38℃时,给予酒精擦浴
- E、注意观察是否有高热惊厥发生

答案: D

23、某初产妇,25岁,顺产一男婴,由于天生乳头凹陷,无法进行母乳喂养,护士对其进行人工喂养的指导不正确的是

- A、要选择软硬度、开孔适宜的奶嘴
- B、喂哺者将婴儿抱起置于膝上,使之呈半卧姿势
- C、配制好的配方奶应先将乳液滴在喂哺者前臂内侧以不烫手为宜
- D、喂奶时奶瓶倾斜,使乳液充满奶嘴,避免吸入空气
- E、喂奶完毕后将婴儿放在床上,左侧卧位避免溢乳引起窒息

答案: E

24、单纯性肾病综合征最明显的症状是

- A、高度水肿
- B、低蛋白血症
- C、大量蛋白尿
- D、血尿
- E、高脂血症

答案: A

25、患儿男,2岁。发热1天,体温39℃,伴有轻咳来诊。既往有癫痫病史。门诊就诊过程中突然发生惊厥,即刻给予输氧,镇静,此刻首选药物是

- A、苯巴比妥肌注
- B、地西泮静注
- C、水合氯醛灌肠
- D、氯丙嗪肌注
- E、肾上腺皮质激素静注

答案: B

26、幼儿期保健最关键的是

- A、防治传染病
- B、培养兴趣爱好
- C、加强早期教育
- D、培养良好的生活习惯
- E、预防意外发生

答案: E

27、以下不符合新生儿期特点的是

- A、适应环境能力差
- B、常因分娩带来产伤和窒息
- C、免疫功能差，感染性疾病多见
- D、发病率高，死亡率也高
- E、生理调节功能比较成熟

答案：E

28、患儿女，11个月。腹泻3天，大便为蛋花汤样带黏液，无腥臭味；无尿8小时，眼窝凹陷极明显；血钠125mmol/L诊断为小儿秋季腹泻。护士晨起观察到患儿出现四肢厥冷、脉弱、血压下降的情况，提示可能出现了

- A、贫血
- B、休克
- C、低钾血症
- D、低钙血症
- E、继发感染

答案：B

29、患儿，女，6岁，发热3天入院，伴腰痛、尿频、尿急、尿痛，尿镜检白细胞增多，达20个/HP。该患儿诊断为

- A、肾病综合征
- B、急性肾小球肾炎
- C、慢性肾小球肾炎
- D、泌尿道感染
- E、前列腺增生

答案：D

30、患儿在补液过程中出现眼睑水肿，说明什么问题（）。

- A、电解质补充过多
- B、电解质补充不足
- C、葡萄糖补充过多
- D、葡萄糖补充不足
- E、血钾过低

答案：A

31、属于口服补液的适应证的是

- A、休克
- B、心功能不全
- C、肾功能不全
- D、轻度脱水，无呕吐者

E、明显腹胀

答案：D

32、患儿,女,7岁,发热 39.5℃来院就诊。查体:流涕、咳嗽,结膜充血、畏光流泪及眼睑水肿。口腔中第一白齿对应的黏膜上可见 1mm 白色斑点。该患儿最可能的诊断是

A、麻疹

B、水痘

C、猩红热

D、幼儿急疹

E、风疹

答案：A

33、患儿,女,9个月,反复呼吸道感染,体检时发现胸骨左缘第 3~4 肋间有 III 级收缩期杂音,初步诊断为室间隔缺损。确诊最简便安全的辅助检查是

A、X 线检查

B、心电图

C、超声心动图检查

D、心导管检查

E、心血管造影

答案：C

34、小儿女,3个月。母亲带其去儿童保健门诊接种白百破混合制剂。患儿母亲非常焦虑,不停哭泣。针对患儿母亲的心理护理,错误的是

A、告诉其患儿目前的状况

B、告诉其当前采取的措施及原因

C、告诉其不可陪伴患儿,以免交叉感染

D、告知其以往类似情况的处理效果

E、帮助其选择缓解焦虑情绪的方法

答案：C

35、重症肺炎患儿的酸碱平衡失调多属

A、代谢性酸中毒

B、呼吸性酸中毒

C、代谢性酸中毒和呼吸性酸中毒

D、呼吸性碱中毒

E、代谢性酸中毒和呼吸性碱中毒

答案：C

36、某产妇, 25 岁, 剖宫产一男婴, 3.8Kg, 为保持身材, 不愿母乳喂养, 护士为其宣教不正确的是

- A、母乳营养丰富能增强免疫力
- B、母乳喂养增进母婴的感情
- C、母乳哺喂简便、乳汁温度适宜又不易污染且经济实惠
- D、母乳喂养可以推迟母亲月经可以作为产后避孕的方法
- E、产后哺乳可刺激子宫收缩促进子宫复原

答案: D

37、中毒型细菌性痢疾多见于

- A、1~4 岁
- B、3~5 岁
- C、2~7 岁
- D、7~9 岁
- E、8~12 岁

答案: C

38、小儿中度贫血时, 其血红蛋白量和红细胞数分别是

- A、60~90g/L, $2\sim 3 \times 10^{12}/L$
- B、30~60g/L, $1\sim 2 \times 10^{12}/L$
- C、50~70g/L, $4\sim 5 \times 10^{12}/L$
- D、30~40g/L, $2.5\sim 3.2 \times 10^{12}/L$
- E、 $<30g/L$, $<1 \times 10^{12}/L$

答案: A

39、患儿, 男, 5 岁。发生脱水, 表现烦渴、高热、尿少, 尿比重 1.028, 应考虑

- A、低渗性脱水
- B、低钙血症
- C、等渗性脱水
- D、低钾血症
- E、高渗性脱水

答案: E

40、患儿, 男, 9 岁, 疲乏无力伴心悸 4 天, 患儿 2 周前患感冒。体检: 体温 $38^{\circ}C$, 心率 138 次/分, 心脏轻度扩大, 第一心音低钝。实验室检查: 血清心肌酶增高, 诊断为病毒性心肌炎, 该患儿在急性期应卧床休息至热退后

- A、7 天
- B、1~2 周

C、2~3周

D、3~4周

E、2个月

答案：D

41、我国规定的围生期是指

A、从妊娠20周至产后7天

B、从妊娠20周至产后28天

C、从妊娠28周至产后7天

D、从妊娠28周至产后28天

E、从妊娠29周至产后1个月

答案：C

42、新生儿,男婴,胎龄35周,日龄5天。生于夏天,出生体重1800g。出生后第三天拒奶、精神萎靡。体格检查:体温34℃,面色发黄,心肺无异常,臀部和双下肢皮肤僵硬水肿。血白细胞 $19 \times 10^9/L$,中性粒细胞70%。首要的护理措施是

A、复温

B、抗感染

C、保证营养供给

D、对患儿家长进行健康教育

E、密切观察病情

答案：A

43、肾病综合征最主要的并发症是

A、感染

B、心力衰竭

C、急性肾衰竭

D、高血压脑病

E、低钾血症

答案：A

44、判断小儿体格发育的主要指标是

A、体重、身高

B、牙齿、囟门

C、运动发育水平

D、语言发育水平

E、智力发育水平

答案：A

45、儿科护士必须具备的素质不包括

- A、高度的责任感
- B、较强的自尊心
- C、良好的书写能力
- D、较强的科研能力
- E、良好的自我控制能力

答案：B

46、法洛四联症患儿脑缺氧发作时,使用普萘洛尔的目的是

- A、控制惊厥
- B、减轻脑水肿
- C、减慢心率
- D、减轻代谢性酸中毒
- E、减慢呼吸

答案：C

47、对青春期孩子实施心理行为指导的重点是

- A、对学校生活适应性的培养
- B、加强品德教育
- C、预防疾病和意外教育
- D、性心理教育
- E、社会适应性的培养

答案：D

48、患儿男,11个月。2015年10月因发热、呕吐、腹泻入院。大便为黄色蛋花汤样,每日十余次,量多,无腥臭味。前囟、眼窝稍凹陷,尿量减少,大便镜检(一)。对该患儿的治疗不恰当的是

- A、及时足量使用广谱抗生素
- B、补液
- C、补钾
- D、应用双歧杆菌
- E、使用蒙脱石散

答案：A

49、在静脉补钾时,200ml生理盐水中最多可加入10%氯化钾的量是

- A、12ml
- B、10ml
- C、8ml
- D、6ml

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/456023143120010045>