

# 2024 年度护理三基考试题库及答案（共 480 题）

1.高压氧下血氧含量增加，主要是由于（ B ）

- A.氧合血红蛋白的亲合力增加      B.血浆中物理溶解氧增加      C.血液中游离氧增加  
D.结合氧的离解减少      E.机体耗氧量减少

2.病人右腰背部皮肤疼痛，且有呈带状排列的群集米粒至黄豆大水疱，皮损局部治疗应选择（ B ）

- A.软膏      B.湿敷      C.粉剂      D.酊剂      E.洗剂

3.下列传染病中，哪种属于甲类传染病（ B ）

- A.艾滋病      B.鼠疫      C.传染性非典型肺炎      D.肺炭疽      E.人感染高致病性禽流感

4.脑室穿刺引流术后一般每天引流脑脊液量不超过（ E ）

- A.100ml      B.200ml      C.300ml      D.400ml      E.500ml

5.输液中发现溶液不滴经检查为针头阻塞，其正确的处理方法是（ E ）

- A.调整针头位置      B.静脉内推注等渗盐水冲开      C.用手挤压胶管      D.输液局部热敷  
E.更换针头重新穿刺

6.对破伤风抗毒素皮肤试验阳性病人采用脱敏注射的原理是（ C ）

- A.促进吞噬细胞对 IgE 的灭活作用    B.抑制肥大细胞吸附 IgE    C.逐步结合消耗体内的 IgE  
D.与体内的 IgE 竞争受体    E.封闭 IgE，阻断与抗原结合

7.有关一级预防的描述哪项是正确的（ E ）

- A.又称临床前预防，是使疾病不致发生    B.主要是对疾病早发现、早诊断、早治疗  
C.又称临床预防，即及时采取治疗措施    D.主要是对疾病有效治疗，防止疾病恶化  
E.又称病因预防，即采取各种措施控制或消除病因与危险因素

8.高压氧治疗的绝对禁忌证是（ C ）

- A.肺结核    B.有颅骨缺损者    C.未经处理的气胸    D.收缩压>150mmHg  
E.体温>38℃

9.急性心肌梗死最突出的症状是（ B ）

- A.休克    B.心前区疼痛    C.心律失常    D.充血性心力衰竭    E.胃肠道症状

10.交感性眼炎一般发生在穿透性眼外伤后（ B ）

- A.2周    B.2~8周    C.1周    D.2~8个月    E.2~8天

11.空肠造瘘管饲流质最佳温度是（ C ）

A.37℃      B.35℃      C.41℃      D.39℃      E.38℃

12.介入治疗为便于定位，要求病人随身携带（ D ）

A.肝功能检查报告单    B.尿常规检查单    C.出凝血检查报告单    D.X线、CT、MRI 检查单

E.癌胚抗原检查报告单

13.《中华人民共和国护士管理办法》颁发于（ C ）

A.1992年      B.1990年      C.1994年      D.1995年      E.1996年

14.血型是指（ C ）

A.ABO 血型    B.红细胞血型    C.人体血液各成分的遗传多态性标记    D.白细胞血型

E.血小板血型

15.急性肺水肿时，病人的体位应取（ D ）

A.去枕平卧位    B.头低脚高位    C.俯卧位    D.半坐卧位    E.平卧位且头偏向一侧

16.心尖在胸前壁的体表投影位于（ A ）

A.位于左侧第5肋间隙，距前正中线7~9cm处

- B.位于左侧第6肋间隙，距前正中线7~9cm处
- C.位于左侧第5肋间隙，距前正中线5~7cm处 D.位于左侧第6肋间隙，距前正中线5~7cm处
- E.位于左侧第7肋间隙，距前正中线7~9cm处

17.尿毒症最常见的病因是（ B ）

- A.原发性高血压 B.慢性肾小球肾炎 C.慢性肾盂肾炎 D.肾动脉硬化 E.红斑狼疮性肾炎

18.下列哪项是卵巢肿瘤最常见的并发症（ A ）

- A.蒂扭转 B.破裂 C.感染 D.恶变 E.腹膜炎

19.用于限制病人坐起的约束方法是（ E ）

- A.加床栏 B.约束腕部 C.约束踝部 D.固定双膝 E.固定肩部

20.颈外静脉穿刺正确的部位是（ A ）

- A.下颌角与锁骨上缘中点连线上1/3处 B.下颌角与锁骨上缘中点连线上1/2处
- C.下颌角与锁骨上缘中点连线下1/3处 D.下颌角与锁骨下缘中点连线下1/2处
- E.下颌角与胸骨柄连线上1/3处

21.躯体石膏固定病人最严重的并发症是（ C ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/457003164053010004>